



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.


We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

EE60 D7L



LIBRARY STANFORD

KLINISCHES  
RECEPT-  
TASCHENBUCH

1  
97

LANE



LIBRARY

*Gift*

KLINISCHES  
RECEPT-TASCHENBUCH  
FÜR  
PRAKTISCHE ÄRZTE.

SAMMLUNG

DER AN DEN

WIENER KLINIKEN

GEBRÄUCHLICHEN UND GEWÄHRTESTEN HEILFORMELN.

NEUNTE, VERMEHRTE UND VERBESSERTE AUFLAGE.

WIEN und LEIPZIG.  
URBAN & SCHWARZENBERG.

1888.

LANE LIBRARY STANFORD UN





V125

KG5

1888

## Vorwort zur ersten Auflage.

Veranlasst durch vielfache Aufforderungen von Seiten der Abonnenten unserer Zeitschriften „Wiener Klinik“ und „Wiener Medizinische Presse“, hat die Verlagshandlung die Herausgabe gegenwärtigen **Recept-Taschenbuches** unternommen, das bestimmt ist, einen Leitfaden für den praktischen Arzt am Krankenbette zu bieten.

Durch die freundliche Mitwirkung mehrerer, im Lehrfache sowie in der medicinischen Praxis hervorragender Aerzte, die wir zu den Mitarbeitern unserer Journale zu zählen die Ehre haben, kam eine möglichst vollständige Sammlung von Heilformeln zu Stande, bei denen die einzelnen Specialfächer der praktischen Heilkunde in ausgiebiger und authentischer Form Berücksichtigung fanden.

Dass wir die Zusammenstellung des ganzen *Materialies* gleichfalls einer bewährten Kr

anvertrauten, wird der freundliche Leser sofort an der praktischen und bequemen Anordnung wahrnehmen, so dass wir dem ärztlichen Publikum ein werthvolles und correct gearbeitetes Buch vorlegen.

Die Ordnung der Recepte und therapeutischen Notizen, **nach dem Alphabet der Krankheiten**, dürfte dieses Büchlein zur momentanen Benützung in der Praxis besonders geeignet machen. Das angefügte Register wird überdies das rasche Auffinden einzelner Heilformeln wesentlich erleichtern.

WIEN, August 1877.

Die Verlagshandlung.

## Vorwort zur zweiten bis neunten Auflage.

Die freundliche Aufnahme, deren sich das von uns edirte Recept-Taschenbuch in ärztlichen Kreisen erfreute, liefert den vollgiltigen Beweis, dass dessen Zusammenstellung den Bedürfnissen des praktischen Arztes insofern entsprach, als es in wenigen Blättern eine rasche Orientirung im therapeutischen Fache ermöglicht.

Anlässlich der Nothwendigkeit einer neuen Auflage hielten wir es daher für unsere Pflicht, nicht nur für die Beseitigung einiger Mängel durch die ergänzende Einschaltung sowohl mehrerer Krankheitsformen, als auch vieler werthvoller Receptformeln u. dgl. Sorge zu tragen, sondern auch den seither in die ärztliche Praxis neu eingeführten und bewährten Medicamenten, die mit Rücksicht auf ihre Dosirung und Anwendung noch weniger bekannt sind, den entsprechenden Platz anzuweisen.

Neben der wesentlichen Vermehrung der Receptformeln, glauben wir den Werth des vorliegenden Taschenbuches dadurch gesteigert zu haben, dass einige Capitel, deren Unentbehrlichkeit für den praktischen Arzt einleuchtend ist, neu hinzugefügt wurden.

Die Rücksichtnahme auf die österreichische und deutsche Pharmacopoe sowohl in der Taxirung als auch in der Dosirung, sowie mancherlei typographische Aenderungen werden die Verwendbarkeit des Büchleins für weitere Kreise gestatten.

WIEN, August 1887.

Die Verlagshandlung.

# Inhalts-Verzeichniss.

	Seite
Register zu den Receptformeln . . . . .	VIII
1. Receptformeln nebst therapeutischen Winken . . .	1
2. Anhang :	
a) Zu subcutanen Injectionen gebräuchliche Medi- camente und ihre Dosirung . . . . .	124
b) Zu Inhalationen gebräuchliche Medicamente und ihre Dosirung . . . . .	127
3. Antidota . . . . .	129
4. Cosmetica (Schönheitsmittel) . . . . .	135
5. Die Thermometrie am Krankenbette . . . . .	145
6. Qualitative Harnprüfung . . . . .	147
7. Antiseptischer Wundverband des praktischen Arztes . . . . .	149
8. Rettungsversuche bei Ohnmacht und Scheintod .	151
9. Uebersicht der officinellen, sowie der wichtigeren nicht officinellen Arzneimittel, ihre Dosirung, An- wendung und Taxe . . . . .	154
10. Verzeichniss der wichtigeren Bäder und Curorte	182
11. Die Bade- und Curorte nach ihrer Charakteristik alphabetisch geordnet . . . . .	204
12. Künstliche Bäder . . . . .	207
13. Maximaldosen für Erwachsene, welche nach der österreichischen (1869) und nach der neuen deutschen Pharmacopoe (1882) zum innerlichen Gebrauch nicht überschritten werden dürfen, ohne dass der Arzt ein (!) hinzufügt . . . . .	209
14. Vergleichung der gebräuchlichen Thermometer- scaln . . . . .	212
15. Schwangerschaftskalender . . . . .	213
16. Sehproben . . . . .	214
17. Verzeichniss der Todesursachen. Auf Grundlage der vom III. internationalen Congressse ange- nommenen Bezeichnungen . . . . .	218

## VIII

## Register zu den Receptformeln.

NB. Die Ziffern beziehen sich auf die den Recepten vorgesetzten Nummern.

- Acetoneum 1504.  
 Acetum Scillae 634, Litharg. 171. 668.  
 Acidum acet. 414. 814. 1623, arsenicos. 1263. 1264, aseptie. 101, benzoic. 291. 292. 365—367. 979, borac. 79. 487. 1611. 1612, boric. 157. 780. 1094, chrom. 84. 700, glycochol. 1452, hydrobrom. 832.  
 Ac. hyperosm. 865, lact. 67. 293. 935, mur. 318. 322. 329. 565, nitr. 1187. 1550, phosphor. 534. 614, pyrogall. 609. 683, pyrolign. 1584, sclerotin. 747, sulf. 102. 212. 983, tartar. 211. 817, thymol. 1399.  
 Aconitineum 997.  
 Adonis vern. nach 1639.  
 Aether acet. 959. 1072. 1074. 1222, sulf. int. 125. 140. 395. 396. 415. 447. 448, subcut. 104. 963, Inhal. 90, mit Laud. 448, mit Campher 839, m. Belladonna 125, mit Moschus 412.  
 Aether Petrolei 820.  
 Aethiops mart. 387.  
 Aetzipasta 200—202. 931.  
 Agaric. alb. 1509.  
 Agaricin 1515.  
 Aloë 1019. 1020. 1030.  
 Althea 52. 272. 1213, Mundw. 43.  
 Alumen. Inj. 156. 178. 690, Mundwasser 48. 261, int. 551. 725. 735. 736. 1330, Inhal. 889, Molke 1274, Schnupfw. 661, supp. 174. 705. 752, Waschung 803.  
 Al. plumos. 27. 28. 600.  
 Alumen hydr. 600, acet. 803.  
 Ammon. brom. 533. 619, carb. 1165, picronitr. 836, sulfosichthylol. 32.  
 Ammonia pur. 1219.  
 Amylum v. Streupulver.  
 Amylnitrit 85. 129. 626.  
 Antifebrin 833. 1299.  
 Antimon v. Stibium sulf.  
 Antipyrin 1210. 1230. 1492.  
 Apomorphin 271. 1221, subcut. 312.  
 Aq. antihyst. f. 806, Beerl 505.  
 Aq. calcis, Mundw. 49. 58, int. 350. 560, Inhal. 66. 305, mit Ol. Lini 456.  
 Aq. carvi 335, carminat. 336, castorei 809, chlori 1613. 1681, Conradi 498, Goulardi 2, haemostat. 1346.  
 Aq. Lauroc. cum: Morf. 89. 214, Extr. Hyosc. 296, Tr. op. 407. 408, nuc. v. 332, Bellad. 333, Ipecac. 91, Digit. 1164.  
 Aq. laxativa 1013, Melissa 443, Menthae 448, opii 1087, Picis 1521, Plumb. 1147, Tiliae 448. 449.  
 Arcanum dupl. 623.  
 Arg. chlorat 1464.  
 Arg. nitr. Stift 17, Sol. 146. 147. 480. 481, bacill. 173, Inj. 180, int. 222. 339. 347. 658. 659, Clysm. 417. 540. 550, -Salbe 177. 1679, supp. 172.  
 Argentum phosph. 1463.  
 Argilla dep. 259.  
 Arlt'sche Salbe 502.  
 Arnica Inf. 274. 1071. 1072.  
 Arsenikpasta 1058. 1059, -Pillen 1447.  
 Asa foetida 807. 810.  
 Aseptinsäure 101.  
 Atropin 148. 485. Salbe 149. 513, mit Cocain 853, mit Morf. 854, int. 652. 653. 1510. 1511, subcut. 748.  
 Augensalbe 182—185. 484. 503, -wasser 496—501, Waschw. 150.



- Aurant. Fol. 444, 445.  
 Balsam. Cop. 163—165. 1278,  
 Peruv. int. 190, ext. 685,  
 vitae. Hoffm. 334.  
 Belladonna, Pillen 124, pulv.  
 289. 630. 1533 u. ff., Inspers.  
 903, Tinct. 1534. 1536, Salbe  
 424. 484. 647, Tropfen 70. 225.  
 942, Pflaster 941, Supp. 544.  
 Benzin 1491.  
 Benzoëpuly. 281, -Waschw. 38.  
 1362, Salbe 578, tinct. 581.  
 Berberinum phosph. 557.  
 Biedert's Rahm pag. 18.  
 Bismuth int. 223. 224. 323.  
 327. 1617 u. ff., mit Morf.  
 331, Salbe 30. 1245, Inj.  
 170, Streup. 1583.  
 Blatta orient. 970. 1329.  
 Bland'sche Pillen 385.  
 Blaustein 488.  
 Borax, Mundw. 96. 263, Pinsel-  
 saft 712. 1383, Waschw. 37,  
 Salbe 574, Inj. 374.  
 Borsäure 157. 372, -Salbe  
 582. 583. 802. 1356.  
 Bourguignon's Salbe 1322.  
 Brayera 1474. 1480.  
 Brechmittel 279. 280. 309  
 bis 312. 923.  
 Bromkali Sol. 436. 533. 618.  
 619. 656, Pill. 437, Pulv. 655.  
 Bromum jodat. 75, pur. 76.  
 77. 925.  
 Cadmium sulf. 159.  
 Calabar nach 1485.  
 Calcaria carb. 1287, chlorata  
 14. 145. 518, Inj. 205. 694,  
 phosphor. 1287. 1529. 1531,  
 sulf. 16.  
 Calomel int. 119. 615. 791. 860.  
 946. 949. 1048, Streupulv.  
 469. 507, Salbe 510, subcut.  
 1453.  
 Campech. lign. Decoct. 233.  
 234. 398, Extr. 443.  
 Campher, ext. 10. 1181. 1185,  
 int. 141. 362. 409—411. 422.  
 430, mit Tannin 359, Linet.  
 141, Clystier 431. 948. 1568,  
 Salbe 121, subcut. 411.  
 Cannabinum tann. 217.  
 Canquoin'sche Pasta 202.  
 Carbolsäure, Clyasma 247, ext.  
 194. 1650, Inject. 206. 692,  
 Waschung 520, int. 538,  
 Pasta 523, Mundw. 913,  
 Inhal. 65, Einreibung 593,  
 Glycerin 54, Oel 523. 604,  
 Spir. 53. 605. 670. 681. 682,  
 concentr. C. 53. 51, subc.  
 672. 1522, Carbol-Amylum-  
 salbe 1631, C. Sublimatsalbe  
 927, Verband 6.  
 Carlsbader Salz, künstl. 1037.  
 Cascarilla Inf. 254, Tinct.  
 561. 563, Extr. 562.  
 Castanea vesca 1543.  
 Castoreum 227. 808. 809.  
 Cerat 1574.  
 Cerussa pulv. 28, Salbe 577.  
 Chamomilla flor. 445, inf. 555,  
 Clyst. 1384, Ol. 451.  
 Chenopod. ambr. 352.  
 China decoct. 196. 733. 828.  
 829. 984, extr. 197.  
 Chinin pulv. 72. 756. 757.  
 825. 826, Pill. 826, Sol. 1265,  
 Salbe 41, mit Ferrum 199,  
 mit Ipecac. 123.  
 Chinin. tann. 251. 1385, hy-  
 drobr. 831, hydrochl. 1546.  
 Chinoidin 827. 830.  
 Chloralhydrat 126. 426. 441.  
 mit Amm. br. 617, Morf.  
 811, Inj. 160, Clyst. 616.  
 625, ext. 461, Salbe 774,  
 Pulv. 229, z. Bepins. 80.  
 Chlorina liq. 51. 1332.  
 Chloroform, 397. 449. 621. 821.  
 Chlorzink 20. 1273, -Pasta  
 202, -Salbe 40.  
 Chromsäure 84. 700.  
 Chrysarobin 606. 1250—1256.  
 Cina Ol. 111. 112, pulv. 114. 115.  
 Cocainum oleinicum 848.  
 Cocain. mur. 267. 423. 460,  
 suppos. 358, Inhal. 888—888,  
 Insuffl. 853, Augentropfen  
 493. 511.  
 Coffein. citr. 120. 758. 759  
 1637, natr. benz. 1631.



- Colchicum 106—108.  
 Colloidum 457, 1183.  
 Collyr. adstr. 496, 155.  
 Colocynthis 108, 1030, 1034.  
 Colombo 241, 245, 255, 398, 401.  
 Conchininum sulf. nach 830.  
 Condurango 218—220.  
 Conium hydrobrom. n. 1546.  
 Convallaria maj. 1639, 1640.  
 Cosmische Pasta 200.  
 Coto 237, 256.  
 Cotoin 235, 236, 257.  
 Cremor tart. 623, 1022—1025.  
 Creosot 478, 1134, 1367, 1523.  
 Croton-Chloralhydr. 999, 1544.  
 Cubeben 166, 167.  
 Cuprum oleat. 1410, sulf. ext.  
 15, 488, 1369, 1592, 1598,  
 int. 658, Inj. 696, -Salbe  
 491, 1371, Zerstäubung 1139,  
 Augentropfen 492.  
 Curare 657.  
 Diachylonslb. 187, -Pflast. 379.  
 Digitalis 1158—1160, 1634  
 u. ff., pulv. 739, Tinctur 1168.  
 Dower'sche Pulver 241, 245,  
 250, 278, 549, mit Chinin  
 519, mit Tannin 241.  
 Duboisin 50, subc. 963.  
 Dulcamare 633.  
 Durande'sches Mittel 395.  
 Einreibungseur 1416, 1420.  
 Electuarium 115, lenit. 1014.  
 Elixir. Halleri 209, 982.  
 Empl. ceruss. 517, Cicut.  
 772, diachyl. 379, Hydr.  
 1160, Litharg. 771, oxycroc.  
 718.  
 Emuls. comm. 964.  
 Enteroclysm 403.  
 Equisetum 118, 1205.  
 Ergotin 730, 741, 754, 1227,  
 Eserin 715, 717, 856.  
 eucalypt. 834, 835, 1541, Ol.  
 E. 926, Tinet. 304.  
 Extr. Aloës 816, 1019 u. ff.,  
 Belladonn. Pill. 124, pulv.  
 299, 325, Salbe 424, 773,  
 campech. 443, cann. Ind.  
 pulv. 297, 306, 360, 554,  
 Emuls. 297, Pillen 762,  
 Extr. cascarillae 562, chinæ  
 197, colchici 107, 108, co-  
 ombo 241, 245, colocynth.  
 108, Dulcamar. 633, filic.  
 mar. 1472 u. ff., gent. 319,  
 342, haemost. 734, 743, Hy.  
 drast. 556, hyosc. pulv. 295,  
 296, 307, 361, 363, 631, mal-  
 ferr. 387, nucis v. 326, 340,  
 1144.  
 Extr. Opii Mixt. 231, 548,  
 supp. 216, 428, Salbe 753,  
 875, Pflaster 771, subcut.  
 Inj. 402, Salbe 823, Rhei  
 816.  
 Extr. Salicis 633, scillae 117,  
 974, secalis v. Ergotin;  
 trif. fibr. 341, valerian. 809.  
 Fermentum cerev. 1337.  
 Ferrum carb. sacch. 198, 386,  
 432, 514, citr. 388, iod. 389,  
 1442, lact. 383, 384, 805,  
 oxyd. dialys. 380, 382, oxyd.  
 oxydul. 199, pomat. 381,  
 pyrophosph. 945, reduct.  
 390.  
 Ferr. sesquichl. ext. 81, 467,  
 663, int. 71, 258, 723, 724,  
 726, 727, Inhal. 744, Clysm.  
 416, subcut. 745, 746, Inj.  
 207, Mundw. 61.  
 Ferr. sulf. 385, 728, 751.  
 Filix mas 1469—1477.  
 Fleischpancreasclys. pag. 15.  
 Flor. Benzoe 535, 980.  
 Flor. sulf. 613, 1317.  
 Flor. Zinci int. 92, 93, 249, 432,  
 438, 440, 654, Salbe 476,  
 578, Streupulv. 26, 599, 601,  
 765, Pasta 579, 592.  
 Frostsalbe 1181.  
 Gelatinstäbchen 176, Ver-  
 band 583.  
 Gentiana 319.  
 Getränke 209—212, 545, 1213  
 bis 1215.  
 Globuli vag. 705—707, 1177.  
 Glycerin 1506.  
 Glycochol 1452.  
 Goa 1251.  
 Graues Pflaster 1460.

- Gummi gutti 1034.  
 Gypstheerpulver 16. 1582.  
 Haller'sche Säure 209.  
 Harnröhrenstäbch. 173—176.  
 Heftpflaster 479.  
 Herb. chenopod. 352. hern.  
 352. 353. hyosc. 1057.  
 Homatropin 851. 1512.  
 Hordeum 1214.  
 Hydrarg. albumin. 1449. for-  
 mamid. 1451. peptonat.  
 1450. tann. 1428. 1429.  
 Hydrast. canad. 556.  
 Hydrogen. superox. 78.  
 Hydrom. inf. 1018.  
 Hyoscin 1513.  
 Hyosc. hydrojod. 855. 1514.  
 Hypodermoclyse 404.  
 Ichthyol 32. 587. 588. 1138.  
 1241. 1242.  
 Inpersationen 892. 893.  
 Ipecacuan. pulv. 123. 124.  
 309. 310. mit Morf. 277.  
 Inf. 137 269. 270. 285. 294. 882.  
 893. Syr. 282—284. Brech-  
 mittel 279 280.  
 Jaborandi 638. 1368.  
 Jalapa 1016. 1019. 1035. 1036.  
 1486.  
 Jequirity 494.  
 Jodcollodium 1182.  
 Jodkali int. 132. 515. 859.  
 1436. -Salbe 4. 378. 650. subc.  
 1455.  
 Jodkalijodglyc. 5. 266. 703.  
 Verband 9. Salbe 4. 650.  
 730.  
 Jodoform int. 1353. 1354. 1440.  
 1524. -Salbe 185. 648. 1663.  
 pulv. 12. 186. Insuffl. 68.  
 921. Schnupfpulv. 1125.  
 -Stäbchen 23. 1660. 1661.  
 Glyc. 1664. Collodium 788.  
 Strenpulv. 186. 1658. 1659.  
 subc. 1665. -Verband pag.  
 123.  
 Jodol 13. 1441. 1593.  
 Jodphenol nach 217.  
 Jodtinctur 3. 471. 472. 649.  
 664. 698. int. 1439. subc.  
 1268. verstärkt 698. 1404.  
 Jodäthyl 129.  
 Juniperus 117. 973. 1166.  
 Kali acet. 971. 973. 974. 1307.  
 ars. 435. carb. (Salbe) 36.  
 1317. 1322. Waschwasser  
 36. 1238.  
 Kal. caust. 8. 603. 939. Aetzm.  
 18. 19. 930.  
 Kali chloric. ext. 142. 192.  
 int. 368. 900. Mundw. 44.  
 60. 62. Inj. 203. 689. Inhal.  
 888.  
 Kali citr. 393.  
 Kali hypermang. 47. 191. 519.  
 Inj. 169. 179. 204. 695. Augen-  
 wass. 150. natr. tart. 1043.  
 nitr. 1307. sulf. 1024. 1037.  
 Kamala 470. 1471.  
 Kaolin 465.  
 Kleisterpasta 592.  
 Kusso 1468. 1474.  
 Lac sulf. 31. 35. 464. 466. 610.  
 Landolf'sche Pasta 201.  
 Lanolin 1150. 1575.  
 Lapis v. Argentum nitr.  
 Lapis caust. 18. c. calce 19. di-  
 vinus 1190. Augenw. 505.  
 mitig. 482. 483. zincicus 20.  
 Latschenöl 640.  
 Laudanumpulver 239. 243.  
 244. mit Tannin 239. mit  
 Plumb. ac. 243. 737. mit  
 Bism. 399. mit Campher 409.  
 supp. 216. 428. Pflaster 772.  
 Leberthran 1279.  
 Linctus 301. 897. 901.  
 Linum 348. 349.  
 Liquor alum. ac. 551. amm.  
 anis. 138. 419. 1220. amm.  
 caust. 525. 1030. corn. cerv.  
 1071. 1569. Holland. 1303.  
 Kal. ars. 435. Kal. ac. 974.  
 Terr. fol. tart. 636. 1166.  
 Lister'sche Pasta 523.  
 Lithion carb. 1117.  
 Lobelia 133. 134. 635. 1647.  
 Lupulin 355. 356. 423. 841.  
 1272. 1388—1390. Pillen 419.  
 Lycopodium 793.  
 Magnesia usta 843. 1488. sulf.  
 1006. carb. 1022.

## XII

- Maltum 1336.  
 Malva 499.  
 Manna 1018. Mannit 1039.  
 Mentha pip. 344. 413.  
 Menthol 761.  
 Mixt. gumm. 231. 232. 351,  
 oleos. 282. 283.  
 Morisson'sche Pillen 1034.  
 Morfium pulv. 95. 122. 213,  
 mit Alumen 735, mit Ipe-  
 cac. 277, mit Plumb. ac. 721,  
 Inspers. 392. 905, Salbe  
 1086, suppos. 215. 357. 425,  
 Globul. 707, subc. 824, v.:  
 Aq. Laurac.  
 Moschus 412, 413. 924. 1075.  
 Mundwasser 43—49. 260 bis  
 264. 1421—1424.  
 Nährclystier, pag. 51.  
 Naphthalin 1315.  
 Naphthol. 33. 546. 612. 781.  
 782. 799, Streup. 800, Oel  
 957. 1315, Salbe 1236. 1243.  
 1249.  
 Nasenbougien 1136. 1137.  
 Natr. arsenic. 1262.  
 Natr. benzoic. 63. 420.  
 Natr. bicarb. Sol. 313. 314.  
 320. 321, Pulv. 324—326.  
 393, ext. nach 461. 813,  
 Inhal. 890.  
 Natr. brom. 1103, carb. 813,  
 1154, chlorat 131. 404.  
 Natr. jodat. 1437, nitros. 87.  
 127. 1642, phosph. 1116,  
 salicyl. Sol. 73. 537, pulv.  
 221. 330. 364. 567, Mundw.  
 46. 97, sulf. 1037. 1042,  
 tann. 977.  
 Nicotianum 1484.  
 Nitro-Glycerin 86.  
 Ohrentropfen 1087 u. ff.  
 Oleum cadini 594—597. 1246,  
 Cajeputi nach 222. 1053,  
 caryoph. 686, chamom. 451.  
 erot. Tigl. 455. 1007. 1028,  
 Hyosc. 821. 1201, Juniper.  
 414, Jecor. as. 1279. 1347.  
 1353, Lini 456, macidis 526,  
 Menth. 686, Petrae 1185,  
 Plai 639. 640, Ricini int.

455. 1007—1006, ext. 457,  
 Rusci 1235, Santali 168,  
 Sinap. 1302.  
 Ol. Terebinth. int. 189. 302.  
 395. 396. 749. 750. 869. 870.  
 Ononis spin. 116. 636. 971.  
 Opium pur. 399. 409. 454.  
 529. 547.  
 Opodeldoc 763. 862.  
 Oxyd. Zinc.: vide Flor. Zinc.  
 Oxymel Scillae 636. 973. 1207.  
 Pagenstecher's Salbe 509.  
 Pancreasclystiere, Seite 51.  
 Papain 602.  
 Papayotin 82.  
 Paraldehyd. 130. 531. 812. 944.  
 Pasta 523. 588. 591. 592.  
 Paullinia 252. 761.  
 Pelletierin 1478.  
 Pepsin 328. 345. 564.  
 Peptonquecksilber 1450.  
 Peruvian. cort. 1338.  
 Petroleum 685. 988. 1321,  
 -Aether 820.  
 Pflastermull 1378.  
 Phellandra aq. 633. 1520.  
 Phosphor 1288—1291.  
 Pilocarpin 69. 637. Augentr.  
 716. 856.  
 Pilul. asiat. 1264.  
 Pinselsaft 79. 1005.  
 Plumb. ac. ext. 1. 143, Inj.  
 151. 154. 688, int. 243. 721.  
 737. 1566, Salbe 195. 576,  
 Umschläge 475, Glysma 543.  
 Plumb. carb. 575. 1358, jodat.  
 21. 22, tann. 354.  
 Podophyllin 394. 1031—1033.  
 Polyg. Seneg. 273. 287. 288.  
 300. 308, Syr. Sen. 286.  
 Präcipitatsalbe gelb 182.  
 183. 509, roth 11. 786, weiss  
 29. 42. 184. 477. 502. 503.  
 Propylamin 442. 1296.  
 Protojod. Hydr. 1156. 1412. 1434.  
 Pulv. Cosmi 200, cosmet. 28.  
 Punica Gran. 1466. 1467. 1469.  
 Pyrogallus-Gelatine 1254.  
 Quebracho 135. 568.  
 Quecksilber-Albuminat 1449,  
 -Formamid 1451.

- Rahmgemenge pag. 18.  
 Ratanhia-Decoct 238, Tinct.  
 int. 253. 563, Zahntinct.  
 714, Mundwasser 224. 1191.  
 Resorcin Inj. 161. 377, int.  
 431. 837, ext. 528, Salbe 938,  
 Pasta 1409.  
 Rheum 1027. 1030, extr. 816,  
 Inf. 1045, Tinct. 1015.  
 Sabina 470.  
 Sacch. Saturn 489, 651, 496.  
 Sal amarus 1010. 1011, amm.  
 632. 899. 1021, Seignetti 622.  
 Salep 230. 253. 400, Clysmā  
 246. 400. 541. 542, Mund-  
 wasser 98, Getränk 1562.  
 Salicylsäure Clysmā 418,  
 ext. 7. 59, Gelatine 585, mit  
 Glyc. 39, Inj. 693, int. 915,  
 pulv. 406, Mundw. 45. 59.  
 100, Pasta 591. 847, Pflaster  
 1461, Salbe 458. 581. 590.  
 801, mit Spir. 55. 681. 682,  
 Streupulv. 795—797, Ver-  
 band 7, Waschung 1361,  
 Einreibung 681. 682.  
 Salix-Extr. 633.  
 Salol 162. 369. 1295, Salbe  
 584.  
 Salvia 50. 51. 1345.  
 Santalöl 168.  
 Santonin 109—113. 1121.  
 Sapo viridis 24. 570. 571.  
 Scammonium 1035.  
 Schmierseife 24.  
 Schnupfpulver 1123—1125.  
 Schnupfwasser 1127 u. ff.  
 Schwefelpasta 468.  
 Sclerotinsäure 747.  
 Secale corn. 558. 729. 952.  
 954—957, Inf. 740. 953. 955,  
 subc. 671. 731. 732. 744. 745.  
 Seifenpflaster 516.  
 Semen Cinae 114, Lini 348.  
 349, Jecurity 494, Lycopod.  
 793.  
 Senega v. Polyg. Seneg.  
 Senna 918. 1006. 1023. 1047.  
 Serum lactis 1274.  
 Sodum-Nitrit. 87. 127.  
 Solutio ars. Fowleri 433. 434.  
 838. 994, Nitro-Glycerin.  
 86, Pearsoni 1262, Vlem-  
 mingkx 1257.  
 Spartein 1641.  
 Spec. pector. 275, laxant.  
 1012.  
 Sperma Ceti 678.  
 Spir. aether. 419. 452, anti-  
 vener. 1432, aromat. 56,  
 camphorat. 546. 1186, coch-  
 lear. 264, Mindereri 1167,  
 sapon. kal. 25. 463. 1359.  
 Stibium sulf. aur. 291. 292.  
 298.  
 Streupulver 26—28. 598 bis  
 601. 765. 792—797.  
 Strychnin 1143—1146, sub-  
 cut. 644.  
 Styraxsalbe 1316. 1318.  
 Subcut. Inj. pag. 124.  
 Sublimat int. 858. 910. 1415.  
 1430—1433, ext. conc. Solut,  
 611. 1370, Verband 1374,  
 subcut. Inj. 376. 1448 u. ff.  
 Waschm. 38. 687, in's Bad  
 1155. 1417, Augenw. 498,  
 Inhal. 64, Bepinsel. 57. 268.  
 Succus citri 34. 103. 210.  
 Sulf. aur. ant. v. Stibium.  
 Sulf. citrini 34, depur. 391,  
 praec. 33, venal. 1319. 1320.  
 Supposit. 215. 216. 425. 544.  
 1176, urethrae. 173 u. ff.  
 Syr. ferr. iod. 1350. 1443. 1444,  
 Ipecac. 282, mannat. 1040.  
 1041, Senegae 286.  
 Talcum ven. 769. 797.  
 Tamarind. 817. 1017. 1044.  
 1046.  
 Tanacetum 1119. 1120.  
 Tannin-Albuminat 242.  
 Tannin. pulv. 239—242. 741.  
 1276. 1277, Pillen 975, mit  
 Ferr. 642, mit Morf. 240,  
 738, mit Campher 359, mit  
 Laud. 722, Stäbchen 175.  
 176, Salbe 524, Augenw. 500,  
 Clysmā 542, Enteroclysmā  
 403.  
 Tannoglycerin 693. 703  
 -stäbchen 175, -gelatin 17



# XIV

- Tart. emet. 901. stibiat. 136.  
 280. 311. 922. 1070.  
 Terpinum hydr. 303.  
 Thallin 152.  
 Theer 594—597. Seife 1235.  
 Thein 757.  
 Thonerde essigs. 1676. 1677.  
 Thymol 1100. 1133. 1376.  
 1399. 1545. int. 74.  
 Tilia 445. 449. 684. 1066. Inf.  
 447.  
 Tinct. aconit. 1104. amara  
 248. 316. 343. aromat. 452.  
 asae f. 810. belladonn. 942.  
 1534. 1536. Benzoës 38. 590.  
 1362. Bestuscheffl 1283.  
 Calami 317. cantharid. 105.  
 cascarillae 561. 563. ca-  
 storei 88. 227. chinae  
 comp. 317. 343. 1339. chi-  
 noidin. 830. cinnam. 958.  
 colchici 106. coto 237. 256.  
 Digit. 1168. ferri ac. 804.  
 959. ferri pom. 381. 1286.  
 Gallarum 698. 714. 1425.  
 Gelsemi 1001. Ipec. 91.  
 mal. ferr. 288. 1351. myr-  
 rhae 1382. nucis v. 227.  
 532.  
 Tinct. opii benz. 259. croc.  
 407. 408. Augentropfen  
 490. 879. opii simpl. 232.  
 351. 405. 427. 881. als clyst.  
 541. 543.  
 Tinct. rat. int. 563. Mundw.  
 1397. rhei 1015. 1040. 1041.  
 Scillae 1207. spilanthe 1398.  
 valerian. 806. 810. Zingib.  
 829.  
 Traumaticin 607.  
 Ung. ceruss. 577. Diach. 187.  
 188. Digitalis 1203. Hydr.  
 1416. mit Bellad. 484. Li-  
 tharg. 647. naphtholi 1236.  
 1314. plumb. 195. 711. 767.  
 vaselini plumb. 573.  
 Ung. Wilsoni 578.  
 Uva ursi 353. 1273.  
 Vaginalkugeln 705—707. 1177.  
 Valeriana Inf. 807. Extr.  
 809 995. pulv. 440. Clyst.  
 1118. 1385. tinct. 88. 810.  
 Vaselinesalbe 580.  
 Van Swieten's Liqueur 1432.  
 Veratr. 822. 863. 992. 996.  
 Vinum stibiat. 134. 139.  
 Vlemmingkx 1257.  
 Waschwass. 36—38. 518.  
 Waschmittel 506. 525. 1350  
 u. ff.  
 Weinberg's Salbe 1316.  
 Wiener Aetzpasta 931.  
 Wilkinson's Salbe 613. 1313.  
 Wilson's Salbe 578.  
 Wundwasser pag. 122 u. 123.  
 Xylol 1633.  
 Zahnharz 1058. -pulv. 1064  
 bis 1069. -tropfen 1051 bis  
 1056. -tinct. 1049—1050.  
 Zincum acet. 154. chlorat. 20.  
 Salbe 40. mur. 1373. sulf.  
 int. 337. 338. Inj. 156. 158.  
 171. 370. 691. Augenw. 497.  
 Schnupfw. 662. Supp. 706.  
 Waschung 846. valerian.  
 439.  
 Zincum oxyd. v. Flor. Zinci.  
 Zinksalbe 476. 783. -amylum-  
 pasta 847.  
 Zittmann's Dec. 1445. 1446.

# 1. Receptformeln

nebst

## therapeutischen Winken.

### Adenitis inguinalis, Bubo, Leistendrüsene ntzündung.

Im Beginne möglichst Ruhe, kalte Umschläge; Jodmittel äusserlich bei nicht entzündeter Haut; bei Entzündung derselben, sowie bei vorgeschrittener Verdünnung der Adenitisdecke Umschläge mit Aqua Goulardi u. dgl.; Function mit dem Spitzbistouri bei constatirter Fluctuation und Entleerung des Eiters; darauf antiseptischer Verband. Schonung der noch erhaltenen Adenitisdecke, im Bedarfsfalle Incisionen, Auslöfflung; Drüsengeschwüre fordern entsprechende Wundbehandlung (Drüsenabtragung etc.). — Gleichzeitige Behandlung des ursächlichen Schankers etc.

1. Rp. *Plumb. acet. bas. sol.* 5'0,  
*Aquae destill.* 200'0.  
S. Zu Umschlägen.

2. Rp. *Aq. Goulardi* 200'0.  
S. Zu Umschlägen.

3. Rp. *Tinct. Jodinae*,  
*Tinct. Gallarum aa.* 10'0.  
S. Z. Bepinseln (3—4fache schwache Bepinselung in Zwischenräumen von je 4—5 Min. Früh, Mittags und Abends).

4. Rp. *Kali jodat.* 1'0,  
*Jodi puri* 0'10,  
*Vaselin* 30'0.  
S. Salbe.

5. Rp. *Kali jodat.* 1'0,  
*Jodi pur.* 0'10,  
*Glycerin.* 30'0.  
S. Zum Bepinseln.

Bei Zerfall der Punctionsöffnung oder bei grösseren nach Incision entstandenen Drüsenwunden:

6. Rp. *Acidi carbol.* 1'0,  
*Aquae destill.* 100'0.  
S. Zum Verband.

7. Rp. *Acidi salicyl.* 1'0,  
*Natr. carbon.* 0'50,  
*Aquae destill.* 100'0.  
S. Zum Verband.

8. Rp. *Kali caust.* 0'50,  
*Aquae destill.* 100'0.  
S. Zum Verband.

9. Rp. *Kal. jodat.* 1'0,  
*Jodi puri* 0'10,  
*Aquae destill.* 20'0.  
S. Zum Verband.

10. Rp. *Camphorae subact.* 2'0.  
*Mucil. gumm. arab.*,  
*Aquae destill. aa.* 25'0.  
S. Zum Verband.

11. Rp. *Merc. prae. rubr.* 0·50,  
*Vaselini* 20·0.

*S. Salbe.* (Mittelst Pinsels aufzutragen.)

12. Rp. *Jodoformi pur.* 10·0.  
*S. Streupulver.*

13. Rp. *Jodol.* 5·0,  
*Sacch. Lactis* 10·0.

*S. Streupulver.*

Bei diphtheritisch belegten  
Adenitiswunden:

14. Rp. *Calcar. chlorat.* 5·0,  
*Aquae destill.* 500·0.

*S. Zum Abspülen.*

15. Rp. *Cupr. sulfur.* 1·0,  
*Aquae destill.* 50·0.

*S. Zum Bepinseln.*

Bei progressiver Gangränescenz u. bedeutender Ausdehnung der Wundflächen:

16. Rp. *Calcariae sulfur.* 5·0,  
*Bituminis fagi* 1·0.

*M. f. Pulv. S. Gyps-  
theerpulver.* (Zum Be-  
streuen der Wundfläche.)

Zum Cauterisiren d. Wund-  
ränder, der Granulationen  
oder zu Stichelungen etc.:

17. Rp. *Argenti nitr. fusi* 10·0.  
*S. Zu Händen des Arztes.*

(*Lapis, Lapisstift, Lapis  
en crayon.*)

Veraltete Aetzmethoden:

18. Rp. *Kal. caust.* 5·0,  
*Funde in formam bacilli,*

*D. ad. vitr.*

*S. Aetzstab* (*Lapis  
causticus*).

19. Rp. *Kali caust. fus.* 10·0,  
*Calcar. ustae pulv.* 2·0.

*Funde in formam bacilli,  
Obduc. fol. stanneo.*

*S. Aetzstift* (*Lapis  
caust. c. calce*).

20. Rp. *Zinci chlor.* 20·0,  
*Kal. nitr.* 5·0,

*Funde in form. bacillae,  
Longit. 3—4 cm.,*

*crass. 3—4 mm.*

*S. Aetzstift* (*Lapis zin-  
zicus*).

Bei indolenten und hyper-  
plastischen Bubonen:

21. Rp. *Plumb. jodat.* 5·0,

*Empl. Diach. comp.* 40·0,

*Ung. Elemi q. s.*

*u. f. empl. molle.*

*S. Pflaster.*

22. Rp. *Plumb. jodat.* 5·0,  
*Glycerin.* 10·0,

*Lanolini* 20·0.

*S. Salbe.*

Bei Fistelgängen Durch-  
spülung mit Carbolsäure  
1—2% und sodann Ein-  
führung von Jodoform-  
stäbchen oder operatives  
Verfahren:

23. Rp. *Jodoformi* 10·0,

*Butyr. Cacao* 20·0,

*Ol. Amygdal. q. s.*

*Fiant bacilli.*

*S. Nach Bericht.*

**Akne, Finnen.** Ausdrücken der Sebumpfröpfe (vergl.  
Comedones), Eröffnung der Abscesschen mittelst Spitz-  
bistouri, Abschaben der Haut mit dem scharfen  
Löffel, Abreibung mit Schmierseife, flüssiger Glycerin-  
seife oder Spir. saponis kalinus mittelst Flanell; in  
hartnäckigen Fällen Application von Salben während  
der Nacht und Abwaschung des Morgens; sodann Be-  
streuerung mit einem Streupulver. — Bei *A. rosacea*  
Rücksicht auf den Allgemeinzustand, eventuell auf Geni-  
talaffectionen; graues Pflaster, Jodtinctur, Scarificatio-  
nen, Stichelung.

24. Rp. *Saponis viridis*, 50·0.  
*S. Schmierseife.*

25. Rp. *Spir. sap. kal.* 500.  
*S. Seifengeist.*

26. Rp. Oxyd. Zinc. 5'0,  
Amyl. pur. 30'0.  
S. Streupulver.
27. Rp. Amyl. pur. 50'0,  
Alum. plumos. pulv. 15'0,  
Pulv. rad. Ireos flor. 2'0.  
S. Streupulver.
28. Rp. Pulv. Cerussae,  
Alum. plumos. pulv.,  
Magnes. carb. aa. 10'0,  
Pulv. r. Ireos flor. 5'0,  
Amyl. tritic. 50'0,  
Ol. citr. gutts. 2.  
S. Streupulver (*Pulv. cosmeticus*).
29. Rp. Merc. praecip. alb. 5'0,  
Vasellini 50'0.  
S. Salbe.
30. Rp. Magist. Bismuth.,  
Merc. praec. alb. aa. 5'0,  
Vasellini 50'0,  
S. Salbe.
31. Rp. Lactis sulfur. 5'0,  
Kali carbon. 2'0,  
Glycerini pur. 10'0,  
Spir. vin. Gallici 20'0,  
M. f. pasta mollis.  
S. Pasta. (3 Abende aufzulegen, Morgens wegzuwaschen, hierauf eine der obigen Salben einzureib.)
32. Rp. Amm. sulfoichth. 3'0,  
Aqua dest.,  
Glycerini,  
Dextrini aa. 10'0,  
S. Pasta.
33. Rp. Naphthol-β 10'0,  
Sulf. praecip. 50'0,  
Lanolini puriss.,  
Sapon. virid. aa. 25'0,  
M. f. pasta mollis.  
S. Pasta. (Messerrücken dick 15—30 Min. auflegen, darauf abwisch. u. bepud.)
34. Rp. Sulf. Citrini 10'0,  
Spir. sap. kal. 20'0,  
Spir. Lavandulae 60'0,  
Bals. Peruv. 1'50,  
Spir. camphor. 1'0,  
Ol. Bergamott. gutts. 5.  
S. Zum Einreiben.
35. Rp. Lactis sulf. 10'0,  
Kal. carb. 5'0,  
Spir. sap. kal. 20'0,  
Glycerin. 50'0,  
Ol. Caryophyll.,  
Ol. Menth.,  
Ol. Ror. mar. aa. 1'0,  
Z. Einreiben. (Thener!)
36. Rp. Kali carbon. 2'0,  
Aqua destill. 200'0,  
Glycerini 1'0.  
S. Waschwasser.
37. Rp. Boracis venetae 5'0,  
Glycerini pur.,  
Spir. vin. aa. 10'0,  
Aqua rosarum 200'0,  
S. Waschwasser.
38. Rp. Merc. subl. corr. 0'20,  
Tinct. Benzoës 10'0,  
Aqua rosarum 200'0.  
S. Waschwasser.

**Albuminurie** vide: Morbus Brighti.

**Alopecie.** Rücksicht auf die Ursache. Sind die Haarzwiebeln noch nicht zerstört, so passen leicht irritirende Salben u. Oele. Bei Al. furfuracea Behandl. der Seborrhoe. Anfangs jeden Abend 2—3mal wöchentlich Waschung mit Spir. saponis kal. und jeden Morgen Einreibung von:

39. Rp. Acid. salicyl. 2'0,  
Glycerini 10—20'0,  
Spir. vini 100'0.  
S. Mit Borstenpinsel einzureiben. (durch 3—4 Mon.)
40. Rp. Zinc. chlorat. 3'0,  
Aung. Porc. 30'0,  
S. Salbe.
41. Rp. Sulf. Chinin. 2'0,  
Vasellini 30'0.  
M. f. Ung.  
S. Salbe.
42. Rp. M. praec. alb. 0'50,  
Vasellini 50'0,  
Tinct. Benzoës 1'0.  
S. Salbe.



**Amenorrhoe, Fehlen der Menstruation.** Ermittlung der Ursache (Chlorose, Scrophulose, Tuberculose, Anämie) und eventuell Behandlung derselben; Regelung der Diät und des Stuhlganges; in einzelnen Fällen Luftveränderung, Bäder. Allenfalls Untersuchung wegen Gravidität und Retentio mensium (Haematometra) etc.

**Amygdalitis** vide: Angina.

**Anaemia cerebri, Gehirnanaemie.** Vornehmlich die ursächlichen Momente zu berücksichtigen (langdauernde Blutungen, allzulanges Stillen, habituelle Diarrhoen etc.). Horizontale Lagerung. Lüftung der Kleidungsstücke. Bespritzen mit kaltem Wasser, Riechmittel. Vermeidung jener Verhältnisse, die Ohnmacht hervorrufen etc. Passende Ernährung, besonders bei Kindern nach Durchfällen. Erwärmung.

**Anaemie** vide: Chlorose.

**Angina, Halsentzündung.** Bei der einfachen Angina kalte oder Dunstumschläge um den Hals, ferner ein einfaches Gurgelwasser. In intensiven Fällen Eispillen oder Gefrornes, bei Kindern Bettruhe. Bei Hypertrophie der Tonsillen, Bepinselung mit Jodtinctur; bei öfterer Recidive der Angina: Tonsillotomie, eventuell Ignipunctur. Empfohlen wird das Aetherisiren des Rachens mit dem Zerstäubungsapparat.

43. Rp. Dec. r. *Altheae* 200'0,  
Tinct. Laud. simpl. gttss 15,  
Syr. Mororum 20'0.  
S. Mundwasser.

44. Rp. Kal. chlorici 2'0,  
Aqua destill. 200'0,  
Syr. cort. aur. 15'0.  
S. Gurgelwasser.

45. Rp. Acidi salicyl. 1'0,  
Kal. chloric. 2'0,  
Natr. carb. 0.50.  
Aqua destill. 300'0.  
S. Mundwasser.

46. Rp. Natr. salicyl. 1'0,  
Aqua destill. 200'0.  
S. Mundwasser.

47. Rp. Kal. hypermag. 1'0,  
Aqua destill. 200'0.  
S. Mundwasser.

48. Rp. Alum. crud. p. 5'0,  
Aqua destill. 200'0,  
Tinct. Laud. simpl. 1'0,  
Mellis ros. 20'0.

49. Rp. Aqua Calcis 200'0.  
S. Mundwasser.

50. Rp. Fol. *Salviae* 30'0.  
S. Thee. (Den Aufguss eines Theiles zum Ausspülen zu verwenden.)

51. Rp. Inf. *Salviae* 200'0,  
Chlorin. liq. 10'0,  
Mellis ros. 20'0.  
S. Mundwasser.

52. Rp. Decoct. r. *Alth.* 150'0,  
Aqua Chlori 10'0,  
Syr. Mororum 20'0.  
S. 2ständl. 1 Kinderlöffel.

**Angina diphtheritica, Rachenbräune.** Bepinselung der Pseudomembranen, sowie der necrotisirenden Theile mit Jodoformäther 10%, Sublimat 1 per mille, Chinolin 5%, Carbonsäurelösung oder mit spirituösen Mischungen. Statt eines Pinsels auch ein Schwamm oder Baumwoll- in einem Stäbchen oder mit einer Pincette wohlbevestig-

anzuwenden. Eispillen, Eisumschläge. Zur Lösung der Membranen warme Umschläge. Mundwasser, am besten mittelst Irrigation. Cauterisation m. Lapis allgemein verworfen. Ventilation. Isolirung. Gegen das Fieber Chinin, Salicylsäure etc. Clysm. Inhalation heisser Wasserdämpfe allein oder mit Zusatz antiseptischer Mittel. Inhalation von Aq. Calcis oder Acid. lact. Kräftige Ernährung, Cognac.

53. Rp. *Acidi carbol.* 10,  
*Spir. vini* 100.  
S. Zum Bepinseln.
54. Rp. *Ac. carbol.* 20,  
*Glycerini pur.* 200.  
S. Zum Bepinseln.
55. Rp. *Acid. salicyl.* 10,  
*Spir. vini rectif.*  
*Glycerini* aa. 250.  
S. Zum Bepinseln.
56. Rp. *Spir. aromat.* 200.  
S. Zum Bepinseln.
57. Rp. *Subl. corr.* 0'05—0'10,  
*Aquae dest.* 1000.  
S. Zum Bepinseln.
58. Rp. *Aquae Calcis* 2000.  
S. Mundwasser.
59. Rp. *Ac. salicyl.* 10,  
*Aquae dest.* 3000.  
S. Mundwasser.
60. Rp. *Kal. chlorici* 50,  
*Aquae destill.* 2000,  
*Syr. Mororum* 200.  
S. Mundwasser. (Auch stündl. 1 Kinderlöffel voll.)
61. Rp. *Liqu. Ferr. sesq. gtts* 20,  
*Aquae destill. simpl.* 10000.  
S. Mundwasser.

Bei gleichzeitigem Husten:

62. Rp. *Kal. chlorici* 50,  
*Aquae destill.* 2000,  
*Tinct. Laud. simpl.* 10,  
*Syr. simpl.* 200.  
S. Mundwasser.
63. Rp. *Natr. benzoici* 200,  
*Aquae destill.* 2000.  
S. Zu Inhalationen.
64. Rp. *M. subl. corr.* 0'02,  
*Aquae dest.* 2000.  
S. Zu Inhalationen.

65. Rp. *Acid. carbol.* 20,  
*Aquae dest.* 2000.  
S. Zu Inhalationen.
66. Rp. *Aquae Calcis*,  
*Aquae dest. aa.* 1000.  
S. Zur Inhalation.
67. Rp. *Acid. lact. gtts.* 40,  
*Aquae dest.* 2000.  
S. Zur Inhalation.
68. Rp. *Jodoform. pulv.*  
*Sacch. Lactis* aa. 50.  
S. Zu Insufflation.
69. Rp. *Pilocarpin. mur.* 0'20,  
*Aq. dest.* 1000,  
5—10 Tropfen 2stündlich  
(darnach sofort schwere  
Weine zu verabfolgen).
70. Rp. *Extr. Belladonn.* 0'10,  
*Aquae destill.* 1000.  
S. 10 Tropf. 4—5m. tägl.
71. Rp. *Liq. Ferr. sesq. gtts* 10,  
*Aq. dest. cinnamom.* 800.  
S. Stündlich 1 Kinderlöffel,  
Gegen das Fieber:
72. Rp. *Chinini mur.* 10,  
*Sacch. alb.* 50.  
*M. f. p. div. in dos.* = 10.  
S. 2stündl. 1 Pulver.
73. Rp. *Natr. salicyl.* 1—30,  
*Aquae dest.* 10000,  
*Syr. simpl.* 150.  
S. 2stündl. 1 Esslöffel.
74. Rp. *Thymoli* 0'05—0'10,  
*Aq. dest.* 1000.  
*Aq. naphae* 500.  
S. 1 Esslöffel mehrmals  
täglich.
75. Rp. *Bromi jodat.*,  
*Kal. bromat. aa.* 0'3—0'5,  
*Aquae destill.* 1500.  
S.  $\frac{1}{4}$ —1 Theelöff. je 15—20  
Minuten einzuathmen (auch  
zum Bepinseln geeignet).

76. Rp. Bromi 0·10,  
Kal. bromat. 0·25,  
Aq. dest. 100·0.  
S. Stündlich 1 Kaffeelöffel  
in Wasser

77. Rp. Bromii pur.,  
Kal. bromat. aa. 0·50,  
Aquae destill. 100·0.  
S.  $\frac{1}{2}$ stündl. zu inhaliren.

78. Rp. Solut. hydrogen super-  
oxyd ( $2\frac{1}{10}$ ) 120·0.  
S.  $\frac{1}{2}$ stündl. 1 Theelöffel.  
(Auch zu Inhal.)

79. Rp. Acid. borac. 5·0,  
Glycerini puri,  
Aquae dest. aa. 10·0.  
S. Zum Bepinseln (stünd-  
lich).

80. Rp. Chlorat. hydrat. 10·0,  
Aquae dest. 20·0,  
S.  $\frac{1}{2}$ stündl. zu bepinseln.

81. Rp. Liq. Ferr. sesq.,  
Aquae dest. aa 15·0,  
S. Zum Bepinseln.

82. Rp. Papayotini recent. 1·0,  
Aquae dest. 20·0.  
S. Alle 10—15 Minuten  
vorsichtig zu bepinseln.

83. Rp. Hydrarg. bicht. 0·05,  
Aquae dest. 50·0.  
S. Zum Bepinseln.

84. Rp. Ac. chrom. 2·0,  
Aq. dest. 25·0.  
S. Zum Bepinseln.

Vide: Laryngitis crouposa.

**Angina pectoris, Stenocardie, Herzkrampf,** Berücksichtigung des ursächlichen Leidens und Behandlung desselben. Während des Anfalles Frottirungen der Herzgegend, der ob. Extremitäten mit Senfspiritus, Senföl, überhaupt Hautreize, ferner subcutane Morfium-Injection, Amylnitrit, ein Antispasmodicum innerlich. in den Pausen kalte Abwaschungen; Luftveränderung. Regelung der Beschäftigung, der Nahrungsverhältnisse, des Stuhlganges. Bei nervösem Herzklopfen zuweilen ein Brausepulver od. Zuckerwasser ausreichend (Marienbad, Kissingen). Jodkali innerl. als Präventiv-Massregel.

85. Rp. Amyl nitric. 5·0,  
Ol. Foeniculi 10·0.  
S. 3—6—9 Tropfen zu  
Beginn des Anfalles zu  
inhaliren.

Während der Pause:

86. Rp. Sol. alcohol. Nitro-  
Glyc. 0·3% gtt. 20,  
Aquae dest. 200·0.  
S. 3mal tägl. 1 Esslöffel.  
(Vorsicht!)

87. Rp. Natr. nitros. 0·50,  
Aq. dest. 150·0.  
S. 3—4 Esslöffel täglich.  
(Sodium-Nitrit.)

88. Rp. Tinct. Valerianae 5·0,  
Tinct. Castorei 1·0.

S. 10 Tropf. jede Viertelst.

89. Rp. Aquae Lauracer. 10·0,  
Mor. Morf. 0·05,  
S. Tropfen.

90. Rp. Aetheris sulf. 15·0.  
S. Zum Einathmen (je  
einige Tropfen auf einen  
Teller gegossen, während  
des Verdunstens nächst  
der Nase zu halten).

91. Rp. Aq. Laurac. 10·0,  
Tinct. Ipecac. 2·5,  
Liq. Ammon. anis. 1·0.  
S. Alle 10 Min. je 10 bis  
12 Tropfen.

92. Rp. Flor. Zinci 1·0,  
Sacch. alb. 3·0,  
M.f. Pul. div. in dos. = 10.  
S. Fröh., Mittags und  
Abends 1 Pulv.

93. Rp. Oxydi Zinci 0·50,  
Sacch. alb. 2·0,  
M.f. Pul. div. in dos. = 5.  
S. Fröh., Mittags und  
Abends 1 Pulver.

**Anthrax.** Kalte Umschläge, eventuell Eisumschläge im Beginne; feuchte Wärme im späteren Stadium; entsprechende Lagerung. Eröffnung des Anthrax durch Spaltung (scharfer Löffel, Thermocauter etc.), passende Wundbehandlung v. *Vulnus*.

94. Rp. *Aq. Goulardi* 200°0.  
S. Zu Umschlägen.

Bei heftigen Schmerzen  
Morfium-Injection oder:

95. Rp. *Morf. mur.* 0°05,  
*Sacch. alb.* 2°0,

*M. f. Pulc. diss. in dos.* = 5.

S. Täglich 3 Puleer.

**Aphthae.** Sorgfältige Reinigung des Mundes; so lange die Geschwüre klein sind, ist das Tonchiren mit dem Lapisstifte am zweckmässigsten, bei grösserer Ausdehnung sehr häufige Anwendung eines Mundwassers, am besten mit dem Irrigateur.

96. Rp. *Boracis venet.* 5°0,  
*Aquae destill.* 200°0.

S. Mundwasser.

97. Rp. *Natr. salicyl.* 2°0.  
*Aquae dest.* 200°0.

S. Mundwasser.

98. Rp. *Decoct. r. Salep* 200°0,  
*Tinct. Laud. simpl. gtt.* 10,

*Syr. rub. Idaei* 20°0.

S. Mundwasser.

99. Rp. *Kal. chlorici* 2°0,  
*Aquae destill.* 200°0,

*Syr. rub. Idaei* 20°0.

S. Mundwasser. (Auch innerlich, besonders bei Kindern, 2stündlich ein Theelöffel.)

100. Rp. *Acid. salicyl.* 2°0,  
*Natr. carb.* 1°0,

*Aquae destill.*,

*Aquae rosarum aa.* 100°0.

S. Mundwasser.

101. Rp. *Ac. aseptie.* 50°0,  
*Aqu. dest.* 500°0,

S. Mundwasser (Aseptinsäure = 5% Borax u. 27% Wasserstoffsuperoxyd),

102. Rp. *Acidi sulf. dil.* 0°50,  
*Syr. cap. Ven.* 50°0.

S. Zum Bepinseln.

103. Rp. *Succi Citri*,  
*Syr. rub. Idaei aa.* 10°0.

S. Zum Bepinseln.

**Apoplexia, Haemorrhagia cerebri, Schlagfluss.**

Entfernung der beengenden Kleider, frische Luft; bei Erwachsenen und Kräftigen Blutentziehung; Eisumschläge auf den Kopf, starke Abführmittel, Clysmata, eventuell Katheter, Riechmittel (Ammoniak), Reiben und Bürsten der Haut. Später Ruhe, Verdunkelung des Zimmers; weitere Behandlung symptomatisch. Prophylaktisch Anlässe zu Congestionen, Aufregungen, Excesse in venere et baccho zu meiden.

104. Rp. *Aether. sulf.* 20°0.

S. 1—2—3 Spritzen subcutan zu injiciren.

105. Rp. *Tinct. cantharid.* 5°0,  
*Ol. Terebinth.* 25°0.

S. Zum Einreiben.

**Arthritis, Podagra, Gicht.** Regelung der Lebensweise, namentlich Beschränkung und Präcisirung des Quantums der Nahrung; gemischte Kost, Obst, wenig oder keine geistigen Getränke, Bewegung im Freien. *Salicylaures*, *Natron*, *Massage*. Gegen die Schmerzen *Narcotica*. Bei Bildung von Abscessen *Kataplasmen*. *Karlsbad*, *Mari*



bad, Vichy, Homburg, Kissingen. Auch Soolbäder empfohlen.

- |   |   |
|---|---|
| <p>106. Rp. <i>Tinct. Colchici</i> 10'0.<br/>S. Früh, Mittags und<br/>Abends je 10 Tropfen.</p> <p>107. Rp. <i>Extr. Colchici</i>,<br/><i>Pulv. Aloes aa.</i> 2'0,<br/><i>M. f. pil. Nr. 20.</i><br/>S. 2–4 Pillen täglich.</p> | <p>108. Rp. <i>Extr.</i><br/><i>Pulv. Ipe</i><br/><i>Extr. Col</i><br/><br/><i>Sacchari</i><br/><i>M. f. Pulv.</i><br/><i>S. Abends</i></p> |
|---|---|

**Ascaris lumbricoides, Spulwurm.** Von faches Purgans (Calomel, Rheum). Ers nicht ausreicht, verordne man Zittwer Clystiere mit  $\frac{1}{2}$ – $\frac{1}{10}$ ölgiger Carbolsäurelösung.

- |  |  |
|--|--|
| <p>109. Rp. <i>Santonini pur.</i> 0'50,<br/><i>Pulv. Calomelan.</i> 0'20,<br/><i>Sacch. alb. aa.</i> 2'0,<br/><i>M. f. P. div. in dos.</i> = 10.<br/>S. Täglich 3 Pulver.</p> <p>110. Rp. <i>Santonini pur.</i> 0'5–1'0,<br/><i>Sacch. lactis</i> 1'0,<br/><i>M. f. Pulv. div. in dos.</i> = 5.<br/>S. 2stündlich 1 Pulver.</p> <p>111. Rp. <i>Santonini</i> 0'20,<br/><i>Ol. amygd. dulc.</i> 60'0,<br/><i>Ol. Cinæ aeth. gtts</i> 4.<br/>S. 2–3 Theelöffel täglich.</p> <p>112. Rp. <i>Santonini</i> 0'20,<br/><i>Ol. Ricini</i> 20'0,<br/><i>Ol. Cinæ aeth. gtts</i> 4.<br/>S. 2–3 Theelöffel tägl.</p> | <p>113. Rp. <i>Santo</i><br/><i>Sacch. al</i><br/><i>M. f. c. gu</i><br/><i>Tri</i><br/><i>S. Früh</i></p> <p>114. Rp. <i>Pulv.</i><br/><i>Tub. Jala</i><br/><i>Sacch. al</i><br/><i>M. f. Pulv</i><br/><i>S. Jede <math>\frac{1}{2}</math></i></p> <p>115. Rp. <i>Flor. C</i><br/><i>Rad. Jala</i><br/><i>Kali sulfi</i><br/><i>Mellis ros</i><br/><i>u. f. electi</i><br/><i>S. Abends</i></p> |
|--|--|

**Ascites, Bauchwassersucht.** Behandlung lichen Leidens: Leber-, Herz- oder L ferner Verordnung harn- oder schweisstrei eventu-ll Abführmittel. Mässige roborire kohl-nsäurehältige Mineralwässer, Milch hender Gefahr *Punctio abdominis*. Zur Ent pischer Ansammlungen an den Extremit Scrotum d. So n t h e y'schen Capillartroica

- |  |  |
|--|--|
| <p>116. Rp. <i>Dect. r. Ononidis spin.</i><br/>e 10'0 ad 150'0,<br/><i>Extr. Scillae</i> 0'50,<br/><i>Syr. Juniperi</i> 15'0,<br/>S. Stündlich 1 Esslöffel.</p> <p>117. Rp. <i>Inf. Juniperi</i><br/>e 10'0 ad 150'0,<br/><i>Extr. Scillae</i> 0'20,<br/><i>Roob spin. cerv.</i> 20'0.<br/>S. Stündlich 1 Esslöffel.</p> | <p>118. Rp. <i>Decoc</i><br/>e<br/><i>Oxymellis</i><br/><i>S. Stündl</i><br/>Als Diaphor<br/><i>carpin</i></p> <p>119. Rp. <i>Ca</i><br/><i>Sacch.</i><br/><i>M. f. P. I</i><br/><i>S. 3 P</i></p> |
|--|--|

120. Rp. Citr. Coffein. 2'0,  
Sacch. alb. 5'0,  
M. f. Pul. div. in dos. = 10.  
S. Jede 2. Stunde 1 Pulv.  
Zu eventuellen Einreibungen  
auf das Abdomen:

121. Rp. Camphorae 2'0,  
Pulv. Scillae 2'5,  
Extr. Belladonn. 1'0,  
Ung. Hydr. 5'0,  
Vasellini 15'0.  
S. 3mal tägl. einzureiben.

**Asphyxie.** Entfernung eines eventuellen fremden Körpers aus den Luftwegen. Zufuhr von frischer Luft; erhöhte Lagerung des Kopfes, Beseitigung der die Respiration hindernden Kleidungsstücke, sodann Anwendung von Hautreizen. Beim Scheintod der Neugeborenen: Entfernung des Schleims aus der Mundhöhle, künstliche Respiration, Hautreize.

**Asthma bronchiale, Krampf der Bronchien.** Forschung nach einem ursächlichen Leiden (Nase, Rachen). Behufs Unterdrückung der Anfälle: Meidung grellen Temperaturwechsels und gewisser Temperaturgrade, ferner reizender Speisen und Getränke. Luft- oder Klimaänderung zuweilen von Nutzen; pneumatische Behandlung, Anwendung von verdünnter und verdichteter Luft. Bewegung im Freien. Während des Anfalles, falls Abreibungen nicht zum Ziele führen. Inhalationen v. Chloroform, Amylnitrit u. Joduraethyl; Sinapismen, heisse Fussbäder; Eispillen.

122. Rp. Morfii muriat. 0'10,  
Sacch. alb. 2'0,  
M. f. Pul. div. in dos. = 5.  
S. Beim Anfalle 1 Pulver.

123. Rp. Pulv. rad. Ipecac.,  
Extr. Hyoscium. aa. 0'20,  
Chinini sulf. 1'0,  
Sacch. alb. 2'0,  
M. f. Pul. div. in dos. = 10.  
S. Jede 3. Stunde 1 Pulver.

124. Rp. Extr. Belladonn. 0'50,  
Pulv. r. Ipecac. 3'0,  
Extr. Tarax. q. s.,  
u. f. pil. Nr. 20.  
S. Täglich 5 Pillen.

125. Rp. Aetheris sulf. 2'0,  
Extr. Belladonn. 0'05,  
Aq. Laurocer. 5'0,  
Aq. destill. 100'0,  
Syr. cort. aur. 15'0.  
S. Stündlich 1 Esslöffel.

Während des Anfalles:

126. Rp. Chloral. hydrat. 3'0,  
Syr. simpl. 30'0.  
S. Auf 1mal zu nehmen.

127. Rp. Natr. nitros. 0'50,  
Aquae dest. 150'0.  
S. 3—4 Esslöffel tägl.  
(Sodium-Nitrit. Vorsicht!)

Inhalationen v. je 4—5 Gr.  
Aq. Laurocerasi mittelst  
Dampfapparat, Ferner:

128. Rp. Amylacther. nitr. 5'0,  
Olei Foeniculi 10'0,  
S. Im Anfalle 2—5 Tropf.  
auf ein Taschentuch zu in-  
haliren (Amylnitrit).

129. Rp. Aether. hydrojod. 5'0,  
S. 5 Tropfen 6—8mal,  
täglich zu Inhalationen,  
(Joduraethyl).

130. Rp. Paraldehyd. 2—3'0,  
Aquae dest. 100'0,  
Syr. simpl. 20'0.

S. Auf 2mal im Zwischen-  
räume v. 20 Min. z. n.

131. Rp. Natr. chloral.  
Natr. carb. aa. 1'0,  
Aq. dest. 200'0.  
S. Zur Inhalation.

132. Rp. Kal. jodat. 5'0,

Aq. dest. 150'0,

Syr. cort. aur. 15'0.

S. 3 Esslöffel täglich.

Bei typischem Auftreten

Chinin vor dem Anfalle.

Gegen nervöses Asthma:

133. Rp. Tinct. Lobeliae,

Aeth. acet. aa. 5'0.

S. Jede  $\frac{1}{2}$  Stunde 10—20

Tropfen.

134. Rp. Vini stibiat.,

Tinct. Lobeliae aa. 5'0

Liq. Ammon. anis. 1'0.

S. Im Anfalle jede  $\frac{1}{4}$  S

10 Tropfe

135. Rp. Extr. Quebracho

50'0

S. 3mal tägl. 1—2 Thee

löffel.

Ebenso: Tinct. Quebracho

**Atelectasia pulmonum, Verdichtung der Lungen**

Bei Neugeborenen tiefe Expirationen hervorzurufen

(Schreien); Reinigung des Mundes von Schleim; bei

Kindern mit Bronchitis capillaris Entfernung des

Schleims durch Brechmittel. Rhum, Cognac, Thee.

136. Rp. Tartar. stib. 0'10,

Mixt. gummos. 30'0.

S.  $\frac{1}{4}$ stündl. 1 Kinderlöffel

(bis Erbrechen erfolgt).

137. Rp. Inf. rad. Ipecac.

e 0'50 ad 100'0.

Syr. rub. Idaci 15'0.

S.  $\frac{1}{4}$ stündl. 1 Kinderlöffel.

138. Rp. Liq. ammon. anis. 20'0.

S. 2—5 Tropfen i. Wasser.

139. Rp. Vin. stibiat.,

Oxym. Scillae aa. 15'0

S. Alle 10 Min. 1 Kinder

löffel (bis Erbrechen er

folgt).

140. Rp. Aetheris sulf. 10'0

S. 1—2 Tropf. in Wasser

141. Rp. Camphorae ras. 0'10

Linct. gummos. 50'0.

S. Kaffeelöffelweise.

**Balanoposthitis, Eicheltripper.** Reinigung mit lauen

Wasser, sodann mit Medicamenten. Sorgfältige Isoli

rung der Eichel von der Vorhaut durch Einlagen von

trockener Baumwolle oder Leinwand. Geschwüre und

andere Verletzungen erheischen spezielle Behandlung

142. Rp. Kal. chlorici 2'0,

Aq. destill. 200'0.

S. Aeusserlich.

143. Rp. Plumb. ac. bas. sol. 5'0,

Aq. destill. 200'0.

S. Aeusserlich.

144. Rp. M. subl. corr. 0'20

Aq. destill. 200'0.

S. Zum Abspülen.

145. Rp. Calcar. chlorat.

Aq. destill. 200'0.

S. Aeusserlich.

vide: Ulcus, Sklerosis, Phimosis.

**Blasenkatarrh** vide: Catarrhus vesicae.**Blennorrhoea Conjunctivae** vide: Conjunctiv**Blennorrhoea neonatorum, Augenblennorrh****Neugeborenen.** Höchste Ansteckungsgefahr

zweite Auge und für die Augen der Umg

sorgfältige und sehr häufige Reinigung des

Lösung von hypermangansaurem Kali; M

Zimmertemperaturen, von Staub, Rauch

irung des Lichtes; Touchirung mit

uch Belladonnasalbe auf Stirn und Sel

lactisch: Auswaschung der Augen von Neugeborenen mit 1—2%iger Carbolsäure unmittelbar nach dem Bade und Einträufelung eines Tropfens einer 2%igen Lapislösung empfohlen.

146. Rp. *Argent. nitr. cryst.*  
0'5—1'0,

*Aquae destill. 50'0.*

S. Zu Händen des Arztes  
(1—2%ige Lösung; tägl.  
1—2mal zu bepinseln).

147. Rp. *Argent. nitr. cryst.*  
0'10—0'30,

*Aquae destill. 50'0.*

S. Zum Bepinseln (2—6%<sub>100</sub>).  
Bei Abnahme d. Secretion  
d. schwächere Lösung.

Bei Erscheinungen sei-  
tens d. Cornea mit Vor-  
sicht Atropin:

148. Rp. *Atropini sulfur. 0'02,*  
*Aquae destill. 10'0.*  
S. Augentropfen.

149. Rp. *Atropini sulf. 0'05,*  
*Vaselini 5'0.*  
M. exactissime.

S. Ein erbsengr Stück in  
den Conjunctivalsack.

150. Rp. *Kal. hypermang. 0'10,*  
*Aquae dest. 100'0.*

S. Waschwasser (mit  
Wasser zu verdünnen bis  
zu rosarother Färbung).

### Blennorrhoea urethrae, Tripper der Harnröhre.

Bei acuten Formen mit reichlicher Pyorrhoe, Ent-  
zündung und ödematöser Schwellung in der Umgebung  
der Harnröhrenmündung, nebst Schmerzhaftigkeit im  
Verlauf der Harnröhre: kalte Umschläge, möglichste  
Ruhe; später Injectionen; strenge Diät: kein Bier oder  
Wein, keine reizenden Speisen; leichte Abführmittel;  
Suspensorium; wenig Bewegung. Statt der Injectionen  
auch innerliche Mittel gegen den Tripper gebräuchlich.

151. Rp. *Plumb. acet. bas. sol. 2'0,*  
*Aq. destill. 100'0.*

S. Einspritzung. (Bei  
phlegmonösen Zuständen  
auch zu Umschlägen.)

152. Rp. *Thallini sulf. 1'0,*  
*Aquae destill. 100'0.*

S. Injection.

Nach Abnahme der Ent-  
zündungserscheinungen:

153. Rp. *Zinci sulfur. 0'20,*  
*Aq. destill. 100'0.*

S. Einspritzung.

154. Rp. *Zinci acet. 0'20,*  
*Aquae destill. 100'0.*

S. Aeusserlich.

155. Rp. *Collyr. adstr. tut. 25'0,*  
*Aquae dest. 150'0.*

S. Aeusserlich.

156. Rp. *Zinci sulfur.,*  
*Alumin. crud. an. 0'30,*  
*Aq. destill. 100'0.*  
S. Einspritzung.

157. Rp. *Acid. boríc. 5'0,*  
*Aquae dest. 150'0.*

S. Aeusserlich.

158. Rp. *Zinc. sulfur. 0'30,*  
*Plumb. acet. bas. sol. 1'0,*  
*Aq. dest. 100'0.*

S. Zu Injectionen.

159. Rp. *Cadmii sulf. 0'20,*  
*Aq. destill. 100'0.*

S. Einspritzung.

160. Rp. *Chlorali hydr. 2'0,*  
*Aq. dest. 100'0.*

S. 2mal tägl. zu injic.

161. Rp. *Resorcini pur. 2'0,*  
*Aquae dest. 150'0.*

S. Einspritzung.

162. Rp. *Saloli 10'0,*  
*Gumm. arab. 5'0,*  
*Aquae destill. 200'0.*

S. Einspritzung.

Innerliche Mittel gegen  
Tripper bei Mangel  
zündlicher Erscheinung



163. Rp. Bals. Copaiv. 30'0.  
S. Fr., Mitt. u. Ab. je 10 Tr.

164. Rp. Bals. Copaiv. gtt's 10,  
Exhibe in caps. gelatinos.,  
Dentur tales dos. Nr. 50.  
S. Früh, Mittags u. Abends  
2—3 Kapseln.

165. Rp. Balsami Copaiv. 5'0,  
Cerae flav. ras. 2'0,  
Pulv. Cubebaram q. s.  
u. f. pil. Nr. 50.  
S. 5—10 Stück täglich.

166. Rp. Pulv. Cubeb. rec. tus.  
30'0.  
Die. in dos. aeq. Nr. 20.  
S. 3 Pulver täglich.

167. Rp. Pulv. Cubeb. rec. tusi,  
Ext. Cubeb. alcohol. aa. q. s.  
u. f. pil. pond. 0'20. Nr. 50  
Consp. s. Lycop.  
S. 3mal täglich je 3 St.

168. Rp. Ol. lign. Santali 25'0.  
S. 20—30 Tropfen des  
Tags.

Bei chronischem  
Tripper:

169. Rp. Kal. hypermg. 0'05,  
Aq. destill. 100'0.  
S. Einspritzung.

170. Rp. Bismuth. subnit. 1'0,  
Aq. destill. 100'0.  
S. Einspritzung.

171. Rp. Zinci sulfur.,  
Acet. Lithargyr. aa. 0'50,  
Aqua destill. 100'0.  
S. Aeusserlich.

172. Rp. Merc. praec. rubr. 0'5,  
Vasellini 10'0.  
S. Salbe (zur Befettung  
von in die Harnröhre ein-  
zuführenden Bougies).

173. Rp. Arg. nitrici 0'2,  
Glycerini,  
Butyr. Cacao aa. q. s.,  
u. f. bacill. long. Cm. 5,  
crass. Mm. 3 Nr. 10.  
S. Abends 1 St. in die  
Harnröhre zu legen.

174. Rp. Alum. crud. 1'0,  
Butyr. Cacao q. s.,  
F. suppos. urethr. Nr. 5.  
S. Wie das Vorige.

Statt Alaun Tannin 0'30  
bis 0'50 oder Sulf. Zinci  
0'15—0'30.

175. Rp. Tannini pur. 5'0,  
Opil in pulv. 0'30,  
Glycerini pur. q. s.  
u. f. bacilla Nr. 10.  
S. Befettet in die Harn-  
röhre einzuführen. (Tanno-  
glycerin-Stäbchen,  
etwa 5—10 Cm. lang und  
4—5 Mm. i. Durchmesser.)

176. Rp. Tannini pur. 0'10,  
Geladini q. s.  
u. f. bacillae urethrales.  
Dentur tales doses N. 10.  
S. Täglich 2mal in die  
Harnröhre einzuführen.  
(Gelatinstäbchen.  
Ebenso kann auch Plumbum  
ac., zincum sulf. etc. ver-  
ordnet werden.)

177. Rp. Ol. Cacao 100'0,  
Cerae flav. 2—5'0,  
Argent. nitr. 1'0.  
Bals. Peruv. 2'0.  
S. Salbe (erwärmt zum  
Eintauchen v. Metallson-  
den oder canell. Sonden).

178. Rp. Alum. crud.,  
Zinc. sulf.,  
Ac. carbol. aa. 0'5—1'0.  
Aq. dest. 500'0.  
S. Aeusserlich. (Erwärmt  
mit Irrigationskatheter  
einzuspritzen.)

179. Rp. Kal. hypermag.  
0'10—0'50,  
Aqua dest. 500'0.  
S. Wie das Vorige.

180. Rp. Nitr. Arg. 0'20—1'0,  
Aq. dest. 500'0.  
S. Wie das Vorige.

Bei Ermittlung der er-  
krankten Partie der Harn-  
röhre mit Hilfe des Ende-  
skops Bepinselungen u

Lapis- oder Jodtinctur:  
 181. Rp. *Arg. nitr. crist. 10*,  
*Aquae destill. 200*.  
*S. Zum Bepinseln.*

Vide Chorda, Haematu-  
 rie und Catarrhus  
 vesicae.

**Blennorrhoea vaginae** vide: Fluor albus.

**Blepharadenitis, Lidranddrüsenentzündung.** Sorgfältige Entfernung der vorerst befeuchteten und erweichten Borken und Krusten, Reinigung der Augen mit lauwarmem Wasser oder Thee. Allabendliche Anwendung der verordneten Salbe durch längere Zeit; bei habituellen Formen reizlose Diät, solvirende Mittel, Eisen innerlich etc.

182. Rp. *Merc. praec. flavi 0.20*,  
*Vaselini 50*.

*M. exactiss. f. Ung. ophth.*

*S. Salbe.* (Stecknadelkopfgross vor d. Schlafengehen an d. Lidrand einzureiben.)

183. Rp. *Merc. praec. flavi 0.15*,  
*Vaselini 50*.

*Laudan. liq. Sydenh. gtts 5*.

*S. Salbe* (wie d. Vorige).

184. Rp. *Merc. praec. alb.*  
*Florum Zinc. aa. 0.15*,  
*Vaselini 50*.

*S. Salbe* (wie oben).

185. Rp. *Jodoformi pur. 10*,  
*Vaselini 100*.

*S. Salbe.*

186. Rp. *Jodoformi desod.*

*pulv.*

*Sacch. Lactis aa 50*,

*S. Streupulver.*

Bei Geschwürsbild Touchirung mit Lapis in Substanz; bei Schuppenbild. Bepinsel. mit Oleum Cadini; ferner:

187. Rp. *Ung. Diach. Hebr. 100*.

*S. Salbe* (auf Leinwandstreif. messerrückendick gestrichen, aufzulegen).

188. Rp. *Empl. Diach. simpl.*

*Vaselini aa. 100*,

*Olei Bergamott. 0.20*.

*S. Salbe* (wie d. Vorige).

**Bright'sche Niere** vide: Morbus Brighti.

**Bronchialblutung** vide: Haemoptoe.

**Bronchiectasie.** Behandlung des Bronchialcatarrhs (v. Catarrhus pulm.), Balsamica int. und Inhalationen.

189. Rp. *Ol. Terebinth.*

*Gumm. Res. amm. aa. 50*,

*P. et extr. r. Acor. aa. q. s.*

*u. f. pil. Nr. 50*.

*S. Früh, Mittags und Abends je 5 Pillen.*

190. Rp. *Bals. Peruolan. 200*,

*Ol. Terebinth. 20*,

*S. Früh, Mittags und*

*Abends je 10 Tropfen.*

Inhalationen von Latschenkieferöl oder Acid. carb.

**Bronchitis** vide: Catarrhus pulmonum.

**Bubo** vide: Adenitis inguinalis.

**Carcinoma mammae, Brustdrüsenkrebs.** Bei unverletzter Haut Jodsalbe oder Pflaster; rechtzeitig Operation; bei zerfallener Haut Sorge für Reinlichkeit.

Anwendung desinficirender Mittel; schmerzstillende oder kräftigende Mittel innerlich je nach Bedarf; zuweilen solatii causa ein indifferentes Medicament.

191. Rp. Kal. hydrojod. 10,  
Jodi pur. 0'10,  
Vasellini 20'0.  
S. Salbe.

192. Rp. Kali chlorici 5'0,  
Aquae destill. 200'0.

S. Aeusserlich (zur Reinigung einer eventuellen Wundfläche). Oder:

193. Rp. Kali hypermang. 10,  
Aquae destill. 200'0.  
S. Aeusserlich.

194. Acid. carbol. 2'0.  
Aquae destill. 200'0.  
S. Aeusserlich.

195. Rp. Ung. Plumb. ac. 20'0.  
S. Salbe.

Bei Bedarf robörirernde Mittel verordne man Chinin oder Eisen.

196. Rp. Dec. cort. Chin. r. r. t.  
e 20'0 ad 150'0,  
Syr. rub. Idaci 20'0.  
S. Früh, Mittags und Abends je 2 Esslöffel.

197. Rp. Extr. Chinac. reg. 5'0,  
Vini malacensis 100'0.  
S. 3—4 Esslöffel täglich.

198. Rp. Ferr. carb. sacch.,  
Elaeosacch. Mac. aa. 2'0.  
M. f. Pul. div. indos. = 10.  
S. Früh, Mittags und Abends 1 Pulver.

199. Rp. Chinin. sulf.,  
Ferr. oxyd. oxydul.,  
Sacch. alb. aa. 10,  
M. f. Pul. div. indos. = 10.  
S. Früh u. Abends 1 Pulver.

Kleine Knoten mittelst Thermocauters v. Pacquelin zu beseitigen.

Aeltere Aetzmittel:

200. Rp. Cinnabaris fact. 15'0,  
Carb. ossium 10,  
Sangu. Dracon. 15,  
Acid. arsenic. 5'0,  
M. f. Pulver.

S. Zu Handen des Arztes. (Sog. Pulvis arsenicalis Cosmi, u. z. mit Wasser zu einer Pasta geformt, mittelst Pinsel anzutragen. — Aetzmittel.)

201. Rp. Auri chlorati,  
Zinci chlorati,  
Stibii chlorati,  
Bromi chlorati aa. 2'0,  
Pulv. Liquiritiae q. s.,  
u. f. pasta,  
S. Aetzmittel. (Landel-fische Pasta.)

202. Rp. Zinci muriat. 5'0,  
Farinae Tritici 15'0,  
M. f. Pulver.  
S. Zu Handen des Arztes. (Sog. Chlor-Zinkpasta = Canquoin'sche Pasta.)

### Carcinoma uteri, Gebärmutterkrebs.

Operation im Beginne der Entwicklung; im vorgeschrittenen Stadium symptomatische Behandlung; Sorge für Reinhaltung und Desinfection, Erhaltung der Kräfte durch robörirende Nahrung und Medicamente; Meidung von körperlichen und geistigen Anstrengungen; bei Blutungen: Bettruhe, Einspritzung, Tamponade, eventuell Cauterisation; bei Schlaflosigkeit und Schmerzen Narcotica. Gegen Ueblichkeit, Erbrechen: Eispillen Sodawasser, Aqua Laurocerasi etc.

203. Rp. *Kali chlorici* 10·0,  
*Aquae destill.* 1000·0.  
*S. Einspritzungen.*
204. Rp. *Kal. hypermang.* 10·0,  
*Aquae destill.* 150·0.  
*S. 1 Kaffeecl. in ½ Liter*  
*Wasser zu Einspritzungen.*
205. Rp. *Calcar. chlorat.* 5·0,  
*Aquae destill.* 500·0.  
*S. Einspritzung.*
206. Rp. *Acid. carbol.* 5·0,  
*Aquae destill.* 500·0.  
*S. Einspritzung.*
- Bei häufigem, profusem,  
 blutigem Ausflusse:
207. Rp. *Ferr. sesq. sol.* 5·0,  
*Aquae destill.* 500·0.  
*S. Einspritzung. (Macht*  
*Flecke.)*
208. Rp. *Jodoformi* 5·0,  
*Glycerini* 40·0,  
*Aq. dest.* 10·0,  
*Gummi Tragacanth* 0·30.  
*S. Zum Verband.*
209. Rp. *Ellix. acidi Hall.* 10·0,  
*Syr. rub. Idaei* 50·0.  
*S. Zusatz zum Getränk.*
210. Rp. *Succi Citri,*  
*Syr. rub. Idaei aa.* 20·0.  
*S. Zusatz zum Getränk.*
211. Rp. *Acid. tartar.* 1·0,  
*Syr. Ribium* 20·0,  
*Aquae destill.* 400·0.  
*S. Zum Getränk.*
212. Rp. *Acidi sulf. dil.* 5·0,  
*Aquae destill.* 400·0,  
*Syr. rub. Idaei* 20·0.  
*S. Zum Getränk.*

Bei Schlaflosigkeit und  
 Schmerzen:

213. Rp. *Morfii muriat.* 0·10,  
*Sacch. alb.* 3·0,  
*M. f. P. div. in dos. = 10.*  
*S. Jeden Abend 1 bis*  
*2 Pulver.*
214. Rp. *Morfii muriat.* 0·10,  
*Aquae Laurocer.* 10·0.  
*S. 10 Tropfen auf*  
*Zucker.*
215. Rp. *Morf. mur.* 0·10,  
*Butyr. Cacao q. s.*  
*u. f. supposit. Nr. 10.*  
*S. Jeden Abend 1—2 Stück*  
*zu verwenden.*
216. Rp. *Extr. Laud. aq.* 0·20,  
*Butyr. Cacao q. s.*  
*u. f. supposit. Nr. 10.*  
*S. Jeden Abend 1—2 Stück*  
*zu verwenden.*

Als Hypnoticum auch:

217. Rp. *Cannabini tannic.*  
 1·0—1·50,  
*Sacch. alb.* 5·0,  
*M. f. P. div. in dos. = 10.*  
*S. Abends 1 Pulver z. n.*

Als Ätzmittel Jodphenol  
 empfohlen (1 Th. Jod auf 4 Th.  
 flüssig gemachte Carbol-  
 säure) mittels Watte auf  
 den Cervix und in dessen  
 Canal zu appliciren.

**Carcinoma ventriculi.** Symptomatische Behandlung  
 neben roborirender Diät; daher Mittel gegen Erbrechen,  
 (Eispillen, Sodawasser), gegen Magenblutungen, gegen  
 Schmerzen; Sorge für Stuhlgang; Milch oder Fleisch-  
 brühen je in kleinen Mengen, Leube-Rosenthal-  
 sche Fleischsolution. Salzsäure nach der Mahlzeit.  
 (Vgl. Catarrhus und Ulcus ventriculi.) Gegen die dys-  
 peptischen Erscheinungen Condurango. Rohes  
 Fleisch, Rothwein, Buttermilch empfohlen.

Behufs künstlicher Ernährung per anum Clyst  
 mit Pepton, ferner Fleischpancreaslysti

LANE LIBRARY



bestehend aus 300 Gramm feingehacktem Fleisch und 100 Gramm Bauchspeichel, welches Quantum nach vorausgeschicktem Reinigungsclystiere auf 2 mal (12 Uhr Mittags, 6 Uhr Abends) zu verabreichen ist.

218. Rp. *Cort. Condurango* 15' 0.  
*Mac. p. hor. XII. c. Aq.* 360' 0.  
*Dein coq. ad reman.* 180' 0.  
*S.* 2—3 Esslöffel tägl.

219. Rp. *Extr. Condurango* 2' 0.  
*Chloral. hydr.* 1' 0.  
*Aquae dest.* 150' 0.  
*Syr. cort. aur.* 20' 0.  
*S.* 3—6 Esslöffel täglich.

220. Rp. *Vin. Condurango* 30' 0.  
*S. Theelöffelweise vor dem Essen.*

bei übelriech. Aufstossen:

221. Rp. *Natr. saticyl.* 1' 0.  
*Natr. bicarb.* 6' 0.  
*S. Messerspitze nach dem Essen.*

Gegen Erbrechen:  
 222. Rp. *Argent. nitr.*  
*Extr. Belladonn. aa.* 0' 50.  
*Aq. dest.* 30' 0.  
*S.* 3mal täglich 15—20 Tropfen in Zuckerwasser.  
 Gegen Flatulenz 5—10 Tröpf.  
*Liq. Ammon. anis. oder Ol. Cajeputi.* 2—3mal täglich einige Tropfen.

**Cardialgie, Magenkrampf.** Berücksichtigung des ursächlichen Momentes; jedenfalls Regelung der Diät; Narcotica gegen die Schmerzen; Eisen bei Chlorotischen. Nützen die innerlichen Mittel nicht rasch genug, oder bei intensivem Anfall subcutane Morphinum-injection.

223. Rp. *Mog. Bismuth.* 2—5' 0.  
*Morf. muriat.* 0' 10.  
*Natr. bicarb.*  
*Sacch. alb. aa.* 2' 0.  
*M. f. Pulv. div. in dos. = 10.*  
*S. Früh u. Abends 1 Pulv.*

224. Rp. *Magist. Bism.* 2—5' 0.  
*Extr. Belladonn.* 0' 10.  
*Natr. bicarb.*  
*Sacch. alb. au.* 2' 0.  
*M. f. P. div. in dos. = 10.*  
*S. Früh u. Abends 1 Pulv.*

225. Rp. *Extr. Belladonn.* 0' 2.  
*Liq. Ammon. anis.* 2' 0.  
*Aquae dest.* 10' 0.  
*S. 2ständl. 10—20 Tropfen.*

226. Rp. *Aquae Laurocer.* 10' 0.  
*Mur. Morfi* 0' 10.  
*S. Tropfen (wie d. Vor.).*

227. Rp. *Tinct. Castorei.*  
*Tinct. Nuc. vom. aa.* 5' 0.  
*S. 10 Tropfen während des Anfalles.*

228. Rp. *Morf. mur.* 0' 05.  
*Elaeosacch. Anisi* 2' 0.  
*M. f. P. div. in dos. = 5.*  
*S. Während des Anfalles 1 Pulver.*

229. Rp. *Chloral hydrat.* 10' 0.  
*Div. in dos. = 10.*  
*S. In einem Glas Wasser aufgelöst je 1 Stück z. n.*

**Catarrhus bronchialis** vide: Catarrhus pulmon.

**Catarrhus intestini, Darmcatarrh, Diarrhoe.** Acut:

*Bettruhe*; warme Cataplasmen, Amylum-Clystiere; zum Getränke schleimige Mittel, warmer Thee; Diät: Schleimsuppe. Gegen Schmerzen in der Magengegend kalte Umschläge, oder subcut. Morphinum-Injection.

*Chron.*: Ermittlung des ursächlichen Momentes: ein Abführmittel oder Clysm., wenn harte Kothmassen im Colon sind; passende Diät: leicht verdaulich

Nahrung (Milchcur). Warme Leibbinde; möglichste Schonung vor Erkältung und vor Diätfehlern; Carlsbader Wasser; in gewissen Fällen Kaltwassercur; (vide Obstipatio alvi).

230. Rp. Decoct. r. Salep. 150°0,  
Laudan. pur. 0°10,  
Syr. Diacodii 20°0.  
S. Stündlich 1 Esslöffel.
231. Rp. Mixt. gummos. 150°0,  
Extr. Opii aq. 0°10.  
S. Stündlich 1 Esslöffel.
232. Rp. Mixt. gummos. 150°0,  
Tinct. Laud. simpl. gtts 20.  
S. Stündlich 1 Esslöffel.
233. Rp. Dec. lign. Campech.  
e 10°0 ad 150°0,  
Tinct. Laud. simpl. gtts 15,  
Syr. cort. aurant. 15°0.  
S. Stündlich 1 Esslöffel.  
Bei stärkerer, länger anhaltender Diarrhoe mit Kolik:
234. Rp. Dec. ligni Campech.  
e 20°0 ad 200°0,  
Laud. liq. Syd. gtts 20,  
Syr. cort. aur. 20°0.  
S. Jede 2. Stunde 1 Essl.
235. Rp. Cotoini pur. 1°0,  
Emuls. amygd. 50°0.  
S.  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  St. je 2 Essl.
236. Rp. Cotoini pur. 1°0,  
Aether. acct. 4°0.  
S. Sube. 1 Spr.  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  St.
237. Rp. Tinct. Coto e plant.  
rec. pur.  
Tinct. Laud. spl. aa. 5°0.  
S. 2stündlich 5—10 Tropf.
238. Rp. Decoct. rad. Ratanh.  
e 15°0 ad 150°0,  
Tinct. Opii simpl. 1°0,  
Syr. cinnamom. 15°0.  
S. Jede 2. Stunde 1 Essl.
239. Rp. Laudani pur. 0°20,  
Tannini pur.,  
Sacch. alb. aa. 2°0.  
M. f. P. div. in dos. = 10  
S. Stündlich 1 Pulver.
240. Rp. Tannini pur. 1°0,  
Morf. mur. 0°10,  
Sacch. alb. 5°0,  
M. f. Pulv. div. in dos. = 10.  
S. Fr., Mitt. u. Ab. 1 Pulv.
241. Rp. Pulv. Dower. 1°0,  
Tannini pur.,  
Extr. Colombo aa. 0°50,  
Sacch. alb. 2°0.  
M. f. P. div. in dos. = 5.  
S. Stündlich 1 Pulver.  
Zweckmässig ist die Verordnung des Tannin als Tanninalbuminat:
242. Rp. Tannini pur. 2°0,  
Aq. dest. 100°0.  
Adde agitando  
Sol. album. ovi un. 100°0.  
S. Jede 2. Stunde 1 Essl.
243. Rp. Laudani pur.,  
Plumb. ac. aa. 0°20,  
Pulv. gummos. 2°0,  
M. f. P. div. in dos. = 5.  
S. Jede 2. Stunde 1 Pulver.
244. Rp. Laudani pur. 0°20  
Sacch. alb. 2°0.  
M. f. Pulv. div. in dos. = 5.  
S. Jede Stunde 1 Pulver.
245. Rp. Pulv. Dower. 1°0,  
Extr. Colombo,  
Sacch. alb. aa. 2°0.  
M. f. P. div. in dos. = 10.  
S. Jede 2. Stunde 1 Pulver.
246. Rp. Decoct. r. Salep. 200°0,  
Tinct. Laud. simpl. 2°0.  
S. Zum Clystier.
247. Rp. Acid. carbol.  
Spir. vin. aa. 1°0.  
Aque dest. 500°0.  
S. Clysma (zur Darmausspülung nach Heg

248. Rp. *Tinct. amarac*,  
*Tinct. Ratanh.*,  
*Tinct. Cinnam. aa.* 10°0.  
*S. Tropfen* (b. Appetitlos.).  
 Bei hartnäckiger Diarrhoe  
 wird auch empfohlen:

249. Rp. *Zinci oxydat*  
*Natri bicarbon.* 0°  
*Div. in dos.* = 5.  
*S. Alle 3 Stunden 1*  
*Vide Colica flatule*

Beim Enterocatarrh der Kinder ist die Diät zu regeln: Fleischbrühe, Schleimsuppe, Eiweisswasser, Fleisch. Bei Diarrhoea ab lactatorum Aussetzen je nach Alter. Milch- oder Milchnahrung, Ersatz durch Suppe mit Eiweiss. Bei heftiger Diarrhoe Minimum von Nahrung. Bei Kindern unter 1 Jahre womöglich Ammenmilch, Regelung der Diät. Rahmgemenge ( $\frac{1}{2}$  Liter süsser Rahm,  $\frac{3}{4}$  Liter Wasser, 15 Gramm Milchzucker). Clystiere mit Amygdali Leinsamen oder Decoct. Salep. Bei Durst Sodawasser, Thee, Cognac.

250. Rp. *Pulv. Doveri* 0°20,  
*Sacch. alb.* 5°0,  
*M. f. Pulv. div. in dos.* = 10.  
*S. 3mal täglich 1 Pulver.*
251. Rp. *Chinini tannic.* 1°0,  
*Pulv. Doveri* 0°20,  
*Sacch. alb.* 2°0,  
*M. f. Pulv. div. in dos.* = 10.  
*S. 3stündlich 1 Pulver.*  
 (Auch bei Kolik mit intermitt. Charakter.)
252. Rp. *Paullin. sorb.* 1°0,  
*Pulv. Dover.* 0°20,  
*Sacch. alb.* 5°0,  
*M. f. Pulv. div. in dos.*  
 = 10.  
*S. 3stündlich 1 Pulver.*
253. Rp. *Decoct. r. Salep.* 80°0,  
*Tinct. Ratanh. gtts* 20,  
*Tinct. Laud. spl. gtts* 1—2,  
*Syr. simpl.* 10°0.  
*S. Stündl. 1 Kindertöf.*
254. Rp. *Inf. cort. Cascarillae*  
*conc.* e 10°0 ad 80°0,  
*Syr. Chamomillae* 10°0.  
*S. Jede 2. Stunde 1 Kindertöf.*
255. Rp. *Inf. rad. Co.*  
*e 10°0 ad 80°0*  
*Syr. rub. Idaei* 10°0  
*S. Jede 2. Stunde 1 Kindertöf.* (eventuell 2 Tropfen *Tinct. Lauro-cerasi* simpl. hinzuzufügen)
256. Rp. *Tinct. Coto* 10°0  
*S. 5—10 Tropfen*  
*3mal täglich.*
257. Rp. *Cotoini* 0°10,  
*Sacch. alb.* 5°0,  
*M. f. P. div. in dos.*  
*S. 3—5 Pulver täglich*
258. Rp. *Ferr. sesq. sol.* 10°0  
*Aquae destill.* 80°0  
*Syr. simpl.* 10°0.  
*S. Jed. 2. St. 1 Kinderlöf.*  
 Bei drohendem Collaps  
 Thee mit oder ohne  
 Liq. Amm. anis, Spir. Aeth. innerlich.
259. Rp. *Argillae depur.*  
*Aq. dest.* 50°0,  
*Tinct. Op. benz.* 2°0  
*Syr. cinnam.* 15°0.  
*S. 2—3stündl. 1 Theelöf.*

*Catarrhus laryngis* vide: Laryngitis.

*Catarrhus pharyngis, Rachencatarrh.* Häufige Ursache: Erkältung, gelte mit Salbei- oder Eibischthee, öfters kleine Mengen von Milch, Mandelmilch u. dgl., kalte oder scharfe Nahrung, reizende Umschläge um den Hals.

260. Rp. Kal. chlorici 5'0,  
Aqua destill. 500'0,  
Syr. Moror. 20'0.  
S. Mundwasser.

261. Rp. Alum. cr. pulv. 10'0,  
Aqua destill. 500'0,  
Syr. cort. aur. 20'0.  
S. Mundwasser.

262. Rp. Acidi salicyl. 1'0,  
Kal. chloric. 2'0,  
Aqua destill. 300'0.  
S. Mundwasser.

263. Rp. Boracis venet. 5'0,  
Aqua destill. 500'0,  
Syr. Diacod. 20'0.  
S. Mundwasser.

264. Rp. Decoct. rad. Ratanh.  
e 15'0 ad 200'0,  
Tinct. Myrrhae 3'0,  
Spir. Cochlear. 20'0.  
S. Zum Gurgeln.

Bei chron. Rachencatarrh  
Aetzungen m- dem Thermo-  
cauter, Einpinselungen.

265. Rp. Arg. nitr. cryst. 0'50,  
Aqua destill. 10'0.  
S. Zum Bepinseln.

266. Rp. Kal. jodat. 2'0,  
Jodi pur. 0'20,  
Glycerini 10'0.

S. Z. Bepinseln (nament-  
lich bei Pharyngitis sicca  
und syphilitica).

Gegen Schmerzhaftigkeit:

267. Rp. Cocaini mur. 0'20,  
Glycerini 2'0,  
Aqua dest. 8'0.  
S. Zum Bepinseln.

Bei Pharyngitis granulosa  
erfolgreich:

268. Rp. Merc. subl. corr. 0'2,  
Aqua destill.,  
Spir. vini conc. aa. 5'0,  
S. Zum Bepinseln.

Inhalationen von Lösungen  
von Alumen, Kal. chloricum,  
Tannin etc. Vide: Anhang.

# Catarrhus pulmonum acutus, Bronchitis acuta,

**acuter Lungencatarrh.** Ruhe und gleichmässig warme  
Temperatur sowohl des Zimmers als auch rücksichtlich  
der Bekleidung. Im Falle von capillärer Bronchitis  
mit Fieber oder bei catarrhalischer Pneumonie Brech-  
mittel. Zum Getränke Mandelmilch, Gleichenberger  
Wasser, Eibischthee. Diät nach Massgabe des vorhan-  
denen Fiebers. Application feuchtwarmer Tücher oder  
Fettlappen auf die Brust. Sorge für Entleerungen.

269. Rp. Inf. rad. Ipecacuanh.  
e 0'50 ad 150'0,  
Syr. cort. aur. 15'0.  
S. Jede 2. St. 1 Esslöffel.

Bei periodisch wiederkeh-  
render Schwerathmigkeit:

270. Rp. Inf. rad. Ipecacuanh.  
e 0'50 ad 150'0,  
Tinct. Laud. simpl. gtts 15,  
Syr. cort. aur. 15'0.  
S. Jede 2. Stunde 1 Ess-  
löffel voll.

271. Rp. Apomorph. mur.  
0'03—0'06.  
Morphi mur. 0'03.  
Ac. mur. dil. 0'50,  
Aq. dest. 150'0.  
S. 2—4stündl. 1 Esslöffel.

Bei reichlichem Expectori-  
ren passen die Decocta:

272. Rp. Dec. r. Alth. 200  
Tinct. Laud. simpl. gtts  
Syr. Ipecac. 20'0.  
S. Stündlich 1 Esslöffel.



**Catarrhus ventriculi acutus, acuter Magencatarrh.**

Beim einfachen „verdorbenen Magen“ strenge Diät durch 1—2 Tage; nur wenn Speisen noch im Magen vermuthet werden, ein Brech- oder Abführmittel; besser Auspülung des Magens. Schlucken von Eisstückchen, kalte Umschläge auf den Magen (wo sie vertragen werden). Beim gastrischen Fieber Bettruhe. Diät durch mehrere Tage nebst Regelung des Stuhlganges; gegen den Durst Sodawasser, Biliner, Giesshübler, Königswarter Richardsquelle, Radeiner; Krondorfer; Preblauer; bei eintretender Besserung sorgfältige Wahl der Speisen.

309. Rp. Pulv. Ipecac. ʒ50,  
Sacch. alb. ʒ50,  
M. f. Pulv. div. in dos. = 5.  
S. Alle 10 Min. 1 Pulver,  
bis Erbrechen erfolgt.

310. Rp. Pulv. Ipecac. ʒ0,  
Tartar. stibiat. ʒ10,  
M. f. Pulv. div. in dos. = 2.  
S. Brechmittel

311. Rp. Tartar. stibiat. ʒ0·05,  
Aqua destill. ʒ50·0.  
S. Brechmittel, auf 2mal  
innerhalb 10 Minuten z. n.

312. Rp. Apomorph. mur. ʒ0·10,  
Aqua dest. ʒ10·0.  
S. Zu subcut. Injectionen,  
( $\frac{1}{2}$ —1 Spritze zu injiciren.)

313. Rp. Natr. bicarb. ʒ0,  
Aqua destill. ʒ50·0,  
Aqua Lauroc. ʒ5·0,  
Syr. rub. Id. ʒ15·0.  
S. Stündlich 1 Esslöffel.

314. Rp. Natr. bicarb. ʒ0,  
Tinct. Nucis vom. gtt 10,  
Aqua destill. ʒ50·0.  
Syr. cort. aur. ʒ15·0,  
S. Stündlich 1 Esslöffel.

Gegen Brechreiz Eispillen,  
kohlensaure Wasser, event.  
Morfium subcut. oder als  
Suppositorien.

315. Rp. Aqua Lauroc. ʒ10·0,  
Morfi mur. ʒ0·10.  
S. Stündlich je 5 Tropfen  
auf eine Eispille.

Beim Erbrechen v. Speise-  
resten Erleichterung durch  
laues Wasser oder Thee.

Als einfaches Stomachicum:

316. Rp. Tinct. amarac ʒ30·0,  
Tinct. Nuc. vom. gtt 10·0.  
S. 15—20 Tropfen 4 bis  
5 Mal täglich.

317. Rp. Tinct. Chinae comp.,  
Tinct. Calam. arom. aa. ʒ10·0.  
S. Vor der Mahlzeit  
10 Tropfen auf Zucker.

318. Rp. Acid. muriat. ʒ50·0,  
Aqua destill. ʒ100·0.  
S. 3mal tägl. je 1 Esslöffel.

319. Rp. Extr. Gentian. ʒ0,  
Aqua destill. ʒ100·0,  
Elaeosacch. Menthac ʒ5·0.  
S. 3mal tägl. je 2 Esslöffel.

Bei Kindern keine Brech-  
mittel anzuwenden; strenge  
Diät, mildes Laxans, Giess-  
hübler, Radeiner, Sodawass.

320. Rp. Natr. bicarb. ʒ0,  
Aqua destill. ʒ100·0,  
Aqua Laurocer. ʒ10·0,  
Syr. rub. Iduri ʒ10·0.  
S. Stündl. 1 Kinderlöffel.

321. Rp. Natr. bicarb. ʒ0,  
Tinct. nucis vom. gtt 2,  
Aqua destill. ʒ100·0,  
Syr. cort. aur. ʒ10·0.  
S. Stündl. 1 Kinderlöffel.

322. Rp. Acid. mur. dil. gtt 6—8,  
Aqua destill. ʒ80·0.  
S. Früh, Mittags und  
Abends 1 Kinderlöffel.

Bei heftigem Erbrechen:

323. Rp. Bism. subnit. ʒ10,  
Pulv. Doveri ʒ10,  
Sacch. albi ʒ20.  
M. f. P. div. in dos. = 10.  
S. 2—3 Pulver täglich.

**Catarrhus ventriculi chronicus, chronischer Magen-**

**catarrh.** Ermittlung der Schädlichkeiten. Strenge und lang durchzuführende Ordnung in der Diät: Keine fetten und gewürzten Speisen, keine geistigen Getränke; keine Hülsenfrüchte, wenig Gemüse, nicht zu viel Flüssigkeit. Empfohlen wird Milch, besonders saure; leicht verdauliche, nicht fette Fleischsorten, weiche Eier. Mechanische Behandlung (Magenpumpe). Kaltwassercur. Karlsbader oder Marienbader Wasser.

324. Rp. *Natri bicarb.*,  
*Sacch. alb. aa.* 10'0.

*S. Messerspitzevoll 1/3 St.*  
*nach der Mahlzeit.*

325. Rp. *Natr. bicarb.* 5'0,  
*Extr. Belladonn.* 0'05.

*Sacch. alb.* 2'0.

*M. f. Pulv. div. in dos. = 5.*

*S. Früh u. Abends 1 Pulv.*

326. Rp. *Natr. bicarb.* 5'0,  
*Extr. Nucis vom.* 0'20.

*M. f. P. div. in dos. = 10.*

*S. Fr., Mitt. u. Ab. 1 Pulv.*

327. Rp. *Subnitr. Bism.* 0'50,  
*Sacch. alb.* 3'0.

*M. f. P. div. in dos. = 10.*

*S. Früh, Mittags u. Ab. 1 Pulv.*

328. Rp. *Pepsini germ.*,

*Sacch. alb. aa.* 2'0.

*M. f. Pulv. div. in dos. = 5.*

*S. 1/4 Stunde vor der*

*Mahlzeit 1 Pulver.*

Nach jeder Dose von Pepsin  
zu nehmen:

329. Rp. *Acid. mur. dil.* 1'0,  
*Aquae destill.* 200'0.

*S. Esslöffelweise.*

Bei Sodbrennen u. heftigen  
Schmerzen in der Magen-  
gegend (Gastralgie):

330. Rp. *Natr. salicyl.* 2'0,  
*Natr. bicarb.* 12'0.

*M. f. P. S. Messerspitze,*  
*nach dem Essen.*

331. Rp. *Subnitr. Bism.* 1'0,  
*Morf. muriat.* 0'05,

*Natri bicarb.*,

*Sacch. alb. aa.* 1'0,

*M. f. Pulv. div. in dos. = 5.*

*S. Früh u. Abends 1 Pulv.*

Bei Magenkrampf u. kolik-  
artigen Schmerzen:

332. Rp. *Aq. Laurocer.* 10'0,  
*Tinct. Nuc. vom. gttss* 10.

*S. Früh und Abends je*  
*10 Tropfen.*

333. Rp. *Aq. Laurocer.* 10'0,  
*Tinct. Belladonn.* gttss 10.

*S. Früh, Mittags und*  
*Abends je 10 Tropfen.*

334. Rp. *Bals. vitae Hoffm.*,  
*Aq. Coloniensis aa.* 20'0.

*S. Zur Einreibung in der*  
*Magengegend (bei heftiger*  
*Flatulenz). Oder:*

335. Rp. *Aq. Carvi* 100'0.

*S. 2 Esslöffel nach der*  
*Mahlzeit.*

336. Rp. *Aq. carminat.* 100'0.  
*S. Esslöffelweise.*

Gegend. sauren Geschmack  
im Munde Ausspülung mit  
einer Lösung von *Natr.*  
*bicarb.*; bei pappigem, bit-  
terem Geschmack mit ver-  
dünnten Säuren.

Bei reichlicher Schleim-  
bildung im Magen:

337. Rp. *Zinc. sulfur.* 0'20,  
*Sacch. alb.* 3'0.

*M. f. P. div. in dos. = 10.*  
*S. Früh u. Abends 1 Pulv.*

338. Rp. *Zinc. sulfur.* 0'50,  
*Aquae destill.* 150'0.

*Aquae Laurac.* 10'0.

*Syr. rub. id.* 20'0.

*S. Früh, Mittags u. Abends*  
*1 Esslöffel.*

24 Catarrh. ventr. chron. — Catarrhus vesicae.

339. Rp. Argent. nitr. 0'50,  
Pulv. & Extr. r. Acori q.s.,  
u. f. pil. Nr. 50.  
S. Früh und Abends je  
2 Pillen.

Wegen Appetitlosigkeit:

340. Rp. Extr. Nuc. vom. 0'10,  
Sacch. alb. 2.0,  
M. f. Pulv. div. in dos. = 5.  
S. Früh u. Abends 1 Pulv.

341. Rp. Extr. Trifol. fibr.  
Pulv. rad. Acor. aa. q. s.  
u. f. pil. pond. 0'20 Nr. 30.  
S. Früh, Mittags und  
Abends je 2 Pillen.

Bei Kindern, namentlich bei Säuglingen strenge  
Regelung der Diät: Sodawasser, leichte Abführmittel;  
(vide Dyspepsie). Bei mehrjährigen Kindern vermeide  
man Fette, gebe wenig Amylacea und Gemüse, nicht  
zu viel Flüssigkeit, in erster Linie also Milch und  
Fleisch und dessen Präparate (Leube's und Rosen-  
thal's Fleischsolution); kalte Wasserbinde über die  
Magengegend Giesshübler, Preblauer, Radeiner, Kron-  
dorfer und Biliner, event. kleine Mengen von Karls-  
bader Wasser, Karlsbader Salz.

345. Rp. Pepsini germ.,  
Sacch. alb. aa. 0'15.  
M. f. P. dent. tal. dos. = 10.  
S. Vor jeder Mahlz. 1 Pul.  
Bald darauf:

346. Rp. Acid. mur. dil. gtts 10,  
Aq. dest. 150'0.

S. Theelöffelw. zu nehmen.

(Ebenso Extr. Gentianae  
oder Cascarillae.)

342. Rp. Extr. Gentian. 2'0  
Aquae destil. 200'0,  
Syr. cort. aur. 20'0.  
S. 3ständl. 1 Esslöffel.

343. Rp. Tinct. amarac,  
Tinct. Chin. comp. aa. 20'0.  
S. Vor jeder Mahlzeit  
1 Kaffeelöffel.

344. Rp. Inf. herb. Menth. pip.  
e 2'0 ad 150'0.  
Syr. cich. cum Rheo 15'0.  
S. 3ständl. 1 Esslöffel.

Bei reichlichem Schleim-  
erbrechen.

347. Rp. Arg. nitr. 0'02,  
Aq. dest. 50'0.  
S. In 1 Tag zu ver-  
brauchen.

**Catarrhus vesicae, Blasencatarrh.** Bettruhe, warme

Umschläge, wohl auch aromatische Cataplasmen auf  
den Unterleib, warme Bäder, besonders Sitzbäder. Gegen  
das Fieber Chinin; bei Frostanfällen warme aromatische  
Getränke (Lindenblüthentheee, leichter russischer Thee),  
bei heftigen Schmerzen im Perineum und Mastdarm Blut-  
egel; gegen Harndrang Narcotica innerlich in Suppo-  
sitorien od. Clystieren. Beseitigung v. Injectionsmitteln  
bei nach Tripper entstandenem Blasencatarrh. Vermei-  
den reizender Nahrungsmittel und Getränke. Sorge für  
Stuhlgang. Zum Getränk Milch, Mandelmilch, Appli-  
cation des weichen Catheters im Bedarfsfalle und  
Injectionen in die Blase bei chronischen Fällen, Karls-  
bad, Marienbad, Wildungen. — Mineralwässer: Giess-  
hübler, Biliner, Wildunger, Gleichenberger, Königs-  
warter Richardsquelle, Krondorfer, Preblauer, Radeiner  
Wasser. Prophylactisch: Vorsicht bei Tripperbehandl.  
a. Antiseptik b. Catheterismus.

348. Rp. Decoct. sem. Lini  
e 10'0 ad 200'0.  
Tinc. Laud. simpl. gtts 15.  
Aquaе Laurac. 10'0.  
Syr. Diacod. 20'0.

S. Stündlich 1 Esslöffel.

349. Rp. Dec. sem. Lini 400'0.  
Syr. Diacod. 20'0.

S. Zum Getränk.

350. Rp. Aquaе Calcis 100'0.  
S. Je  $\frac{1}{3}$  in 1 Glas war-  
mer Milch 3mal täglich.

351. Rp. Mixt. gummos. 200'0.  
Tinct. Laud. spl. gtts 15.  
Aquaе Laurac. 10'0.  
S. Stündl. 1 Esslöffel.

352. Rp. Herb. herniar.,  
Herb. Chenopod. ambr.  
aa. 20'0.

S. Thee. (Früh u. Abends  
je eine Tasse Aufguss.)

353. Rp. Herb. herniar.,  
Fol. uvae ursi aa. 20'0.  
S. Thee.

354. Rp. Plumb. tannici 1'0.  
Sacch. alb. 5'0.

M. f. P. div. in dos. = 10.

S. Fr., Mitt. u. Ab. 1 Pulv.

355. Rp. Lupulini pur. 1'0.  
Morf. mur. 0'05.  
Sacch. alb. 3'0.

M. f. P., div. in dos. = 5.

S. Jede 3. St. 1 P.

356. Rp. Lupulini 0'20.  
Tannin. pur. 1'0.  
Sacch. alb. 2'0.

M. f. Pulv. div. in dos. = 5.

S. Jede 3. Stunde 1 Pulv.

Bei intensiven Schmerzen  
und Harnrang:

357. Rp. Morf. mur. 0'05.  
Butyr. Cacao q. s.  
u. f. l. a. suppos. Nr. 3.  
S. Abs. 1—2 St. unzuwend.

358. Rp. Cocuini mor. 0'10.  
Butyr. Cacao. q. s.  
u. f. l. a. suppos. Nr. 3—5.  
S. Stuhlzäpfchen.

359. Rp. Tannini pur. 1'0.  
Camphorae rasae 0'50.  
Sacch. alb. 2'0.

M. f. P. div. in dos. = 10.  
S. Früh, Mittags und  
Abends 1 Pulver.

Wenn Opiate oder Tannin  
nicht vertragen werden:

360. Rp. Extr. cann. Ind. 0'30.  
Sacch. alb. 5'0.

M. f. P. div. in dos. = 10.

S. Alle 3 Stunden 1 Pulv.

361. Rp. Ext. Hyosciam. 0'50.  
Sacch. alb. 5'0.

M. f. P. div. in dos. = 10.

S. Alle 3 Stunden 1 Pulv.

362. Rp. Extr. cann. Ind. 0'30.  
Camphorae rasae 0'20.  
Sacch. alb. 5'0.

M. f. P. div. in dos. = 10.

S. Alle 3 Stunden 1 Pulv.

363. Rp. Extr. cann. Ind.,  
Extr. Hyosc. aa. 0'30.  
Sacch. alb. 5'0.

M. f. P. div. in dos. = 10.

S. Alle 3 Stunden 1 Pulv.

Bei hochgradiger Cystitis:

364. Rp. Natr. salicyl. 10'0.  
Div. in dos. = 10.

S. Fr., Mitt. u. Ab. 1 P.

(in Oblaten oder Wasser).

365. Rp. Acid. benzoic. 5'0.  
Aquaе destill. 500'0.  
Syr. cort. aur. 20'0.

S. Stündlich 2 Esslöffel.

366. Rp. Acid. benzoic. 5'0.  
Glycerini pur. q. s.  
u. f. pil. Nr. 20.

S. 10 Pillen tägl.

367. Rp. Acid. benz. 0'5—1'5.  
Elaeosacch. Foenic. 3'0.  
M. f. Pulv. div. in dos. = 5.

S. 2stündlich 1 Pulver.

368. Rp. Kal. chloric. 2'0.  
Aquaе destill. 200'0.  
S. Stündlich 1 Esslöffel.

(Vorsicht!)

369. Rp. Saloli.  
Sacchari alb. aa. 5'0.  
M. f. Pulv. div. in dos. = 5.

S. Tags über zu nehmen.

In chronischen Fälle  
nebst vollständiger Ex-



leerung des Harns mittelst  
Catheters medicamentöse  
Injectionen anzuwenden:

370. Rp. Zinc. sulf.,  
Alum. crud. pulv.,  
Ac. carbol. aa. 0'50,  
Aqua dest. 500'0.  
S. Zu Injectionen.
371. Rp. Acid. carbol. 1'0,  
Aqua destill. 200'0.  
S. Zu Injectionen.
372. Rp. Acid. borici 3'0,  
Aqua dest. 200'0.  
S. Zu Injectionen.
373. Rp. Kal. hypermang.  
0'15—0'20.  
Aqua dest. 200'0.  
S. Wie oben.

374. Rp. Boracis venet. 5'0,  
Aqua dest. 200'0.  
S. Zu Injectionen.  
Bei Cystitis purulenta:
375. Rp. Arg. nitr. cr. 0'20  
bis 0'40,  
Aq. dest. 400'0.  
S. Zu Inj. ( $\frac{1}{20}$  bis  $\frac{1}{10}$  0/0).
376. Rp. Merc. sublim. corr. 0'05,  
Aqua dest. 500.  
S. Zu Inject. (1:10.000.)
377. Rp. Resorcini 3—5'0.  
Aqua dest. 100'0.  
S. Wie das Vorige (um  
den Gestank des Urins  
zu verbessern.  
In hartnäckig. Fällen kräf-  
tigere Adstringentia: Kal.  
hypermang. 0'1:100, Alaun  
1—2 0/0 Sulf. Zinci 0'3:100 etc.

**Chalazeon, Hagelkorn.** Ausschälung od. Punction mit  
nachfolgendem Ausdrücken. Bei messerscheuen Indi-  
viduen oder nach erfolgloser Punction gelbe Präcipitat-  
(v. Nr. 509) oder Jodkalisalbe einzureiben.

378. Rp. Kali jodat. 0'50,  
Vasellini 10'0.  
M. f. Unguentum.  
S. Salbe.
379. Rp. Empl. Diachyli 5'0,  
Tende supr. lint.  
S. Pflaster (z. Bedeckung  
bei hartnäckig. Formen).

**Chlorosis, Bleichsucht.** Berücksichtigung der ursäch-  
lichen Momente; Regelung der Kost, der Lebensweise  
etc., Luftveränderung. Im Anfange der Krankheit Be-  
handlung symptomatisch. Bei der Verabreichung des  
Eisens die Verdauungsfähigkeit des Magens berück-  
sichtigt, Franzensbad, Königswart, Pyrawarth, Szliacs.

380. Rp. Ferr. oxyd. dialys. 0'5,  
Aqua destill.,  
Aqua Cinnam. aa. 100'0,  
Syr. Cinnamomii 20'0.  
S. Stündlich 1 Esslöffel.
381. Rp. Tinct. Ferr. pom. 50'0,  
Tinct. cort. aurant. 20'0,  
Aqua Lauracer. 10'0.  
S. Früh, Mittags und  
Abends je 1 Kaffelöffel.
382. Rp. Ferr. oxyd. dialys.  
Pulv. r. Rhei chin. aa. 5'0,  
Extr. rad. Acor. q. s.  
u. f. l. a. pil. Nr. 50.  
S. Früh, Mittags und  
Abends je 2 Pillen.
383. Rp. Lactatis Ferr. 0'50,  
Elarosacch. Calami 3'0,  
M. f. P. div. in dos. = 10,  
S. Früh u. Abends 1 Pulv.
384. Rp. Ferri lactici 5'0,  
Pulv. rhiz. Zingiberis 1'0,  
Extr. Gent. q. s.  
u. f. l. a. pil. 50.  
S. Fr., Mitt. u. Ab. je 3 Pill.
385. Rp. Ferr. sulfur.,  
Natr. bicarb. aa. 5'0,  
Extr. rad. Acor. q. s.  
u. f. l. a. pil. Nr. 50.  
S. Früh, Mittags und  
Abds. je 3 Pill. (Modifizierte  
Bland'sche Pillen.)



386. Rp. *Ferr. carb. sacch.* ʒ ʒ,  
*Sacch. alb.*,  
*Natr. bicarb. aa.* 2 ʒ,  
*Pulv. rad. Rhei ch.* ʒ ʒ,  
*M. f. P. div. in dos.* = 10.  
*S. Früh u. Ab. je 1 Pulver.*
387. Rp. *Aethiopsis martial.*  
*Extr. matat. Ferr. aa.* 5 ʒ,  
*Pulv. Foenicul. q. s.*  
*u. f. l. u. pil. Nr. 50.*  
*S. Fr. Mitt. u. Ab. je 1 Pil.*
388. Rp. *Ferr. citrici* ʒ ʒ,  
*Pulv. trifol. fibr.*,  
*Sacch. alb. aa.* 2 ʒ,  
*M. f. P. div. in dos.* = 10.  
*S. Früh u. Abds je 1 Pulv.*
389. Rp. *Ferr. jodat. sacch.*  
*Sacch. Lactis aa.* 5 ʒ,  
*M. f. P. div. in dos.* = 10.  
*S. Früh u. Abds. je 1 Pulv.*

390. Rp. *Ferr. reduct.* ʒ ʒ,  
*Pulv. carlr. Chinac.*,  
*Elacosacch. Citri aa.* ʒ ʒ,  
*Dentur tales doses* 10.  
*S. 3 Pulver täglich.*

Pyrophosphorsaures Eisen,  
 Lösungen von Eisenalbumi-  
 nat, Solutio ars. Fow-  
 leri etc.

391. Rp. *Sulf. depur.* ʒ ʒ,  
*Sacch. Lactis* 20 ʒ,  
*M. f. Pulv. S. 3mal tägl.*  
*1 Messerspitze voll.*

Bei gestörter Verdauung:

392. Rp. *Acidimur. dil.* 2–4 ʒ,  
*Aquae dest.* 200 ʒ.  
*S. 1–2 Essl. ¼ Stunde*  
*nach jeder Mahlzeit.*  
 Zuweilen nach der Salz-  
 säure noch Pepsin 0.25.

### Cholelithiasis, Gallensteinbildung, Gallensteinkolik.

Symptomatische Behandlung der Schmerzen (Morfium int. od. subcut.), des Erbrechens, der transitorischen Verstopfung (Senna, Rheum) etc. Kost: mageres Fleisch, Fische, Eier, Obst, grünes Gemüse; Enthaltung von fetten Nahrungsmitteln, Oel u. purem Wein, Säuren und säuregebenden Speisen. Bewegung in frischer Luft. In den freien Pausen Mittel behufs eventueller Auflösung der Steine. Giesshübler, Biliner, Carlsbad, Ems, Radein, Preblau, Vichy. Während des Anfalles ausser Morfium, Chloralhydrat, Inhalation von Chloroform oder Aether empfehlenswerth.

393. Rp. *Natr. bicarb.* 30 ʒ,  
*Kali citric.* 10 ʒ,  
*Lith. carb. effere.* 6 ʒ,  
*M. f. P. div. in dos.* = 20,  
*S. Früh u. Abds. 1 P. z. n.*
394. Rp. *Podophyllini* ʒ ʒ,  
*Morf. mur.* ʒ ʒ,  
*Pulv. rad. Calami.* 2 ʒ,  
*Extr. Gent. q. s.*  
*F. pil. N. 30.*  
*S. 3mal tägl. je 2 P.*

Behufs Auflösung der Gal-  
 lensteine das modifizierte  
 Durand'sche Mittel:

395. Rp. *Aetheris sulf. gttis* 6,  
*Ol. Tereb. rectif. gttis* 4,  
*Exhibe in caps. gelatinos.*  
*Dentur tales doses* 50,  
*S. Täglich 5 Stück.*

396. Rp. *Aetheris sulfur.* 15 ʒ,  
*Olei Tereb. rectif.* 10 ʒ,  
*S. Morgens 1 Kaffeelöffel.*

(Auch in einer Tasse Suppe.)  
 Zu demselben Zwecke:

397. Rp. *Chloroformi* 5 ʒ,  
*Spir. vin. conc.* 40 ʒ,  
*Mixt. gumm.* 150 ʒ,  
*S. 3mal tägl. je 1 Esslöffel.*

**Cholera, Brechdurchfall.** Stillung des Durchfalles  
 durch Oplata und Amylum-Clystiere. Als Abortivum  
 die Darmeingiessungen (*Enteroclysmata*) nach  
 Cantani u. die Hypodermoclyse empfohlen (Nr. 40)

gegen das Erbrechen Eispillen und Narcotica, schwarzer Kaffee, Soda-, Selterwasser; Frottiren des Körpers mit warmen Tüchern und Einreibung mit spirituösen Mitteln wegen der Krämpfe; im cyanotischen Stadium Stimulantia. — Hydratische Behandlung. Umsichtige Desinfection. ( $\frac{1}{2}\%$  Carbolsäure,  $\frac{1}{1000}$  Sublimat). Zur Zeit einer Cholera-Epidemie ist jeder gewöhnlichen Diarrhoe besondere Sorgfalt zuzuwenden.

398. Rp. Decoct. lig. Campech.  
e 20°0 ad 200°0,

Extr. Colombo 5°0,

Syr. cort. aur. 20°0.

S. Stündlich 1 Esslöffel.

399. Rp. Laudani pur. 0°20,

Subnit. Bism. 0°50,

Sacch. alb. 5°0,

M. f. P. div. in dos. = 10.

S. Stündlich 1 Pulver.

400. Rp. Dec. r. Salep. 200°0,

Tinct. Opii croc. gtts 20°0.

S.  $\frac{1}{2}$ stündl. 1 Esslöffel  
oder zum Clysm.

401. Rp. Pule. r. Colomb. 1°0,

Extr. Opii aqu. 0°20,

Sacch. alb. 5°0,

M. f. P. div. in dos. = 10.

S. Früh u. Abends 1 Pulo.

402. Rp. Extr. Laud. aqu. 0°10,

Aquae destill. 15°0.

S. Zu subcut. Injectionen.

403. Rp. Acid. tann. 10°0,

Tinct. Laud. simpl. 2°0,

Inf. chamamill. 2000°0.

S. Enteroclysm.

404. Rp. Natr. chlorat. 3°0,

Natr. carbon. 4°0,

Aq. dest. 1000°0.

S. Zur Hypodermoclyse  
auf 40° C. erwärmt in's  
Unterhautzellgewebe zu in-  
jiciren.

405. Rp. Tinct. Opii simpl. 5°0,

Extr. Aloës aqu. 4°0.

S. 10—15 Tropfen in  
1 Glas Wein (oft als Cho-  
leratropfen expedirt).

406. Rp. Acid. salicyl. 5°0,

F. P. div. in dos. = 10.

S. 2stündlich in Oblaten  
zu nehmen.

Bei gleichzeitigem heftigen  
Erbrechen:

407. Rp. Ag. laurocer. 10°0.

Tinct. Opii croc. gtts 20.

S.  $\frac{1}{2}$ stündl. 10 Tropfen.

408. Rp. Morfi mariat. 0°05,

Tinct. Op. croc. gtts 20°0.

Aquae laurocer. 10°0.

S.  $\frac{1}{2}$ stündl. 10 Tropfen.

Bei Erscheinungen von  
Cyanose u. dgl.:

409. Rp. Laudani pur. 0°20,

Camphorae ras. 0°30.

Sacch. alb. 3°0,

M. f. P. div. in dos. = 10.

S. Stündlich 1 Pulver.

Bei Cyanose ohne gleich-  
zeitigen Durchfall:

410. Rp. Camphor. ras. 0°30,

Sacch. alb. 3°0,

M. f. P. div. in dos. = 10.

S. Stündlich 1 Pulver.

411. Rp. Camphorae ras. 2°0,

Aetheris sulf. 10°0.

S. Zu Händen des Arztes.  
(Je 10 Tropfen subcutan  
zu injiciren.)

412. Rp. Moschi opt. 0°50,

Aetheris sulf. 15°0.

S. 5—10 Tropfen stündl.

413. Rp. Moschi opt. 0°30,

Olei Menth. pip. gtts 10,

Aetheris sulf. 10°0.

S. Stündl. 5—10 Tropfen.

414. Rp. Olei Juniper. 2°0,

Aetheris acet. 10°0.

S. Stündl. 5—10 Tropfen.

415. Rp. Aetheris sulfur 2°0.

Aquae destill. 100°0.

Syr. cort. aur. 20°0.

S. Stündlich 1 Esslöffel.

**Cholera infantum, Brechdurchfall der Kinder.** Bett-  
ruhe, strenge Diät, Priessnitz' Umschläge auf den Unter-  
leib, Clysmata mit Amylum, Decoct. sem. Lini oder  
rad. Salep.; innerlich Constipantia (vide Catarrhus  
intestin.). Im Säuglingsalter Ammenmilch, eventuell  
Eiweisswasser, Im asphyctischen Stadium Senfbad,  
Rum, Cognac, Kaffee, Campher, Liq. Amm. anis.

416. Rp. Ferr. sesq. sol. gllts 10,  
Aqua destill. 50°0.

S. Für 2 Clystiere.

417. Rp. Arg. nitr. crist. 0°10,  
Decoct. rad. Salep. 50°0.

S. Für 2 Clystiere.

418. Rp. Acidi salicyl. 1°0,  
Sol. in s. q. Spir. v., adde.

Aqua destill. 50°0.

S. Für 2 Clystiere.

419. Rp. Liq. Amm. anis.,  
Spir. aether. aa. 10°0.

S.  $\frac{1}{2}$ ständl. 3—7 Tropfen.

420. Rp. Natr. benzoic. 0°5,  
Aq. dest. 100°0.

Spir. vini. rectif. 2°0.

Syr. simpl. 15°0.

S. Stündl. 1—2 Kindert.

421. Rp. Resorcini 0°10.

Inf. Chamom. 60°0.

Tinct. Op. simpl. gllts 2.

S. 2ständl. 1 Theelöffel.

422. Rp. Camph. subact. 0°10,  
Mixt. oleosae 100°0.

S.  $\frac{1}{3}$ ständl. 1 Kinderlöffel.

**Chorda, schmerzhafter Erection.** Kalte Umschläge auf  
das Glied und Perinäum; Einreibung von passenden  
Salben; in heftigeren Fällen Stuhlzäpfchen mit Morfium  
oder Morfium-Injectionen. Amylnitrit 3—5 Tropfen zu  
inhaliren. Auch Bromkali oder Campher innerlich, —  
Elektr. Behandlung; Points de feu am Rücken.

423. Rp. Cocaini mur. 0°10,  
Aqua dest. 5°0.

S. 2% Cocainlösung.

(Einige Tropfen 4—5mal  
im Tage in die Harn-  
röhre zu injiciren).

424. Rp. Extr. Belladonn. 1°0,  
Vaselini 10°0.

S. Salbe (zum Einreiben  
auf das Mittelfleisch und  
die Haut des Gliedes).

425. Rp. Morf. muriat. 0°10,  
Butyr. Cacao q. s.

n. f. suppos. Nr. 5.

S. Abends 1—2 Stück zu  
verwenden.

426. Rp. Hydrat. chloral. 5°0,  
Aqua destill. 100°0.

Syr. simpl. 15°0.

S. Die Hälfte sofort, die  
andere nach 10 Minut., wenn  
bis dahin kein Schlaf erfolgt.

427. Rp. Tinct. Opii simpl. 1°0,  
Aqu. Amygd. amar. 10°0.

Aqua destill. 100°0.

S. Stündlich 1 Esslöffel.

428. Rp. Extr. Opii aq. 0°10,  
Butyr. Cacao q. s.

n. f. suppos. Nr. 5.

S. Abends 1—2 Stück zu  
verwenden.

429. Rp. Lupulini 1°0,

Camphorae 0°10,

Extr. Lupul. q. s.

n. f. pil. Nr. 10.

S. 1—2ständl. 1 Pille.

430. Rp. Camph. subact. 0°20,  
Mixt. gummos. 100°0.

S. 2ständlich 1 Esslöffel.

431. Rp. Camphorae 0°5,

Vitelli ovi Nr. 1.

Extr. Op. aq. 0°05.

Aqua destill. 150°0.

S. Zu 2 Clystieren.

**Chorea minor, Veits-Tanz.** Uebergiessungen mit kaltem  
Wasser, bei schwachen Kindern mindestens Kopf nur

Rücken zu begiessen. Gute nahrhafte Kost, gut gelüftete Wohnung und Vermeidung von körperlichen und geistigen Anstrengungen. — Auch Aetherzerstäubung (mittels Richardson-Apparats) längs der Wirbelsäule in einer Breite von 7 Cm. durch je 3—4 Minuten 3—4 mal täglich empfohlen. Galvanisation.

432. Rp. Ferr. carb. sacch. 2'0,  
Oxyd. Zinc. 1'0,  
Sacch. alb. 10'0.

S. Fröh, Mittags und  
Abends 1 Messerspitze voll.

433. Rp. Sol. ars. Fowler. 10'0.  
S. 5 Tropfen 3mal tägl.  
(steigend bis 20 u. 25 Tr.)

434. Rp. Sol. ars. Fowler,  
Aq. dest. aa. 10'0.

S. Zu subcutaner Inject.  
(mit 5 Tropfen beginnend  
u. um je 2 Tropf steigend).

435. Rp. Liq. Kal. ars.,  
Aq. dest. aa. 5'0.

S. 6 Tropfen 3mal tägl.

436. Rp. Kali bromat. 5'0,  
Aqua destill. 100'0,  
Syr. cort. aur. 20'0.

S. Fröh, Mittags und  
Abends 2 Esslöffel.

437. Rp. Kali bromat. 5'0,  
Ple. et Extr. r. Acori q. s.  
u. f. pil. Nr. 20.

S. Fröh n. Abds. je 1 Pille.

438. Rp. Flor. Zinci 0'50,  
Sacch. alb. 2'0.

M. f. Pulv. div. in dos. = 5.  
S. Fröh, Mittags und  
Abends 1 Pulver.

439. Rp. Zinci valerian. 0'50,  
Sacch. alb. 2'0.

M. f. Pulv. div. in dos. = 5.  
S. Fröh, Mittags und  
Abends 1 Pulver.

440. Rp. Flor. Zinci 0'50,  
Pulv. Valerian. 0'25,

Pulv. gummos. 10'0.  
M. f. P. div. in dos. = 30.  
S. Täglich 3 Pulver.

441. Rp. Chloral. hydrat. 10'0,  
Aqua destill. 150'0.

Syr. simpl. 30'0.  
S. Stündlich 1 Esslöffel.

Auch Propylamin durch  
etwa 3 Tage empfohlen:

442. Rp. Propylamini 1'0,  
Aqua destill. 150'0,

Syr. rub. Id. 15'0.  
S. Stündlich 1 Esslöffel.

**Cirrhus hepatis, granulirte Leber.** Allmähige Entwöhnung von geistigen Getränken, überhaupt Regelung der Diät, Verordnung entsprechender Mineralwässer (Carlsbad, Marienbad, allenfalls Ems, Vichy, Homburg), leichte Abführmittel. Symptomatische Behandlung: hauptsächlich Berücksichtigung des Magencatarrhs.

**Clavus** vide: Tyloma.

**Colica flatulenta.** Ermittlung und Bekämpfung der Ursache des Meteorismus, insbesondere Anregung der Peristaltik durch Abführmittel. Kataplasmen: Wärmflaschen, heisse Tücher. Reiben, Compression und Kneten des Bauches. Heisser Thee: Chamomilla, Mentha, Melissa etc. Bei Kindern: Ermittlung und Beseitigung des ursächlichen Momentes, daher Sorge für Entfernung des Darminhaltes durch reichliche Irrigation, Massage, warmes Bad, bei heftigen Anfällen Chloralelysm; Regelung der Diät in qualitativer und quantitativer Beziehung, namentlich keine fettreiche Milch, keine Amylacea; bei Säuglingen Ammenwechsel.



443. Rp. Aq. Melissae 150°0  
Extr. lign. Campech. 5°0,  
Tinct. Laud. comp. gtt. 15,  
Syr. simpl. 15°0.

S. Jede 2. Stunde 1 Ess-  
löffel. (Statt Aq. Melissae  
auch Aq. Menthae pip.)

444. Rp. Flor. Tiliae,  
Fol. aurant. aa. 5°0.

S. Thee (auf 3 Tassen).

445. Rp. Flor. Tiliae,  
Flor. Chamomill.,

Fol. aurant. aa. 5°0.

S. Thee.

446. Rp. Morf. mur. 0°05,  
Aqua Lauroc. 10°0.

S. Tropfen.

447. Rp. Inf. fol. Tiliae 120°0,  
Aeth. sulf. 1°0,

Syr. Diacod. 20°0.

S. Stündlich 1 Löffel.

448. Rp. Aether. sulf. 2°0.

Laud. liq. Syd. gtt. 10,

Aqua Ment. 100°0,

Aqua Tiliae 50°0.

S. Stündlich 1 Löffel.

449. Rp. Chloroformi gtt. 12,  
Aqua Tiliae 50°0.

S. Jede  $\frac{1}{4}$  Stunde 1 Löffel.

Bei nervösen älteren

Kindern:

450. Rp. Extr. Bellad. 0°10,

Aq. amygd. am. 5—10°0,

S. 10—20 Tropfen 3 bis

4stündlich.

Bei Kolik der Säug-  
linge Wärme auf den  
Unterleib, Frottiren des-  
selben, ausgiebige Irriga-  
tion (Clysmen). Nach dem

Anfalle:

451. Rp. Ol. Chamomill.,  
Ol. Foeniculi,

Tr. Opii spl. aa. gtt. 1—2,

Sacch. Lactis 10°0.

S. 1—2stündl. 1 Messersp.

452. Rp. Tinct. aromat.,

Spir. aeth. aa. gtt. 20,

Aq. dest. 50°0,

Tinct. Op. simpl. gtt. 1—3.

S. 2stündl. 1 Theelöffel.

Vide auch Nr. 334—336.

**Colica menstrualis** vide: Dysmenorrhoe.

**Colica saturnina, Bleikolik.** Bettruhe in intensiven  
Fällen; Sorge für Stuhlgang; innerlich Opium sowohl  
gegen Stuhlverstopfung, als auch wegen Schmerzen;  
bei intensivem Schmerz subcutane Morfium-Injection,  
warme Bäder und Umschläge auf den Unterleib, warmer  
Thee. Vorsichtsmassregeln zu Gunsten der Arbeiter  
in Bleihütten etc.

453. Rp. Extr. Bellad. 0°05,  
Aq. Amygd. am. 10°0.

S. 2—5 Tropf. auf Zucker.

454. Rp. Laud. puri 0°20,

Sacch. alb. 2°0,

M. f. Pulv. div. indos. = 5.

S. Jede  $\frac{1}{2}$  Stunde 1 Pulo.

Nebstdem auch ein Abführ-  
mittel zu versuchen:

455. Rp. Ol. croton. Tigl. gtt. 3.

Ol. Ricini 50°0.

S. Auf 3mal zu nehmen.

**Combustio, Verbrennung.** Bei geringer Ausdehnung  
kalte Umschläge, eventuell mit Aq. Goulardi oder  
plumbica. Vorhandene Blasen sind durch einen Ein-  
stich an der Basis zu entleeren. Jodoformgaze, 2—3%,  
bei grosser Ausdehnung  $\frac{1}{2}$ %ig, anfangs täglicher Ver-  
bandwechsel, später 2—3mal die Woche. Bei Brand-  
wunden auch Ichthyol. Bei grösserer Ausdehnung con-  
tinuirliches Wasserbad. Gegen die Schmerzen Bein-  
selung mit 5—10%igem Chloralhydrat oder einer 2%ige  
Cocainlösung.



456. Rp. *Ol. Linl.*  
*Aquae Calcis. aa. 50°0.*  
*S. Ausserlich.*

457. Rp. *Collodii*,  
*Olei Ricini aa. 15°0.*  
*S. Zu Bepinseln.*

458. Rp. *Acidi salicyl. 2°0,*  
*Ung. simpl. 20°0.*  
*S. Salbe.*

459. Rp. *Ung. Diachyl. 50°0.*  
*S. Salbe.*

460. Rp. *Cocaini mur. 0°20,*  
*Aq. dest. 10°0.*  
*S. Zum Bepinseln.*

461. Rp. *Chlorali hydr. 1-2°0.*  
*Aquae dest. 50°0.*

*S. Zum Bepinseln oder zu Umschlägen.*

Compressen mit einer Lösung von *Natr. bicarb. 1:6*, wohl auch Aufstreuen des Pulvers auf die verbrannten Stellen.

462. Rp. *Argent. nitr. 0°50,*  
*Aquae destill. 25°0.*  
*S. Zum Bepinseln.*

**Comedones, Mitesser.** Local: Ausdrücken der Sebumpfropfe mittels Fingernägeln oder des Comedonenquetschers; Abreibung der Hautfläche mit Seife etc.; fortgesetztes Einpinseln von Essig, Aufstreichen von Citronensaft oder Bepinseln mit verdünnter Salzsäure beseitigen die schwarzen Köpfe der Comedonen; Rücksichtnahme auf ein eventuelles Allgemeinleiden.

463. Rp. *Spir. sup. kalin. 50°0.*  
*S. Zum Einreiben.*

464. Rp. *Lactis sulf. 10°0,*  
*Spir. vini Gall. 50°0,*  
*Spir. Lavand. 10°0,*  
*Glycerini 15°0.*  
*S. Zum Einreiben.*

465. Rp. *Kaolini 20°0,*  
*Glycerini 15°0,*  
*Aceti 10°0.*

*M. f. Ung. S. Salbe. (Abends, wenn möglich auch tagsüber einzureiben.)*

466. Rp. *Lactis sulf. 10°0,*  
*Kalii carbon. 2°0,*  
*Aetheris sulf. 15°0,*  
*Glycerini 10°0,*  
*Spir. vini Gall.,*  
*Spir. Lavand. aa. 20°0.*  
*M. f. pasta.*

*S. Aufgeschüttelt mittels Pinsels Abends einzureiben und des Morgens wegzuwaschen.*

### Condylomata acuminata, spitze Warzen, Feuchtwarzen.

Abtragung mittels Hohlscheere und darauf folgende Aetzung mit Lapis; auch scharfer Löffel verwendbar; Aetzung allein viel zu schmerzhaft, verzögert die Heilung. In Fällen zahlreicher kleiner Condylome, ferner bei messerscheuen Individuen Streupulver, das jedoch jeweilig zu beseitigen und durch ein Verbandwasser ersetzt werde, so oft ausgedehnte Excoriationen zu Stande kommen.

467. Rp. *Ferr. sesq. sol. 5°0,*  
*Aquae destill. 20°0,*  
*S. Z. Bepins. (sof. nach Abtragung d. Condylome).*

468. Rp. *Kal. chloric. 2°0,*  
*Aquae destill. 200°0,*  
*S. Zum Verband.*

Bei messerscheuen Individuen, überhaupt bei Nichtausführung der Operation:

469. Rp. *Calomelis alc. 10°0,*  
*S. Streupulver (nach vorgängiger Wäsche mit Salzwasser).*

470. Rp. *Pule. frond. Sabin.*  
*Aluminis usti aa. 10°0.*  
*Cupr. sulf. 1°0.*  
*M. f. Pulv.*  
*S. Streupulver.*

Auch Bepinselung mit Salpetersäure, concentr. Sublimatsolution (0·20 ad 10°0

Spir.), Eisenchlorid, reiner Jodtinctur etc. verwendbar. Eventuell auch:

471. Rp. *Tinct. Jodinae 10°0.*  
*Tinct. Gallarum 5°0.*  
*Jodi pur. 0·1.*

*S. Früh und Abends zu bepinseln.*

**Condylomata lata** vide: Syphilis universalis.

**Condylomata subcutanea.** Ausdrücken der Talgmassen durch concentrischen Fingerdruck; Abtragung mittels Scheere oder scharfen Löffels, auch Abbindung. — Medicamentöse Behandlung nur bei Nichtgestattung instrumentaler Beseitigung.

472. Rp. *Tinct. Jodinae 10°0.*  
*S. Zum Bepinseln (des ganzen Hügelschens).*

473. Rp. *Sapon. viridis. 20°0.*  
*S. Zu Einreibungen und Ueberschlägen.*

**Congelatio, Erfrierung.** Acut: kalte Umschläge (Schnee, Eis), kühlende Verbandmittel; auch heisse Hand- und Fussbäder. Bei Erfrierungen dritten Grades chirurgische Behandlung. — Chronisch: Eisumschläge, wenn schmerzhaft, sonst Salben, Pflaster.

474. Rp. *Aq. Goulardi 200°0.*  
*S. Zu Umschlägen.*

478. Rp. *Creosoti 2°0.*  
*Ung. simpl. 15°0.*  
*S. Salbe.*

475. Rp. *Plumb. ac. bas. sol. 5°0.*  
*Aquae destill. 200°0.*  
*S. Zu Umschlägen.*

479. Rp. *Empt. adhaesiv. 20°0.*  
*Tende supr. linteum.*

476. Rp. *Oxyd. Zinc. 2°0.*  
*Vaselini 30°0.*  
*S. Salbe.*

*S. Pflaster (zum Druckverband).*

477. Rp. *M. praecip. alb. 2°0.*  
*Vaselini 30°0.*  
*S. Salbe.*

Vide Perniones.

**Congestionen** vide: Hyperaemia cerebri.

**Conjunctivitis blennorrhoeica acuta, Ophthalmoblenorrhoea, acute Bindehaut-Blennorrhoe.** Bettruhe.

Diät: Sorge für Leibesöffnung; theilweise Verdunkelung des Zimmers; sorgfältige Reinigung des Auges jede halbe Stunde. Desinfection mit übermangansaurem Kali oder Borsäure (Nr. 486 u. 487). Grosse Ansteckungsgefahr für das zweite Auge! Schutzverband. Antifebrile Medication. Eisumschläge, 8–10 Blutegel, welche bei Augenkrankheiten am besten am Processus mastoideus, an der Schläfe oder hinter den Ohren, selten oder nie am Nasenflügel applicirt werden. Im Verlaufe stets auf Complicationen seitens der Cornea zu invigiliren. Eventuell Scarificationen des Bindehautwalles. Behandlung eines etwa vorhandenen Trippers.

480. Rp. Arg. nitr. cryst. 0'50,  
Aquae destill. 50'0,

S. Zu Händen des Arztes.  
1<sup>o</sup>/ige Lapislösung, mit  
der die Bindehaut 1—2mal  
täglich zu bestreichen ist;  
passt im Beginne, sowie in  
Fällen von mässiger Secre-  
tion; bei reichlicher Secre-  
tion stärkere Lösungen:

481. Rp. Arg. nitr. cryst. 0'10,  
Aquae destill. 50'0.

S. Zu Händen des Arztes.  
(2<sup>o</sup>/ige Lapislösung.)

Bei grauer Infiltration der  
Bindehaut und bei crou-  
pösem Belag das Touchiren  
zu vermeiden! Man pflegt  
auch mit mitigirtem  
Lapis zu touchiren:

482. Rp. Arg. nitr. cryst.,

Kal. nitr. aa. 2'0,

Misce f. bacill.

S. Zum Touchiren (stär-  
ker mitig. Lapis).

483. Rp. Arg. nitr. cryst. 2'0,  
Kal. nitr. 4'0.

S. Zum Touchiren  
(schwächer mitigirter  
Lapis).

Bei Schmerzhaftigkeit und  
grösserer Lichtscheu:

484. Ung. Hydrargyr. 10'0,  
Extr. Belladonn. 2'0.

S. Erbsengross an Stirn  
und Schläfe mehrmals täg-  
lich einzureiben.

Treten Complicationen sei-  
tens der Cornea auf, so  
verwende man:

485. Rp. Atropini sulf. 0'05,  
Aquae destill. 10'0.

S. Augentropfen.

486. Rp. Kal. hypermang. 0'10,  
Aquae dest. 100'0.

S. Zur Desinfection.

487. Rp. Acidi borac. 3'0,  
Ac. salicyl. 1'0,

Aquae dest. 100'0.

S. Zur Desinfection.

**Conjunctivitis blennorrhoeica chronica, granulosa, aegyptiaca (militaris), chronische Bindehaut-blennorrhoe.** Vorsichtsmassregeln wegen Infection des anderen Auges, sowie der Augen der Umgebung. Sorgfältige Reinhaltung; Schutzbrillen. Vermeidung von rauchiger oder staubiger Atmosphäre; Schonung der Augen; zur Verminderung der Schmerzen nach Cuprum kalte Umschläge od. Cocain. Elektrolyse, Peritomie.

488. Rp. Cupr. sulf. cryst. 10'0.

S. Zum Touchiren.

Der Blaustein muss pas-  
send geschliffen und glatt  
sein. Bei reichl. Secretion  
Lapis in Solution (vide Nr.  
480), selten en crayon; bei  
mässiger Secretion Cuprum  
sulfur. Abwechselnd mit  
Kupfer und Lapis bediene  
man sich folgender Mittel:

489. Rp. Sacch. Saturn. 1'0,  
Aquae destill. 50'0.

S. Zum Bepinseln.

490. Rp. Tinct. Opii crocat.  
Aquae destill. aa. 5'0.

S. 1 Tropf. in den Binde-  
hautsack einzuträufeln.

Auch Calomeleinstreuung.  
Kann der Arzt den Kran-  
ken nicht täglich sehen,  
so wende dieser selbst die  
Touchirung des untern Li-  
des mit Blaustein, oder falls

dies nicht thunlich, ein Augenwasser an. Auch empfiehlt sich:

491. Rp. *Cupr. sulfur.* 0·50,  
*Vasellini* 5—10·0.  
*S. Salbe.*

492. Rp. *Cupr. sulf.* 1·0,  
*Glycerini* 10·0.  
*S. Augentropfen.*

Bei Schmerzhaftigkeit:

# **Conjunctivitis catarrhalis, Bindehaut - Catarrh.**

Wiederholte Reinigung der Augen, besonders Morgens mit lauwarmem Wasser oder Thee (Käsepappel-, etc.). Keine kalten Umschläge (höchstens bei sthenischer Entzündungserscheinung durch eine kürzere Zeit  $\frac{1}{2}$ —1 Stunde); Aufenthalt in rauchgefüllten Localen, Küchen etc. zu untersagen, ebenso das Ausgehen bei Wind und Staub in den Strassen etc., überhaupt möglichste Schonung der Augen, also auch wenig Lesen und Arbeiten. Bei acuten Formen täglich einmaliges Bestreichen mit Lapislösung. bei Cat. siccus Augendouche. Gleichzeitige Blepharadenitis zu berücksichtigen.

495. Rp. *Argenti nitr. cryst.*  
0·25—0·30—0·50,  
*Aquae destill.* 50·0,  
*D. in vitr. nigr.*

*S. Zu Händen des Arztes.*  
( $\frac{1}{2}$ —1 $\frac{1}{2}$ ige Lösung zur Bestreichung der Bindehaut mittels Pinsels.)

496. Rp. *Collyr. adstr. lut.*,  
*Aquae destill. aa.* 50·0.  
*S. Augenwasser* (Früh und Mittags 1—2 Tropf.)

497. Rp. *Zinc. sulfur.* 0·10,  
*Aquae destill.* 50·0.  
*S. Augenwasser.*

498. Rp. *Merc. subl. corr.* 0·02,  
*Aquae destill.* 100·0,  
*Tinct. Op. crocat. gtts* 5.  
*S. Augenwasser.* (*Aqua Conradi.*)

499. Rp. *Decoct. Malv.* 200·0,  
*Sacch. Saturn.* 0·50,  
*Tinct. Op. croc. gtts* 10.  
*S. Augenwasser.*

500. Rp. *Tannini pur.* 0·50,  
*Aquae destill.* 50·0.  
*S. Augenwasser.*

493. Rp. *Cocaini mur.* 0·30,  
*Aquae dest.* 10·0.  
*S. Augentropfen.*

Bei inveter. Pannus künstl. Ophthalmie erzeugt durch:

494. Rp. *Sem. Jquirity sub.*  
*pulv.* 15·0.

*Inf. per. horas* 24,

*cum. Aq. dest. frig.* 500·0.

*Filtra. S. durch 3 Tage*

*je 3mal die umgestülpten Augenlider zu waschen.*

501. Rp. *Natri bitorac.* 0·20,  
*Aq. dest.* 50·0  
*S. Augenwasser.*

502. Rp. *M. praealp. alb.* 1·0,  
*Extr. Belladonn.* 15·0.  
*Unguent. simpl.* 10·0.

*M. f. Ung. S. Bohnengrass an Stirne und Schläfe alle 2—3 Stunden einzureiben.* (Arlt'sche Salbe gegen Lichtsehen und heftigen Schmerz.)

Treten Complicationen von Seiten der Cornea auf, so verordne man Atropin, eventuell Eserin und lasse die Reizmittel, falls sie nicht vertragen werden, weg. Bei Hornhautgeschwüren Jodoform. Bei Gefühl von Trockenheit und Schwere der Lider:

503. Rp. *Merc. praecipit. alb.*  
0·2—0·25.

*Vasellini* 10·0.

*S. Erbsengr. an den Lidrand einzureiben.*



480. Rp. Arg. nitr. cryst. 0'50,  
Aqua destill. 50'0.

S. Zu Handen des Arztes.  
10%ige Lapislösung, mit  
der die Bindehaut 1—2mal  
täglich zu bestreichen ist;  
passt im Beginne, sowie in  
Fällen von mässiger Secre-  
tion; bei reichlicher Secre-  
tion stärkere Lösungen:

481. Rp. Arg. nitr. cryst. 0'10,  
Aqua destill. 50'0.

S. Zu Handen des Arztes.  
(2%ige Lapislösung.)

Bei grauer Infiltration der  
Bindehaut und bei eou-  
pösem Belag das Touchiren  
zu vermeiden! Man pflegt  
auch mit mitigirtem  
Lapis zu touchiren:

482. Rp. Arg. nitr. cryst.,

Kal. nitr. an. 2'0,

Misce f. bacill.

S. Zum Touchiren (stär-  
ker mitig. Lapis).

483. Rp. Arg. nitr. cryst. 2'0,  
Kal. nitr. 4'0.

S. Zum Touchiren  
(schwächer mitigirter  
Lapis).

Bei Schmerzhaftigkeit und  
grösserer Lichtscheu:

484. Ung. Hydrargyr. 10'0,

Extr. Belladonn. 2'0.

S. Erbsengross an Stirn  
und Schläfe mehrmals täg-  
lich einzureiben.

Treten Complicationen sei-  
tens der Cornea auf, so  
verwende man:

485. Rp. Atropini sulf. 0'05,

Aqua destill. 10'0.

S. Augentropfen.

486. Rp. Kal. hypermang. 0'10,

Aqua dest. 100'0.

S. Zur Desinfection.

487. Rp. Acidi borac. 3'0,

Ac. salicyl. 1'0,

Aqua dest. 100'0.

S. Zur Desinfection.

### Conjunctivitis blennorrhoeica chronica, granulosa, aegyptiaca (militaris), chronische Bindehaut- blennorrhoe.

Vorsichtsmassregeln wegen Infection  
des anderen Auges, sowie der Augen der Umgebung.  
Sorgfältige Reinhaltung; Schutzbrillen. Vermeidung von  
rauchiger oder staubiger Atmosphäre; Schonung der  
Augen: zur Verminderung der Schmerzen nach Cuprum  
kalte Umschläge od. Cocain. Elektrolyse, Peritomie.

488. Rp. Cupr. sulf. cryst. 10'0.

S. Zum Touchiren.

Der Blaustein muss pas-  
send geschliffen und glatt  
sein. Bei reichl. Secretion  
Lapis in Solution (vide Nr.

480), selten en crayon; bei

mässiger Secretion Cuprum

sulfur. Abwechselnd mit

Kupfer und Lapis bediene

man sich folgender Mittel:

489. Rp. Sacch. Saturn. 1'0,

Aqua destill. 50'0.

S. Zum Bepinseln.

490. Rp. Tinct. Opii crocat.

Aqua destill. aa. 5'0.

S. 1 Tropf. in den Binde-

hautsack einzuträufeln.

Auch Calomeleinstreuung.

Kann der Arzt den Kran-

ken nicht täglich sehen,

so wende dieser selbst die

Touchirung des untern Li-

des mit Blaustein, oder falls



**Croup** vide: Laryngitis cronposa.

**Cystitis** vide: Catarrhus vesicae.

**Decubitus.** Bei beginnender Röthung Waschungen mit Essigwasser, lauwarmem Wasser und Application von Pflaster. Sorgfältige Reinigung und Schutzverband, wenn bereits Substanzverluste gesetzt sind.

516. Rp. Empl. sapon. 10'0.  
Tend. supr. lint.  
S. Pflaster.

517. Rp. Empl. Cerussae 15'0.  
S. Auf Leder zu streichen.

518. Rp. Calcar. chlorat. 2'0.  
Aqua destill. 200'0.  
S. Zu Waschungen.

519. Rp. Kal. hyperm. 1'0.  
Aqua destill. 200'0.  
Zu Waschungen.

520. Rp. Acid. carbol. 1'0.  
Aqua destill. 200'0.  
S. Zu Waschungen.

Bei tiefen Substanzverlusten mit Gangränescenz nach der Fläche oder Tiefe:

521. Rp. Picis liquidae 5'0.  
Calcar. sulf. 40'0.

M. f. Pulv. S. Streupulver.

522. Rp. Acid. carbol. 5'0.  
Ol. olivar. 50'0.  
S. Aeusserlich.

523. Rp. Acid. carbol. 5'0.  
Ol. olivar. 50'0.  
Cretae alb. q. s.  
u. f. pasta mollis.  
S. Auf Staniolpapier aufzustreichen. (Lister'sche Pasta.)

524. Rp. Acid. tannici 1'0.  
Plumb. acet. bas. sol. 5'0.  
Ung. simpl. 20'0.  
S. Salbe.

Nach erfolgter Reinigung der Fläche einfache Wundbehandlung.

**Defluvium capillorum.** Behandlung des ursächlichen Leidens; daher Mittel gegen Seborrhoe, Syphilis etc. Bei letzterer Krankheit local weisse Präcipitat-Salbe.

525. Rp. Liq. ammon. caust.,  
Ol. amygd. dulc.,  
Chloroformi aa. 10'0.  
Spir. vini 50'0.

S. Waschmittel (nachdem die Haare mit einer Bürste gut abgerieben, anzuwenden).

526. Rp. Ol. Macidis 5'0.  
Ol. olivar. 50'0.  
S. 2mal tägl. einzureiben.

527. Rp. M. praec. alb. 2'0.  
Vaselini 20'0.  
S. Pomade.

528. Rp. Resorcini pur. 5'0.  
Ol. Ricini 45'0.  
Spir. vin. 150'0.  
Bals. Peruv. 0'50.  
S. Mit Flanellappen täglich auf die Kopfhaut einzureiben.

**Delirium tremens, potatorum, Säufferwahnsinn.**

Beruhigung durch Schlaf; Aufregung auch durch subcutane Morphin-Injection oder Digitalis beschwichtigt; prolongirte kühle Bäder, Eisumschläge, Abführmittel, später roborirende Diät; Berücksichtigung des Magen-catarrhes. Allmälige Entziehung von Spirituosen empfehlenswerth.

529. Rp. Laudan. puri 0·50,  
Sacch. alb. 2·0

M. f. Pulv. div. indos. = 5,  
S. Zweistündl. 1 Pulver.

530. Rp. Chloral. hydr. 2·0,  
Aqua destill.,

Muc. gumm. ar. aa. 50·0,  
Syr. simpl. 20·0.

S. Stündlich 1 Esslöffel.

531. Rp. Paraldehyd 5·0,

Syr. cort. aur. 20·0.

S. Die grössere Hälfte  
sofort und den Rest nach 1  
bis 2 Stunden zu nehmen.

532. Rp. Tinct. nuc. vom.,  
0·5—2·0

Aqua destill. 100·0,

Syr. simpl. 20·0.

S. Stündl. 1 Esslöffel.

533. Rp. Kalii bromat.,

Amm. brom. aa. 10·0,

Aq. destill. 150·0.

S. Stündlich 1 Kaffee-  
löffel.

Auch Strychnin subcut.  
oder innerlich empfohlen.

**Diabetes mellitus, Zuckerharnruhr.** Regelung der Diät: Ausschliesslich Fleischkost; Vermeidung der Mehl oder Zucker enthaltenden Nahrungsmittel; kein Bier etc. Andere Getränke ohne Zucker; methodische Ausbildung und Kräftigung der Musculatur; systematische Cur in Carlsbad; mineralische Säuren und Verdauung fördernde Medicamente.

534. Rp. Acid. phosphor. 5·0,  
Succi Citri 30·0.

S. Zum Getränk.

535. Rp. Flor. Benzoës,

Pulv. gummos. aa. 2·0,

M. f. P. div. indos. = 10.

S. Jede 2. St. 1 Pulver.

536. Rp. Sulf. Chinin. 1·0—2·0,  
Elaeosacch. 2·0,

M. f. Pulv. div. indos. = 5.

S. Tagsüber zu nehmen

537. Rp. Natr. salicyl. 5·0,

Aqua destill. 150·0,

Syr. cort. aur. 15·0.

S. Stündlich 1 Esslöffel.

538. Rp. Acid. carbol. 1·0,

Aqua destill. 200·0,

Syr. cort. aur. 15·0.

S. Jede 2. St. 1 Esslöffel.

539. Rp. Natr. bicarb.,

Sacch. alb. aa. 10·0.

S. Messerspitze weise.

**Diarrhoe** vide: Catarrhus intestinalis.

**Dilatatio ventriculi, Magenerweiterung.** Berücksichtigung der Ursache. Bei leichten Formen genügt eine Diät: kleine, häufige Mahlzeit, Verminderung von Flüssigkeiten, leicht verdauliche Kost, Vermeidung gewürzter, stark gesalzener Speisen, Ruhe nach dem Essen; kleine Eisstückchen od. Eismilch, Hydrotherapie, Carlsbader Wasser.

Bei höheren Graden mechanische Behandlung. Meidung vieler Flüssigkeiten, wiewohl vor dem Pumpen der Durst gestillt werden kann. Ruhe nach den Mahlzeiten; elast. Bauchbinde. Als Nachcur Karlsbad, Kaltwassercur mit gleichzeitiger Massage.

**Diphtheritis** vide: Angina diphtheritica u. Laryngitis crouposa.

**Dysenterie, Ruhr.** Behandlung symptomatisch; Bettruhe, strenge Diät; Ventilation, exquisite Reinlichkeit in der

**Croup** vide: Laryngitis crouposa.

**Cystitis** vide: Catarrhus vesicae.

**Decubitus.** Bei beginnender Röthung Waschungen mit Essigwasser, lauwarmem Wasser und Application von Pflaster. Sorgfältige Reinigung und Schutzverband, wenn bereits Substanzverluste gesetzt sind.

516. Rp. Empl. sapon. 10'0,  
Tend. supr. lint.  
S. Pflaster.

517. Rp. Empl. Cerussae 15'0.  
S. Auf Leder zu streichen.

518. Rp. Calcar. chlorat. 2'0,  
Aqua destill. 200'0.  
S. Zu Waschungen.

519. Rp. Kal. hyperm. 1'0,  
Aqua destill. 200'0.  
S. Zu Waschungen.

520. Rp. Acid. carbol. 1'0,  
Aqua destill. 200'0.  
S. Zu Waschungen.

Bei tiefen Substanzverlusten mit Gangränescenz nach der Fläche oder Tiefe:

521. Rp. Picis liquidae 5'0,  
Calcar. sulf. 40'0,  
M. f. Pulv. S. Streupulver.

522. Rp. Acid. carbol. 5'0,  
Ol. olivar. 50'0.  
S. Aeusserlich.

523. Rp. Acid. carbol. 5'0,  
Ol. olivar. 50'0,  
Cretae alb. q. s.,  
u. f. pasta mollis.  
S. Auf Staniolpapier auf-  
zustreichen. (Lister'sche  
Pasta.)

524. Rp. Acid. tannici 1'0,  
Plumb. acet. bas. sol. 5'0,  
Ung. simpl. 20'0.  
S. Salbe.

Nach erfolgter Reinigung der Fläche einfache Wund-  
behandlung.

**Defluvium capillorum.** Behandlung des ursächlichen Leidens; daher Mittel gegen Seborrhoe, Syphilis etc. Bei letzterer Krankheit local weisse Präcipitat-Salbe.

525. Rp. Liq. ammon. caust.,  
Ol. amygd. dulc.,  
Chloroformi aa. 10'0,  
Spir. vini 50'0.

S. Waschmittel (nachdem die Haare mit einer Bürste gut abgerieben, anzuwenden).

526. Rp. Ol. Macidis 5'0,  
Ol. olivar. 50'0.  
S. 2mal tägl. einzureiben.

527. Rp. M. praec. alb. 2'0,  
Vasellini 20'0.  
S. Pomade.

528. Rp. Resorcini pur. 5'0,  
Ol. Ricini 45'0,  
Spir. vin. 150'0,  
Bals. Peru. 0'50,  
S. Mit Flanellappen täglich auf die Kopfhaut einzureiben.

**Delirium tremens, potatorum, Säufferwahnsinn.**

Beruhigung durch Schlaf; Aufregung auch durch subcutane Morphin-Injection oder Digitalis beschwichtigt; prolongirte kühle Bäder, Eisumschläge, Abführmittel; später roborirende Diät; Berücksichtigung des Magen-catarrhes. Allmälige Entziehung von Spiritus empfehlenswerth.

554. Rp. Extr. cann. Ind. 0'20.  
Sacch. alb. 5'0.

M. f. P. div. in dos. = 10.  
S. Alle 3 St. 1 Pulver.

555. Rp. Infus. flor. Chamomillae 150'0.

Tinct. Laud. simpl. gtts 15.  
Syr. Menthae pip. 15'0.

S. Stündlich 1 Esslöffel.

556. Rp. Extr. Hydrast. fluid.

Vini Malacens. aa. 20'0.

Syr. cinnamom. 10'0.

S. 2—4stündl. 1 Theelöffel.

557. Rp. Berber.

Aq. feroid.

Vini Mala

Syrup. cin

S. 2—4stündl.

Tropfen.

558. Rp. Extr. se

Sacch. alb.

M. f. P. di

S. Tagsübe

chen.

**Dyspepsie, Verdauungsstörung.** Beseitigung  
lichen Momentes: Regelung der Lebensweise  
bei Anämischen; gute Ammenmilch bei  
oder künstlich ernährten Kindern; R  
Nahrung dadurch, dass man das Kind in en  
Zwischenräumen (jede 2. oder 3. Stunde)  
viel trinken lasse. Im Falle der Nothwend  
licher Ernährung zweckmässige Surrogate  
mit Haferschleim, Kalbsbrühe oder Gelatin  
auf  $\frac{1}{2}$  Liter Wasser, Eiweisswasser, 1 H  
auf  $\frac{1}{2}$  Liter gekochtes Wasser. Sorgfältige  
der Aftergegend (vide Intertrigo, Eczem).

559. Rp. Natr. bicarb. 0'50.

Aquae destill. 50'0.

Syr. simpl. 10'0.

S. Jede 3. Stunde 1 Kinder  
löffel (vor der Nahrung).

560. Rp. Aq. Calcis,

Aq. dest. aa. 50'0.

Syr. simpl. 10'0.

S. Wie das Vorige. (Auf  
geschüttelt zu geben.)

561. Rp. Tinct. Cascarill. gtts 20.

Aquae destill. 50'0.

Syr. simpl. 10'0.

S. Jede 3. Stunde 1 Kin  
derlöffel.

562. Rp. Extr. Cascar. 0'10.

Pulv. rad. Rhei ch. 0'05.

Sacch. alb. 2'0.

M. f. P. div. in dos. = 10.

S. Fröh. Mittags und  
Abends 1 Pulver.

563. Rp. Tinct. Cascarillae,

Tinct. Ratanh. aa. gtts 20.

Elacosacch. Mac.,

Sacch. Lactis aa. 5'0.

M. f. P. S. Messerspitzw.

564. Rp. Pepsin

Sacch. alb.

M. f. P. di

S. Vor jeder

zeit 1 Pulv

Gleich darauf

565. Rp. Ac. mu

Aquae dest

Syr. simpl.

S. Kaffeelö

Oder a

566. Rp. Ac. m

Aq. dest. 5

S. Tagsübe

Enthält der Ma

Ueberschuss an

Natr. bicarb. i

im entgegenge

Salzsäure z

Bei Fettsäure

Erwach

567. Rp. Natr.

Natr. bicar

S. Messers

Vide: Coll

Ermittelung der Ursache und Berücksichtigung  
mitleidens. Besonders bei Emphysem Quebracho  
rühmt.

Extr. Quebracho aq.

5'0.

est. 25'0.

Ländl. 1 Kaffeelöffel.

Extr. Quebr: 10'0 pulv.  
Rinde, in 100'0 Spirdiger.,  
filtrirt, dann verdampft  
und in 20'0 Wasser gelöst.

**nässende Flechte.** Entfernung der Borken  
eisetzung derselben mit Leberthran, Ung. simpl.  
andelöl; Anwendung einer Salbe; erst später,  
war nur im geeigneten Zeitpunkte Schmierseife  
er. Passender Verband. Hervorzuheben Unna's  
gullverbände. — Bei acuten Eczemen Bepinseln  
iger Cocainlösung; weder Waschungen noch  
bei heftiger Entzündung alkohol. Waschung.  
neinstreuung; bei chronischen und recidi-  
n E. Berücksichtigung des Allgemeinzustandes.

Spir. sap. kal. 50'0.

in Einreiben.

Sapon. viridis 100'0.

Schmierseife.

Sapon. viridis 20'0.

ol. rectif. 50'0.

Lavandul. 5'0.

in Einreiben.

Ung. Diachyli 50'0.

be (messerrücken-

auf Leinwand ge-

n, zweimal tägl.

gen).

Empl. Diach. simpl.

ini aa. 50'0.

ergamotti 1'0.

be. (Ung. Vase-

lumbic.)

oracis, venetae 5'0.

emoll. 50'0.

be.

Plumb. carbon. 5'0.

emoll. 50'0.

be.

Ung. Plumb. ac. 50'0.

be.

Ung. Cerussae 50'0.

be.

inc. oxydat. 5'0.

es pulv. 1'0.

Porc. 30'0.

(Ung. Wilsoni.)

579. Rp. Zinci oxydat.

Amyl. Oryzae aa. 10'0.

Vaselini 20'0.

S. Pasta.

580. Rp. Ceræ flavae 20'0.

Vaselini 80'0.

Aquae Laurocer.

Aquae Rosarum aa. 10'0.

S. Salbe (einfache Va-

selinesalbe).

581. Rp. Ac. salicyl. 2'50.

Tinct. Benz. 1'0.

Ung. emoll. 30'0.

S. Salbe.

582. Rp. Ac. borici. 5'0.

Vaselini 25'0.

Bals. peruv. 0'50.

S. Salbe.

583. Rp. Acid. borici 10'0.

Lanolini puriss. 40'0.

S. Salbe.

584. Rp. Saloli 0'5—2'0.

Ol. Olivar.

Azung. Porc.

Lanolini aa. 40'0.

S. Salbe.

585. Rp. Ac. salicyl. 10'0.

Gelatinae alb. 50'0.

Aq. dest. 100'0.

S. Gelatinverband (ein

Theil in einer in warmes

Wasser gestellten Schale

zu zerschmelzen)

LIBRARY. STANFORD UNIVERSITY



dünn aufzustreichen).  
Ebenso andere Medica-  
mente in beliebigem  
Percentverhältniss.

586. Rp. Naphtholi 1'0,

Lactis sulf. 5'0,

Spir. sapon. kal. 20'0,

Alcoholis dil. 100'0,

Glycerini 5'0.

S. Zum Einreiben

(bei torpiden chron. Ecz.)

587. Rp. Lithargyri 10'0,

Cog. c. Aceti 30'0,

Ad reman. 20'0,

Ol. olivar.,

Adipis aa. 10'0,

Ichthyoli 10'0.

M. f. Ung. S. Salbe

(Unna's Ichthyolsalbe).

588. Rp. Ammon. sulf. ichthyol.

1—3'0,

Aquae destillat.

Glycerini pur.

Dextrini aa. 10'0,

M. leni calore. S. Pasta.

In Fällen acuten Eczems,  
w) die Haut keinerlei Sal-  
ben verträgt, Umschläge  
od. Amylumeinstreuungen.

589. Rp. Acid. carbolic 5'0,

Olei olivar. 200'0,

S. Zum Einreiben.

590. Rp. Acid. salicyl. 1'0,

Tinct. Benzoës 2'0,

Vaselini 50'0.

S. Salbe.

591. Rp. Ac. salicyl. 2'0,

Vaselini 50'0,

Zinci oxydat.

Amyli pur aa. 25'0.

S. Pasta.

592. Rp. Zinci oxydat. 50'0,

Acid. salicyl. 2'0,

Amyl. oryz.,

Glycerini aa. 15'0,

Aquae dest. 75'0,

Cog. ad. 140'0,

S. Kleisterpasta.

Gegen das heftige Jucken:  
Eintupfen mit Spir. vini

Gall. u. darauf folg. Bestr.  
mit Streupulver. Auch:

593. Rp. Acid. carbolic,

Glycerini puri,

Bals. Peruviani aa. 1'0,

Spir. vini 200'0.

S. Zum Einreiben.

594. Rp. Olei Cadini,

Sapon. viridis aa. 20'0,

Alcoholis rectif. 150'0,

S. 2mal tägl. zu bepinseln.

595. Rp. Olei Cadini,

Olei Jecor. Aselli aa. 50'0.

S. Zum Einreiben.

596. Rp. Ol. Cadini 10'0,

Glycerini 50'0.

S. Zum Einreiben.

597. Rp. Ol. Cadini 10'0,

Chloroformi,

Spir. vini aa. 20'0.

S. Zum Einreiben (bei  
starker Trockenheit der  
Haut Glycerin-Zusatz).

Bei acuten Eczemen nur  
alkoh. Waschungen und  
Streupulver:

598. Rp. Amyl. trit. 50'0,

S. Streupulver.

599. Rp. Flor. Zinci,

Pulv. alum. hydr. aa. 2'0,

Amyl. pur. 30'0.

S. Streupulver.

600. Rp. Amyli Oryzae 40'0,

Pulv. alum. plum. 10'0,

Pulv. r. Iridis fl. 2'0.

S. Streupulver.

601. Rp. Oxydi Zinci,

Cerussae 2'50,

Pulv. Talci ven. 50'0.

S. Streupulver.

Bei inverteirtem Eczem u.  
Verdickung d. Epidermis  
Application von Schmier-  
seife und nachträgliche  
Salbenbehandlung.

602. Rp. Papaini 1'0,

Boracis pulv. 0'4,

Aquae dest. 10'0.

S. 2mal täglich zu pin-  
seln.

**Eczema marginatum.** Gegen das Jucken Waschungen mit Sapo viridis, Spiritus saponatus kalinus, flüssiger Glycerinseife oder einem der nachfolgenden Mittel.

603. Rp. Kali caust. 1 0,  
Aqua destill. 200 0.

S. Zweimal tägl. einzureiben.

604. Rp. Acid. carbol. 5 0,  
Olei olivarum 100 0.

S. Zum Einreiben.

605. Rp. Acid. carbol. 5 0,  
Spir. vini conc. 100 0.

S. Zum Einreiben.

606. Rp. Chrysarobini, 5 0,  
Faselini 50 0.

S. Salbe.

607. Rp. Traumaticini 30 0,  
Chrysarobini 3 0.

S. Zum Einreiben.

608. Rp. Ac. pyrogall. 2 0,  
Ung. simpl. 20 0.

S. Salbe.

609. Rp. Ac. pyrogall. 2 0,  
Glycerin. pur. 5 0.

Spir. vin. 100 0.

S. Zum Bepinseln.

610. Rp. Lact. sulf. 5 0.

Naphtol. 1 0.

Spir. sap. kal. 20 0.

Alcohol. 100 0.

Glycerini 2 50.

S. Zum Einreiben.

611. Rp. M. subl. corr. 1 0.

Alcohol. rectific. 100 0.

S. Z. Einreib. (Vorsicht !)

612. Rp. Naphtol. p. 1 0.

Spir. vin. 100 0.

Glycerin. 5 0.

S. Zum Bepinseln.

613. Rp. Florum sulf.,

Olei Fagi

Cretae albae aa. 20 0,

Saponis virid.,

Azungiae Porc. aa. 40 0.

S. Mit Borstenpinsel einzureiben. (Modif. Wilkin-  
son'sche Salbe, 6 Tage Früh  
und Abends einzureiben.)

**Eclampsia infantum, Fraisen.** Berücksichtigung der Causal-Indication (Gehirnkrankheiten, Magen-, Darmcatarrh, Stuhlverstopfung, Diarrhoe, Prodrome acuter Exantheme etc.); während des Anfalles kalte Abreibungen, kalte Umschläge; Clysmata mit Essig und Wasser zu gleichen Theilen. In anfallfreier Zeit ist für grösste Ruhe zu sorgen; Eisen, Chinin u. dgl. zu verordnen.

614. Rp. Acid. phosphor. 2 0,  
Syr. rub. Idaei 10 0,

Aqua destill. 100 0.

S.  $\frac{1}{2}$ stündlich 1 Esslöffel.

Bei trägem Stuhlgang:

615. Rp. Calomelanos 0 50,

Sacch. alb. 5 0.

M. f. P. div. in dos. = 10.

S. Stündlich 1 Pulver.

616. Rp. Chloral. hydr. 0 25,  
Aqua dest. 50 0.

S. Zum Clysmata.

617. Rp. Chlorali hydr. 0 25,  
Ammon. brom. 1 0,

Aq. dest. 100 0.

Syr. simpl. 20 0.

S.  $\frac{1}{2}$ stündl. 1 Kindertöf-  
fel.

Bei wiederholten Anfällen;

618. Rp. Kali bromat. 2 0,

Aqua destill. 100 0,

Syr. rub. Id. 20 0.

S. Stündl. 1 Kindertöf-  
fel.

619. Rp. Kal. bromat. 2 0,

Ammon. bromat. 1 0,

Aqua dest. 100 0,

Syr. simpl. 30 0.

S. 3—4mal tägl. 1 Kinder-  
bis Esslöffel voll zu nehmen.

620. Rp. Kal. jodat. 1 0,

Aqua destill. 80 0,

Syr. rub. Id. 20 0.

S. Stündl. 1 Kindertöf-  
fel.

621. Rp. Chloroform 10 0.

S. Zum Einathmen.

Auch Pilocarpin u. Infusum  
Jaborandi empfohlen.

**Eklampsie Schwangerer und Gebärender.** Eisumschläge auf den Kopf, Waschungen mit kaltem Wasser oder Essigwasser; Einpackungen wie bei Morbus Brightii, auch heisse Bäder. (38–45° C.), Abführmittel, kalte Clystiere; Chloroform-Inhalationen, wenn noch vor dem Anfälle, sobald die Prodrome sich zeigen, bis zur Narcose angewendet, zumeist erfolgreich; sonst Narcotica (subcutane Morfium-Injection), Clystiere mit Opium. Chloralhydrat interne und als Clyasma; in schweren Fällen Venaesection als Indicatio vitalis. Wenn die Geburt schon im Gange ist, schonend zu beschleunigen; Schutz der Zunge.

622. Rp. *Salis Seignetti* 20'0,  
*Aquae destill.* 150'0,  
*Syr. mannat.* 20'0.  
S.  $\frac{1}{2}$ stündlich 1 Esstöffel.  
(Abführmittel.)

623. Rp. *Cremor. Tartari*,  
*Arcani duplic.* aa. 20'0,  
*Sacch. albi* 30'0,  
M. f. Pulv.  
S. Kaffeelöffelweise. (Abführmittel.)

624. Rp. *Chloroform.* 50'0.  
S. Zu Händen des Arztes.

625. Rp. *Chlorati hydr.* 10'0,  
Div. in dos. = 5.  
S. Zu Clystieren. (Je 2 Gr. mit Milch und Eigelb angerührt  $\frac{1}{2}$ stündl. bis

zur Sistirung der Convulsionen.)

626. Rp. *Amyleni nitros.* 5'0,  
*Olei Foeniculi* 10'0.  
S. 2–5 Tropf. auf 1 Taschentuch zum Einathmen (Amylnitrit).

627. Rp. *Morfii mur.* 0'10,  
*Aquae Laurocer.* 10'0,  
S. jede  $\frac{1}{4}$  St. 15 Tropfen.

628. Rp. *Landani pur.* 0'20,  
*Sacch. alb.* 5'0.

M. f. P. div. in dos. = 10.  
S. Jede  $\frac{1}{2}$  Stunde 1 Pulv.

629. Rp. *Tinct. Land. simpl.* 10'0.

S. 20 Tropfen zu 1 Clystier (jede Stunde zu appliciren).

**Ekthyma, Eiterblase** vide: Impetigo.

**Emphysema pulmonum, Lungendampf.** Behandlung des Bronchialcatarrhs; Meidung der Schädlichkeiten, die diesen steigern; Diät; während des asthmatischen Anfalles Abreibungen der Brust, Ableitung auf den Darmcanal. Einathmung comprimirter und Ausathmung in verdünnte Luft mittelst des pneumat. Apparates; pneumatische Kammer, im Sommer Aufenthalt in Fichtennadelwäldern.

630. Rp. *Extr. Belladonn.* 0'10,  
*Pulv. rad. Ipecac.* 0'30,  
*Sacch. alb.* 5'0,  
M. f. P. div. in dos. = 15.  
S. 3 Pulv. täglich.

631. Rp. *Extr. Hyosciam.* 0'50,  
*Pulv. rad. Ipecac.* 0'30,  
*Sacch. alb.* 5'0,  
M. f. P. div. in dos. = 15.  
S. Fr., Mitt. u. Ab. 1 Pulv.

Fehlen heftige Symptome des Bronchialcatarrhs, so verordne man:

632. Rp. *Sal. ammoniac.* 2'0,  
*Pulv. et Extr. Liq. q. s.*  
u. f. pil. Nr. 50.  
S. Fröh und Abends je 5 Pillen.

633. Rp. *P. Phellandr. aq.* 10,  
*Extr. Dulcamar.* 20,  
*Extr. Salicis* 50,  
*Piant. pil.* Nr. 50.

*S. Früh u. Abds. je 5 Pill.*

634. Rp. *Acet. Scillae* 500,  
*Kali carb. q. s. ad. satur.,*  
*Aquae Petrosellin.* 1000,  
*Syr. Menthae pip.* 200.

*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

635. Rp. *Tinct. Lobeliae infl.*  
 100.

*S. Je 10 Tropfen.*

Gegen den Hydrops:

636. Rp. *Dect. r. Ononid. spin.*  
 e 200 ad 2000,

*Liq. Terr. sol. tart.,*

*Oxym. Scillae aa.* 200.

*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

Bei Oedem der Unterextremitäten werden subcutane Injectionen von *Pilocarpin* gerühmt.

637. Rp. *Pilocarpini* 0.20,  
*Aquae destill.* 100.

*S. 1/2 Spritze subcut. zu injiciren.*

638. Rp. *Inf. Fol. Jaborandi*  
 e 50 ad 1000.

*S. Auf einmal zu trinken.*

*Capillartroicarts vide;*  
*Ascites.*

Bei herabgekommenen Individ. leichte Eisenpräp.

639. Rp. *Ol. Pini.* 200.

*S. Tropfen (zu Inhalationen je 5—10 Tropfen in die Inhalationsflüssigkeit zu geben).*

640. Rp. *Ol. Pini pumilion.*  
*acth.* 200.

*S. Tropfen. (Latschenöl wie das Vorige.)*

Auch Faradisation d. *Nervi phrenici* empfohlen.

*Vide: Dyspnoë.*

**Endocarditis.** Behandlung rein symptomatisch: antifebrile Mittel, kalte Umschläge auf die Präcordialgegend; Digitalis oder Kali nitricum bei gesteigerter Pulsfrequenz; Reizmittel bei drohender Herzlähmung; bei drohendem Lungenödem Aderlass. — Gleichzeitige Behandlung des ursächlichen Leidens. Inhalationen von Natr. bicarb. 1—2%, um die fibrinösen Auflagerungen auf dem Endocard zur Lösung zu bringen.

**Enterocatarrh** vide: Catarrhus intestini.

**Enuresis nocturna.** Bei Erschlaffung der Blase kalte Waschungen und Sitzbäder; bei häufigem Harndrang warme Sitzbäder; bei schwachen Kindern Chinin, Eisenpräparate. Am wirksamsten Elektrizität mit dem Blasenexcitator oder dem Mastdarmrheophor, und zwar mittelst des inducirten Stroms. Der 2. Pol auf's Perineum. Auch Kaltwassercur. Tonica innerlich.

641. Rp. *Lupulini* 0.50,  
*Sacch. alb.* 50,

*M. f. P. div. in dos. = 10.*

*S. Früh u. Abends 1 Pulv.*

642. Rp. *Tannin. pur.*

*Ferr. sulfar. au.* 50,

*Extr. r. Acor. q. s.,*

*n. l. n. pill. Nr. 50.*

*S. Täglich 3 Pillen.*

643. Rp. *Extr. Bellad.* 0.05,  
*Sacch. alb.* 20,

*M. f. P. div. in dos. = 5.*

*S. Vor dem Schlafengehen*

*1 Pulver. (Vorsicht!)*

644. Rp. *Strychnini nitr.* 0.10,  
*Aquae destill.* 100.

*S. Zu subcut. inj. (1/4 Spritze in die Kreuzbein-  
 gegend zu injiciren.)*



**Eklampsie Schwangerer und Gebärender.** Eisumschläge auf den Kopf, Waschungen mit kaltem Wasser oder Essigwasser, Einpackungen wie bei Morbus Brightii, auch heisse Bäder (38–45° C.), Abführmittel, kalte Clystiere; Chloroform-Inhalationen, wenn noch vor dem Anfalle, sobald die Prodrome sich zeigen, bis zur Narcose angewendet, zumeist erfolgreich; sonst Narcotica (subcutane Morfium-Injection), Clystiere mit Opium-Chloralhydrat interne und als Clyasma; in schweren Fällen Venaesection als Indicatio vitalis. Wenn die Geburt schon im Gange ist, schonend zu beschleunigen; Schutz der Zunge.

622. Rp. *Salis Seignetti* 20'0,  
*Aquae destill.* 150'0,  
*Syr. mannat.* 20'0.  
S.  $\frac{1}{2}$ stündlich 1 Esstöffel.  
(Abführmittel.)

623. Rp. *Cremor. Tartari.*  
*Arcani duplic. aa.* 20'0,  
*Sacch. albi* 30'0,  
M. f. *Pule*,  
S. Kaffeelöffelweise. (Abführmittel.)

624. Rp. *Chloroform.* 50'0.  
S. Zu Händen des Arztes.

625. Rp. *Chloralhydr.* 10'0,  
Div. in dos. = 5.  
S. Zu Clystieren. (Je 2 Gr. mit Milch und Eigelb angerührt  $\frac{1}{2}$ stündl. bis

zur Sistirung der Convulsionen.)

626. Rp. *Amyleni nitros.* 5'0,  
*Olei Foeniculi* 10'0.

S. 2–5 Tropf. auf 1 Taschentuch zum Einathmen (Amylnitrit).

627. Rp. *Morfii mur.* 0'10,  
*Aquae Lauracer.* 10'0.  
S. jede  $\frac{1}{4}$  St. 15 Tropfen.

628. Rp. *Laudani pur.* 0'20,  
*Sacch. alb.* 5'0,

M. f. *P.* die, in dos. = 10.  
S. Jede  $\frac{1}{2}$  Stunde 1 *Pule*.

629. Rp. *Tinct. Laud. simpl.* 10'0.

S. 20 Tropfen zu 1 Clystier (jede Stunde zu appliciren).

**Ecthyma, Eiterblase** vide: Impetigo.

**Emphysema pulmonum, Lungendampf.** Behandlung des Bronchialcatarrhs; Meidung der Schädlichkeiten, die diesen steigern; Diät; während des asthmatischen Anfalles Abreibungen der Brust, Ableitung auf den Darmcanal. Einathmung comprimirt und Ausathmung in verdünnte Luft mittelst des pneumat. Apparates; pneumatische Kammer, im Sommer Aufenthalt in Fichtennadelwäldern.

630. Rp. *Extr. Belladonn.* 0'10,  
*Pule. rad. Ipecac.* 0'30,  
*Sacch. alb.* 5'0,  
M. f. *P.* die, in dos. = 15.  
S. 3 *Pule* täglich.

631. Rp. *Extr. Hyosciam.* 0'50,  
*Pule. rad. Ipecac.* 0'30,  
*Sacch. alb.* 5'0,  
M. f. *P.* die, in dos. = 15.  
S. 17. Mitt. u. Ab. 1 *Pule*.

Fehlen heftige Symptome des Bronchialcatarrhs, so verordne man:

632. Rp. *Sal. ammoniac.* 2'0,  
*Pule. et Extr.* 15q. q. s.  
u. f. pil. Nr. 50.

S. Früh und Abends je 5 Pillen.



657. Rp. *Curare* 0'15,  
*Aquae destill.* 10'0.  
*Acid. mur. gttm* 1.  
*S. Alle 5 Tage je 5—10*  
*Tropfen bis zum Eintritt*  
*eines leicht. Schüttelfrostes.*  
*(Subcutan.)*

658. Rp. *Cupr. sulf.* 0'20.  
*Zinc. valerian.*  
*Argent. nitr. aa.* 0'30,  
*Pulv. et extr. r. acor. q. s.,*  
*n. f. pil.* 30.  
*S. 3 Stück täglich.*

**Epistaxis, Nasenblutung.** Einspritzung von Eiswasser oder Essigwasser in die betreffende Nasenöffnung; bei starker und in einfacher Weise nicht zu stillender Blutung Tamponade der Nase mit der Bellocq'schen Röhre.

661. Rp. *Aluminis crudi pulv.*  
 20'0.  
*Aquae destillatae* 50'0.  
*S. Schnupfwasser* (für  
 Personen, die an häufigem,  
 mässigem Nasenbluten leiden).

**Epulis, Zahnfleischschwamm.** Abtragung mit Scheere, Messer etc., oder Canterisation mit Lapis, Jodtinctur etc.; passende Mundwässer. Im Falle von Blutung oder Geschwürsbildung Bepinselung mit concentr. Aetzmitteln.

664. Rp. *Tinct. Jodi,*  
*Spir. vini aa.* 10'0.  
*S. Zum Bepinseln.*  
 665. Rp. *Acid. carbol.* 1'0,  
*Spir. vini* 20'0.  
*S. Zum Bepinseln.*

**Erysipel, Rothlauf.** Berücksichtigung des ursächlichen Momentes, Bettruhe. Kalte Umschläge in mässigen, Eismuschläge in schweren Fällen; warme Umschläge erst beim Abnehmen. Säuerliche Getränke, im Bedarfsfalle Abführmittel; Bestreichen mit Oel oder Fett. Bei Collaps starker Kaffee, Wein, Moschus. — Subcutane Injectionen von 2—3%iger Carbollösung in Distanzen von je 6 Cm.

668. Rp. *Acet. Litharg.* 200'0.  
*S. Zu Umschlägen.*

669. Rp. *Plumb. acet. bas.*  
*sol.* 10'0,  
*Aquae destill.* 200'0.  
*S. Zu Umschlägen.*

659. Rp. *Argent. nitr.* 0'50,  
*Pulv. et Extr. acor. q. s.,*  
*n. f. Pil.* N. 50.

*S. 4—10 Stück des Tags.*  
 Bei gehäuften Anfällen  
 Chloralhydrat innerlich od.  
 per Clyisma 2—3 Gramm.  
 Als Vorbeugungsmittel  
 während der Aura:

660. Rp. *Apomorph. mur.* 0'10.  
*Aquae destill.* 10'0.  
*S. Subcut. Inj.* Anfänglich  
 1/2 Spritze = 0'005,  
 allmählig weniger b. 1/4 Spr.

662. Rp. *Zinci sulf.* 1'0,  
*Alum. crud.* 2'0,  
*Aquae destill.* 50'0.  
*S. Schnupfwasser.*

663. Rp. *Ferr. sesq. sol.* 1'0,  
*Aquae destill.* 100'0.  
*S. Einspritzung.*

666. Rp. *Arg. nitr. cryst.* 1'0,  
*Aquae destill.* 10'0.  
*S. Zum Bepinseln.*

667. Rp. *Liq. Ferr. sesq.* 5'0.  
*S. Zum Betupfen.*  
 (Mundwasser v.: Register.)

670. Rp. *Acid. carbol.,*  
*Spir. vini aa.* 1'0,  
*Ol. Terebinth.* 2'0,  
*Glycerin.* 5'0.  
*S. Zum Bepinseln* (Zurück-  
 die entzündete Fläche und  
 deren Umgebung).

Auch Bestreichen mit concentr. Lösung v. Plumb. carb. in Glycerin, Colloidium, Jodtinctur etc., dann Bedecken mit Watta.

671. Rp. Extr. Secal. corn. 2'0,  
Glycerini 8'0.

S. Subcutane Injection  
(2–3 Spritzen).

672. Rp. Acid. carbol. 0'20,  
Aqua dest. 10'0.

S. Subcutane Injection.

**Erythema.** Einfache oder zusammengesetzte Strenpulver. Nur in manchen Fällen kalte Umschläge. Bei gleichzeitigem Fieber Chinin.

675. Rp. Plumb. ac. b. sol. 5'0,  
Aqua destill. 200'0.

S. Zu Umschlägen (Bei Verlust der Epidermis.)

676. Rp. Alum. plum. ple. 30'0,  
S. Strempulver.

**Favus, Erbgrind.** Wiederholtes Begiessen der Favusmassen mit Oel (Leberthran) und Verreibung desselben. Entfernung der erweichten Massen, Abwaschen mit Seife oder Seifengeist und tägliche Epilation. Einreibung mit einer Salicylsäure-, Carbonsäure- oder Petroleummischung.

679. Rp. Saponis viridis 50'0.  
S. Schmierseife.

680. Rp. Spir. Sap. kat. 50'0.  
S. Zum Einreiben.

681. Rp. Acid. carbol. (oder salicyl.) 5'0,

Glycerini puri,

Alcohol. aa. 50'0.

S. Nach Bericht (eine hierin eingetauchte Compresse nach Entfernung d. Favusmassen aufgelegt).

682. Rp. Acidi carbol. (oder salicyl.) 2'0,

Glycerini puri,

Alcohol. aa. 20'0,

Aqua destill. 100'0.

S. Zum Einpinseln.

683. Rp. Acid. pyrogall. 2'0,  
Fasolini 20'0.

S. Salbe.

Auch Einreibungen von Carbolöl 1 : 20 od. Ol. cadini.

Bei Erysipelas migrans od. Erschöpfung der Kräfte:

673. Rp. Chinini sulfur. 1'0,  
Sacch. alb. 2'0,

M. f. Pulv. div. in dos. = 5.

S. 3 Pulver täglich.

674. Rp. Camphor. ras. 0'20,  
Sacch. alb. 2'0,

M. f. Pulv. div. in dos. = 5.

S. 3stündlich 1 Pulver.

677. Rp. Oxyd. Zinci 5'0,  
Amyli pur. 30'0.

S. Strempulver.

678. Rp. Spermat. ceti. 30'0.  
S. Zum Einreiben.

Vgl. Intertrigo.

684. Rp. Thymol. 0'50,  
Chlorof. 5'0,

Ol. Olivar. 15'0.

S. Zum Einreiben.

685. Rp. Petrolei 100'0,  
Bals. Peruviani 10'0.

S. Zum Einreiben.

686. Rp. Ol. caryophyll.,  
Ol. Menthae,

Ol. ros. mar. aa. 1'0,

Spiritus vin. 100'0.

S. Zum Einreiben.

687. Rp. M. subl. corr. 0'20  
Spir. vin. Gall. 100'0

S. Zu Waschungen od.

Umschlägen.

Auch Bepinselungen mit Essigsäure mit Erfolg

verwenden.

Bei Favus unbehagliche Theile Anwendung

Seife, darauf Oel schliesslich Theer

**Febris intermittens** vide: Intermittens.

**Fluor albus, Leukorrhoea, weisser Fluss, Blennorrhoea vaginae, Catarrhus vaginae.** Acut: Kalte Umschläge, Einspritzung mit kaltem Wasser, bei Fiebersymptomen auch säuerliche Getränke, allenfalls Bettruhe oder Vermeidung von Bewegung.

Chronisch: Ermittlung der Ursache und der Ausdehnung der Krankheit auf Nachbargewebe, ob primär oder secundär. Locale Behandlung durch Injectionen, eventuell durch Aetzmittel.

Bei Kindern: Reinhaltung durch Waschung oder Bäder. Oertlich Adstringentien. Einführung von Jodoformstäbchen. Einlage von Baumwolle. Event. Allgemeinbehandlung mit Leberthran, Chinin etc.

688. Rp. *Plumb. ac. b. sol.* 100° 0.  
S. 1 Essl. in  $\frac{1}{2}$  Liter  
Wasser (zum Einspritzen).

689. Rp. *Kali chloric.* 5° 0,  
*Aquae destill.* 500° 0.  
S. Zum Einspritzen.

690. Rp. *Alum. crud. p.* 10° 0,  
*Aquae destill.* 500° 0.  
S. Zum Einspritzen.

691. Rp. *Zinci sulfur.* 5° 0,  
*Aquae destill.* 500° 0.  
S. Zum Einspritzen.

692. Rp. *Acidi carbolici* 5° 0,  
*Aquae destill.* 500° 0.  
S. Zum Einspritzen.

693. Rp. *Acidi salicyl.* 5° 0,  
*Aquae destill.* 500° 0.  
S. Zum Einspritzen.

694. Rp. *Calcar. chlor.* 5° 0,  
*Aquae destill.* 500° 0.  
S. Zum Einspritzen.

695. Rp. *Kal. hypermang.* 2° 0,  
*Aquae destill.* 500° 0.  
S. Zum Einspritzen.

696. Rp. *Cupr. sulf.* 10° 0,  
*Aquae dest.* 100° 0.  
S. Zu Einspritzungen in  
den Gebärmutterhals.

Bei Geschwüren an der  
Vaginalportion:

697. Rp. *Arg. nitr. crist.* 1° 0,  
*Aquae destill.* 20° 0,  
S. Zum Bepinseln.

698. Rp. *Tinct. Jodinae,*  
*Tinct. Gallar. aa.* 5° 0,  
*Jodi pur.* 0° 50,  
S. Zum Bepinseln.

699. Rp. *Tannini pur.* 2° 0,  
*Glycerin, pur.* 20° 0,  
S. Zum Bepinseln.

700. Rp. *Acid. chromic.,*  
*Aquae destill. aa.* 5° 0.  
S. Aetzmittel (mittelst  
Glasstab aufzutragen).

701. Rp. *Jodoformi* 1° 0,  
*Glycerini* 10° 0,  
*Ol. Menth. gttss.* 2,  
S. Zum Bepinseln.

Vaginaltampons aus Baum-  
wolle zu imprägniren mit:

702. Rp. *Alum. cr. pulv.* 30° 0,  
S. Nach Bericht.

703. Rp. *Kalii jodat.* 1° 0,  
*Jodi pur.* 0° 10,  
*Glycerini* 30° 0.  
S. Wie das Vorige.

704. Rp. *Tannini pur.* 1° 0,  
*Glycerini* 30° 0.  
S. Wie das Vorige.

705. Rp. *Alumin. crud.* 1–3° 0,  
*Butyr. Cacao,*  
*Ung. emoll. aa. q. s.,*  
*Ut f. suppoz. (oder Glo-*  
*buli) 10.*  
S. 1–2 Stück tägl. ein-  
zulegen (in die Vagina)

706. Rp. *Zinci sulf.* 1'0.

*Butyri Cacao,*

*Ung. emoll. aa. q. s.,*

*Ut f. suppos. (oder Globuli) 10.*

*S. Wie das Vorige.*

Bei Schmerzen in der Umgebung des Uterus:

707. Rp. *Morf. mur.* 0'10,

*Butyr. Cacao,*

*Crème cel. aa. q. s.*

*u. f. Globuli 10.*

*S. Wie das Vorige.*

Bei Cat. uteri eventuelle blutige oder unblutige Dilatation (Laminaria), Reinigung mit dem Wattatampon, Injection von Adstringentien mit dem Bozeman'schen Catheter (Carbollösung 2%, Cuprum 10%, Alumen, sulf. Zinci, Kal. hypermang., Tannin, Jodtinctur).

**Frostbeulen** vide: Perniones.

**Furunculus, Blutschwär.** Anfänglich kalte Umschläge, Bepinselung mit Jodtinctur oder Cauterisation. Rechtzeitige Eröffnung mit dem Messer oder durch warme Kataplasmen. Bei öfteren Recidiven der Furunkulose: Regelung der Diät u. der Wohnräume: Luftveränderung.

708. Rp. *Aq. Goulardi* 200'0.

*S. Zu Umschlägen.*

709. Rp. *Tinct. Jodinae* 10'0,

*Tinct. Gallur.* 5'0.

*S. Zum Bepinseln.*

Im Bedarfsfalle Abführmittel.

Bei Schmerzhaftigkeit:

710. Rp. *Morf. mur.* 0'05,

*Sacch. alb.* 2'0,

*M. f. Pulv. div. indos. = 5.*

*S. Abends 1—2 Pulver.*

711. Rp. *Ung. Plumbi,*

*Ung. emoll. aa. 10'0.*

*S. Salbe (zur Bedeckung der Wunde).*

**Galactorrhoea, Milchüberfluss.** Regelung der Diät, Abführmittel, öftere Waschungen der Brüste mit kühlem Wasser, entsprechende Unterstützung der stark gefüllten Brüste; Bedeckung derselben mit Fett, Schmalz etc., warme Umschläge; Anwendung des Milchsaugers.

**Gallensteine** vide: Cholelithiasis.

**Gastralgia, Magenkrampf** vide: Catarrh. ventr.

**Gastrectasie** vide: Dilatatio ventr.

**Gingivitis, Zahnfleischentzündung.** Sorgfältige Pflege des Mundes, Reinigung des Zahnfleisches mit Zahnbürste oder Läppchen; häufiges Ausspülen mit Mundwasser.

712. Rp. *Boracis venetae* 5'0,

*Mellis rosat.* 50'0.

*S. Pinselsaft.*

713. Rp. *Kal. chlor.* 5'0,

*Aquae destill.* 500'0.

*S. Mundwasser.*

714. Rp. *Tinct. Ratanhae,*

*Tinct. Gallarum aa. 10'0,*

*Tinct. Laud. simpl.* 1'0.

*S. Zum Bepinseln.*

Mundwasser vide: Angina.

Aphthae, Stomatit. mercur.



**Glaucom, grüner Staar.** Bei constatirter Diagnose sofortige Einträufelung von Eserin oder Pilocarpin bis zur Operation (Iridectomie, Sclerotomie) fortzusetzen, ängstliche Vermeidung von Atropin und mydriatischen Mitteln überhaupt, selbst in Fällen, wo nur Verdacht auf Glaucom besteht. Massage.

715. Rp. Eserin. sulf. 0'05,  
Aqua dest. 10'0.

S. Täglich 2mal einzuträufeln.

716. Rp. Pilocarpin mar. 0'10,  
Aqua dest. 10'0.

S. Wie oben.

Bei starken glaucomatösen Schmerzen:

717. Rp. Eserini sulf.,  
Morf. mur. aa. 0'10,  
Aqua dest. 10'0.

S. Wie vorher.

**Gonitis, Kniegelenkentzündung.** In acuten Fällen Ruhe, horizontale Lage der Extremität; kalte Umschläge; nach Sistirung der Schmerzen gefensterter starrer Verband, Compression m. trockenen Schwämmen. Bei grosser Schmerzhaftigkeit Morfiumsalbe. Bei chronischer seröser Synovitis Anwendung der Jodkalijodsalbe, eventuell Punction und Injection von Jod. Massage in chronischen Fällen.

718. Rp. Empl. oxycroc.,  
Empl. Hydrarg. aa. 10'0.

S. Pflaster.

719. Rp. Tinct. Jodinae,  
Tinct. Gallarum aa. 10'0.

S. Zum Bepinseln.

720. Rp. Kal. jodat. 2'0,  
Jodi pur. 0'10.

Ung. simpl. 20'0.

S. Haselnussgross dreimal täglich einzureiben.

**Gonorrhoe** vide: Blennorrhoea urethrae.

**Haematemesis, Bluterbrechen.** Berücksichtigung des Grundleidens; Horizontale Lage im Bette; möglichste Vermeidung von Bewegungen und jeder Nahrung innerhalb der ersten 24 Stunden; sodann esslöffelweise abgekochte, eiskalte Milch; später nur flüssige Nahrung; Eiswasser, Eispillen, Eisumschläge auf die Magengegend; Sodawasser oder Champagner, gut eingekühlt; gegen Ohnmachten Kölnerwasser, Bespritzung des Gesichtes mit Wasser; Frottirung des Körpers mit Aether aceticus od. sulf., eventuell Campherätherinjection 1:3. Bei kräftigem Puls Sistirung des Brechreizes durch eube. Morfiuminj. Bei Unmöglichkeit der Ernährung durch den Mund Application nährenden Clystiere (400 Gr. geschabtes Rindfleisch und 100 Gr. Pancreas, mit warmem Wasser zu einem Brei verrieben zu 2—3 Clystieren auf einen Tag).

721. Rp. Plumb. acct. 0'20,  
Morf. mur. 0'10,

Sacch. alb. 2'0.

M. f. P. die. in dos. = 10.

S. Jede 2. St. 1 Pulver.

722. Rp. Tannini pur. 0'50,  
Laudan. pur. 0'10,

Sacch. alb. 2'0.

M. f. Pulc. die. in dos. = 5

S. Jede 2. St. 1 Pulver.



723. Rp. Ferr. sesq. sol. 2'0,  
Aqua destill. 200'0,  
Tinct. Op. simpl. gtt. 10,  
Syr. Diacodii 30'0.

S.  $\frac{1}{2}$ stündlich 1 Esslöffel.

Nach Sistirung der Blutung:

724. Rp. Liq. Ferr. sesqu. 10'0.

S. 5 Tropfen in Zucker-

wasser.

Subcut. Injection von Er-

gotin 0'03—0'05—0'1.

Bei Kindern:

725. Rp. Alum. crud. 0'50,

Aqua destill. 50'0,

Syr. rub. Id. 10'0.

S. Jede 5 Minut. 1 Kaffee-

löffel.

726. Rp. Ferr. sesquichl. s. 1'0,

Aqua destill. 50'0,

Syr. cort. aur. 15'0.

S. Jede  $\frac{1}{2}$  St. 1 Kindert.

**Haematurie, Blutharnen.** Ermittlung der Ursache; ferner ob die Blutung aus der Harnröhre oder Harnblase stammt; Ruhe, am zweckmässigsten Bettruhe; Diät; kalte Umschläge; Sistirung der Injectionen beim Tripper.

727. Rp. Ferr. sesquichl. 2'0,  
Aq. destill. cinnam. 200'0,  
Syrupi cinnamom. 20'0.  
S. Jede 2. Stunde einen Ess-

löffel.

728. Rp. Ferr. sulf. crist.,  
Natr. bicarb. aa. 3'0,  
Extr. Millefol. q. s.,  
n. f. pil. Nr. 60.  
S. 3mal tägl. je 3 Stück.

729. Rp. Extr. Secal. corn. 1'0,  
Sacch. alb. 2'0,  
M. f. Pulv. div. in dos. = 5.  
Jede 3. Stunde 1 Pulver.

730. Rp. Ergotini 1'0,  
Laudan. pur. 0'10,  
Sacch. alb. 2'0,  
M. f. Pulv. div. in dos. = 5.  
S. Jede 3. St. 1 Pulver.

731. Rp. Extr. Secalis corn. aq.  
Aqua destill. aa. 5'0.

Filtra. S. Zu subcutan.

Injection. (3mal täglich je

$\frac{1}{3}$  Spritze.)

732. Rp. Extr. Secal. corn. 2'0,  
Glycerini pur.,

Aqua destill. aa. 5'0.

Filtr. S. wie das Vorige.

733. Rp. Dec. cort. Chin. rubr.,  
e 10'0 ad 100'0,

Extr. lign. Campech. 1'0,

Syr. cinnamom. 20'0.

S. Jede 2. St. 1 Esslöffel.

Bei Nierenblutungen:

734. Rp. Extr. haemostat.,  
Tannini pur. aa. 0'50,

Sacch. alb. 2'0,

M. f. Pulv. div. in dos. = 5.

S. 3stündlich 1 Pulver.

**Haemoptoe, Bronchialblutung, Bluthusten, Lungenbluten.** Absolute Ruhe bei horizontaler Lage, Eisumschläge oder Leiter'scher Kühlapparat auf die Brust, Eispillen, Gefrorenes; Verbot des Sprechens, des Genusses warmer Speisen; entsprechende Regelung der Diät, Untersagung von Excessen oder Aufregungen; Bewegung in frischer Luft; roborirende Mittel.

735. Rp. Morf. muriat. 0'05,  
Alum. crud. pulv.,  
Sacch. alb. aa. 2'0,  
M. f. Pulv. div. in dos. = 5.  
S. 2stündlich 1 Pulver.

736. Rp. Alum. crud.,  
Amyl. pur. aa. 2'0,

M. f. Pulv. div. in dos. = 5.

S. 2stündlich 1 Pul

Bei starkem Hustenreiz:

737. Rp. Laud. pur. 0'10,  
Plumb. acet. 0'20,  
Sacch. alb. 2'0,  
M. f. Pulv. div. in dos. = 10.  
S. Jede 2. Stunde 1 Pulv.  
738. Rp. Morfii mur. 0'05,  
Tannin. pur.,  
Sacch. alb. aa. 2'0,  
M. f. Pulv. div. in dos. = 5.  
S. 2stündlich 1 Pulver.

Bei grösserer Pulsfrequenz  
und Hustenreiz:

739. Rp. Fol. Dig. purp. 0'20,  
Morf. 0'05,  
Alum. crud. pulv.,  
Sacch. alb. aa. 2'0,  
M. f. Pulv. div. in dos. = 5.  
S. 2stündlich 1 Pulver.

Anzuwenden sind ferner  
Präparate von Secale corn.  
und Ferrum sesquichlor.:

740. Rp. Inf. Secal. corn.  
e 1'0 ad 150'0.  
Tinct. Laud. simpl. gtts 5,  
Syr. capill. ven. 20'0.  
S.  $\frac{1}{2}$ stündlich 1 Esslöffel.  
741. Rp. Ergotini puri,  
Acid. tannic. aa. 1'50,  
Estr. Opii aq. 0'05,  
Estr. liquor. q. s.,  
n. f. pil. Nr. 20.  
S. 3stündlich 1 Pille.  
742. Rp. Ferr. sesq. sol. 1'0,  
Aqua destill. 100'0,  
Tinct. Laud. simpl. gtts 10,  
Syr. cinnamom. 20'0.  
S.  $\frac{1}{2}$ stündlich 1 Esslöffel.

743. Rp. Extr. haemostat. 1'0,  
Morf. mur. 0'10,  
Elaeosacch. foenicul. 2'0,  
M. f. Pulv. div. in dos. = 10.  
S. Jede 2. St. 1 Pulver.

744. Rp. Ferr. sesquichl. s. 1'0,  
Aqua destill. 200'0,  
S. Zu Inhalationen.

745. Rp. Extr. Secal. corn. 1'0,  
Aqua destill. 10'0,  
S. Zu subcut. Injectionen.

746. Rp. Extr. Secal. corn. 1'0,  
Glycerini pur. 10'0.  
S. Zu subcut. Injectionen

747. Rp. Acid. sclerotin. 1'0,  
Aqua dest. 25'0.  
S. Subcut. 2—3 Spritzen  
in 24 Stunden zu injic.

748. Rp. Atropini sulf. 0'10,  
Aqua dest. 10'0.  
S. Zu subcut. Inj.  
( $\frac{1}{3}$  Spritze 2 bis 3mal  
täglich)

Bei anhaltendem Blut-  
husten auch Terpentinöl:

749. Rp. Ol. Terebinth. gtts 8,  
Exhibe in caps. gelatin.  
D. tales dos. Nr. 20.  
S. Alle 3 St. je 2 Kapseln.  
750. Rp. Ol. Terebinth.,  
Ol. amygdal. aa. 5'0,  
Muc. gumm. arab.,  
Syr. simpl. aa. 20'0,  
Aqua destill. 200'0.  
S. Stündlich 2 Esslöffel.

**Haemorrhoiden, goldene Ader.** Sorge für regelmä-  
ssigen und leichten Stuhlgang (Bitterwasser), Verbot  
geistiger Getränke und excessiver Körperbewegungen,  
dagegen sind regelmässige Spaziergänge empfehlens-  
werth. Womöglich Reposition. Bei entzündlichem Zu-  
stande Eisbeutel, bei Blutungen aus dem Mastdarm  
Ruhe, Eisumschläge und Suppositorien. Kühle Sitzbäder;  
beim intrarectalen Injectionen als wirksam empfohlen.  
**Operative Behandlung.**

751. Rp. Ferr. sulfur.,  
Pulv. Aloes aa. 2'0,  
Extr. r. Acor. q. s.  
u. f. pil. Nr. 20.  
S. Früh u. Abends je 2 St.
752. Rp. Alum. crudi,  
Tannini pur. aa. 10'0,  
Butyr. Cacao, q. s.  
u. f. suppositoria.  
S. Stuhlzäpfchen (bei  
Blutungen).
753. Rp. Extr. opii aqu. 0'20,  
Ung. emoll. 20'0.  
M. f. Ung. S. Salbe.

**Helkosis** vide: Ulcus contagiosum, Ulcera.

**Helminthiasis** vide: Ascaris lumbricoides, Oxyuris  
vermicularis, Taenia.

**Hemicranie, Migräne.** Beseitigung allenfallsiger Anomalien des Blutes und der Verdauung etc.; Vermeidung von Aufregungen. Während des Anfalles möglichste Ruhe, kalte oder warme Umschläge, je nach der Individualität. Anwendung des Migränstiftes (Menthol). In den freien Tagen Chinin, Coffein, Bromkali etc. Faradisation, reizende heisse Fussbäder, Waschungen mit Kölnerwasser oder Aether, auf den Kopf geträufelt; Massage, bestehend in Beklopfen (Tapotement) und Bestreuen (Kiffleurage).

756. Rp. Chinini sulfur. 0'50,  
Sacch. alb. 2'0,  
M. f. pulv. div. indos. = 3.  
S.  $\frac{1}{4}$ stündl. vor dem An-  
falle.
757. Rp. Chinini sulf.,  
Theini aa. 0'50,  
Sacch. alb. 2'0,  
M. f. Pulv. div. indos. = 5.  
S. Stündlich 1 Pulver.
758. Rp. Coffeini citr.,  
Sacch. alb. aa. 2'0,  
M. f. P. div. indos. = 10.  
S. Früh u. Abds. 1 Pulv.

Coffeinum hydrobrom.  
soll sicherer sein als C. citr.

759. Rp. Sulf. Chinini,  
Citr. Coffeini aa. 0'50,  
Sacch. alb. 2'0,  
M. f. Pulv. div. indos. = 5.  
S. Jede 2. St. 1 Pulver.

754. Rp. Ergotini 1'0,  
Aq. dest. 100'0,  
S. Zu Umschlägen (bei  
ausgetretenen H.).
755. Rp. Extr. Bellad. 0'50,  
Jodoformi,  
Plumb. acct. aa. 0'10,  
Vasellini 10'0.  
M. f. ung. S. 3—4mal  
tägl. die Knoten zu bestreichen.  
Auch Milch- oder Trauben-  
curen, Carlsbad u. dgl. zu  
empfehlen.

760. Rp. Kali bromat. 5'0,  
Aquae destill. 150'0,  
Syr. cap. ven. 15'0.  
S. Früh, Mittags und  
Abends je 2 Esslöffel.  
Natr. salicyl. 1'0 bei begin-  
nendem Schmerz, ebenso 1  
Theelöffel Kochsalz.
761. Rp. Paullinae sorbillis,  
Sacch. alb. aa. 2'0,  
M. f. Pulv. div. indos. = 5.  
S. Früh u. Abends 1 Pulv.
762. Rp. Extr. cann. Ind. 0'50,  
Pulv. et Extr. Tarax. q. s.  
u. f. pilul. Nr. 25.  
S. 3mal täglich vor der  
Mahlzeit zu nehmen.
763. Rp. Opodeldoc. 50'0.  
S. Zum Einreiben.
764. Rp. Mentholi 1'0,  
Ol. Olivar. 0'50,  
Lanolini 8'50,  
M. f. ung. S. Salbe.

Anch subcutane Injection von Extr. Secalis corn. (Nr. 745 und 746) oder Inhalation von Amyl-

nitrit (Nr. 128) 2—5 Tropfen auf ein Taschentuch und Antipyrin 10 p. dos. in Oblaten.

**Herpes, Bläschenflechte.** Behandlung expectativ. Während der Bläschenbildung Bestreuung mit Amylum; Borken sind zu befeuchten; passender Schutzverband.

765. Rp. Oxydi Zinci 5'0,  
Amyl. pur. 30'0.  
S. Streupulver.

766. Rp. Alum. plumbos.,  
Pulv. Ircos flor. aa. 2'0,  
Amyl. pur. 50'0.  
S. Streupulver.

767. Rp. Ung. Plumb. 10'0,  
Ung. emollient. 20'0.  
S. Salbe.

Bei Herpes iris mit Fieber:

768. Rp. Chinini sulfur. 1'0,  
Sacch. alb. 2'0,  
M.f. Pulv. div. in dos. = 5.  
S. Jede 3. Stunde 1 Pulv.

Bei Herpes iris im Munde:

769. Rp. Kal. chlorici 2'0,  
Aquae destil. 200'0,  
Syr. rub. Idaci 15'0.  
S. Mundwasser.

770. Rp. Tinct. Ratanh. 20'0.  
S. Zum Bepinseln.

Gegen die Schmerzen bei Herpes Zoster subcut. Morflum- oder Chloroform-Injectionen oder:

771. Rp. Extr. Laud. aq. 5'0,  
Empl. Lithargyr. 50'0.

S. Pflaster (zur Bedeckung d. betr. Partie).

772. Rp. Empl. Cicutae,  
Tend. supra lint.,  
Insperg. pulv. Laud. p. 5'0.  
S. Pflaster.

773. Rp. Extr. Belladonn. 5'0,  
Vasellini 30'0.  
S. Salbe.

**Herpes tonsurans.** Bei geringer Ausbreitung Schmierseife u. dgl. ausreichend; bei grösserer Ausbreitung Seifenbäder und nachträgliche Einreibung von Carbol- oder Salicylsäurelösungen, hierauf Amylum. Bei Herpes tonsurans capillitii das Verfahren wie bei Favus.

774. Rp. Chlorali hydrat. 3'0,  
Vasellini 30'0.  
S. Salbe.

775. Rp. Sapon. viridis 50'0.  
S. Schmierseife.

776. Rp. Spir. sap. kal. 50'0.  
S. Zum Abreiben.

777. Rp. Acid. carbol.,  
Spir. Lavand. aa. 2'0,  
Spir. vini Gall. 100'0.  
S. Zum Einreiben.

778. Rp. Acid. salicyl.,  
Spir. Lavandul. aa. 2'0,  
Spir. vini Gall. 100'0.  
S. Zum Einreiben.

779. Rp. Amyl. pur.,  
Alum. plumb. plo. aa.  
50'0.  
S. Streupulver.

780. Rp. Ac. borici 10'0,  
Spir. vini 300'0,  
Ol. Caryophyll. 2'50.  
S. Zum Einreiben.

781. Rp. Naphitol 1'0,  
Spir. vin. Gall. 100'0.  
S. 2mal tägl. durch 2 bis  
3 Tage einzupinseln.



Bei Herpes tons. maculosus:

782. Rp. Sapon. virid. 100'0,

Naphthol 2'0,

Spir. Lavand. 10'0.

S. An 2 oder 3 Abenden einzureiben.

Bei entzündeter Haut sind Salben anzuwenden.

Auch Schmierseifencyclus (vide: Psoriasis) Winkinson'sche Salbe (Nr. 613), Pyrogallussalbe (v. Nr. 4) und zwar bei Herpes tons. maculosus am Stamm.

**Hordeolum, Gerstenkorn.** Warme Kataplasmen (Semmelbrei); rechtzeitige Eröffnung durch einen feinen Stich und Entleerung des Eiters. Bei häufiger Recidive in der entzündungsfreien Zeit Anwendung einer Salbe des Abends oder Bepinselung mit Theocr (Nr. 696).

785. Rp. M. praec. flavi 0'20,

Vaselini 5'0.

S. Salbe.

786. Rp. M. praec. rubr. 0'20,

Ung. emollientis 5'0.

S. Salbe.

783. Rp. Oxydi Zinc. 6

Vaselini 50'0.

S. Salbe.

784. Rp. M. praec. alb.

Vaselini 50'0.

S. Salbe.

787. Rp. Lact. sulf. 10'0,

Spir. vin. Gall. 50'0.

Spir. Lavand. 10'0.

Glycerini 1'50.

S. Mittels Glasstab Abds. auf die Lider aufzutragen.

**Hydrocephalus, Gehirnhöhlen-Wassersucht.** Beim acuten Hydrocephalus dasselbe Verfahren wie bei Meningitis oder Gehirnhyperämie (Eisumschläge, kalte Uebergiessungen, reizende Clystiere); beim chronischen Hydrocephalus der Kinder Behandlung der Rachitis und Scrophulose, demnach entsprechende Nahrung, Laudluft, Ammenmilch, Eisen, Leberthran etc.

788. Rp. Jodoform. 1—2'0.

Collodii 10'0.

S. Zur Bepinselung (auf Stirn, Schläfe u. Nacken mehrmals täglich).

789. Rp. Ferr. carb. sacch. 0'50.

Sacchari alb. 2'0.

M. f. P. div. in dos. = 10.

S. Früh u. Abds. 1 Pulv.

790. Rp. Kal. jodat. 2'0.

Aquae destill. 100'0.

Syr. rub. Id. 15'0.

S. Stündl. 1 Kindertöffel.

791. Rp. Hydrarg. chlorat.

1'0.

Sacch. alb. 5'0.

M. f. p. Div. in dos. = 10.

S. 3—4 P. täglich.

**Hydrophobie** vide: Lyssa.

**Hydrops** vide: Ascites.

**Hyperaemia cerebri, Gehirnhyperämie.** In erster

Linie ist der Causal-Indication Rechnung zu tragen (Herzfehler, Emphysem etc.). Erhöhte Lagerung des Kopfes, absolut Ruhe, Verdunkelung des Zimmers. S. dann Blutentziehungen, Eisumschläge auf den Kopf, Zufuhr von Wärme an die Extremitäten, ferner entzündliche Abführmittel, in specie Clysmen. Regelung d. Lebensweise, geringe Zufuhr von Nahrungsmitteln.



**Hyperidrosis, profuse Schweißabsonderung.** Bestreuung mit Amylum oder Alumen plamosum pulv. Haut möglichst trocken zu halten; nächst den Genitalien und in der Achselhöhle Einlagen von Baumwolle behufs Vermeidung von Reibung; bei Fußschweiß leichte Fußbekleidung, innen mit Amylpulver bestreut; auch häufige kalte Waschungen; Tanninbäder, Sublimatbäder, auch Bäder von Decoct. cort. Quercus.

792. Rp. Amyl. pur. 50·0.

S. Streupulver.

793. Rp. Semin. Lycop. 50·0.

S. Streupulver.

794. Rp. Alumin. plumos. 50·0.

S. Streupulver.

795. Rp. Acidi salicyl. 2·0,

Amyl. puri 50·0.

S. Streupulver.

796. Rp. Acid. salicyl. 2·0,

Alum. cr. pulv. 5·0,

Amyli trit. 20·0,

Ol. Bergamott. gtt. 10,

Spir. Vini 5·0,

Talc. venet. 70·0.

S. Streupulver.

797. Rp. Ac. salicyl. 1·0—2·50,

Amyl. pur.

Talc. venet. pulv. aa. 50·0,

S. Streupulver.

Bei stinkenden Fußschweissen:

798. Ung. Diachyl. 50·0.

S. Salbe (allabendlich aufzulegen, des Tags zu bestreuen).

799. Rp. Naphthol. 5·0,

Alcohol. 100·0,

Glycerini 10·0.

S 1—2mal täglich einzutupfen u. darauf Amylum.

800. Rp. Amyl. pur. 50·0,

Naphthol. 1·0.

S. Streupulver.

801. Rp. Ac. salicyl. 3·0—5·0,

Ung. simpl. 50·0.

S. Salbe.

802. Rp. Ac. borici sub. p. 5·0,

Vasellini 25·0.

S. Salbe.

803. Rp. Alumin. acet. 2·0,

Aquae destill. 200·0.

S. Zu Waschungen.

**Hysteria.** Allenfallsige Anomalien der Menstruation, Chlorose oder Anämie etc. zu behandeln. Rücksicht auf den Zustand des Uterus und der Adnexa. Regulierung der Darmfunctionen. Medicamente (Bromkali) auf die Anfälle zu beschränken, möglichste Vermeidung aller Narcotica. Bei Dyspnoe in Folge v. Flatulenz: Brausepulver, Spir. aether.; bei Gehirnanämie Excitantien. Passende Beschäftigung und Bewegung in frischer Luft. Massage, Psychische Behandlung; Kaltwassercur; Brunnencur in Marienbad oder Franzensbad, Roncesgno, Seebäder; krampfstillende Mittel innerlich; Electricität in passenden Fällen, Magnetotherapie.

804. Rp. Tinct. Ferr. acet. 2·0,

Tinct. Castorei gtt. 10,

Aquae Lauracer. 5·0.

S. 5 Tropf. Früh u. Abds.

805. Rp. Ferr. lact.,

P. rad. Rhei aa. 5·0,

Extr. Gent. q. s. f. pil. 60.

S. 3mal tägl. je 2—3 P.

806. Rp. Tinct. Valerian. 5·0.

Aq. antihyst. foet. 25·0.

S. 3ständl. 1 Kaffeelöffel.

807. Rp. Inf. rad. Valerianae

e 10·0 ad 100·0,

Asae foet. ell. oel sub. 2·0.

S. Früh, Mittags und

Abends 1 Kaffeelöffel.

808. Rp. *Castorei* mosc. 0·50,  
*Sacch. alb.* 2·0,  
*M. f. P. div. in dos.* = 10.  
*S. Früh u. Abends 1 Pulv.*

809. Rp. *Extr. Valerian.* 2·0,  
*Aqu. Castorei* 50·0.  
*S. 3maltägl. 1 Kaffeelöff.*

810. Rp. *Tinct. Castorei*,  
*Tinct. Valerian. aa.* 2·0,  
*Tinct. Asae foet.* 5·0,  
*Tinct. opii croc.* 1·0.  
*S. 3maltägl. je 10 Tropf.*

**Ichthyosis, Fischschuppenkrankheit.** Aussel-  
 locale Behandlung; lauwarme Bäder; Einreibu-  
 Fett, Oel, Leberthran, Schmierseife (vide Pso-)

813. Rp. *Natr. carb.* 300·0.

*S. In's Bad.*

Bei circumscrip-  
 Formen:

**Icterus, Gelbsucht.** Die Behandlung berücksie-  
 ursächlichen Verhältnisse und die einzelnen Sy-  
 Daher sind Mittel zu verabfolgen gegen Cat-  
 Magens und des Duodenums (siehe diese); b-  
 Bettruhe und Diät; bei Schmerzen in der Leb-  
 warme Umschläge. Ferner Stuhl und Harn bef-  
 Mittel; gegen das Hautjucken sind warme E-  
 weilen von Effect. Carlsbad.

815. Rp. *Natr. bicarb.*,  
*Sacch. alb. aa.* 15·0.  
*S. Messerspitze. 2ständl.*

Bei Stuhlverstopf.: Marien-  
 bader Kreuzbrunn, wenig  
 Bitterwasser oder:

816. Rp. *Extr. Rhei ch.* 2·0,  
*Extr. Aloës aquos.* 5·0,  
*Pulv. Trifol. fibr. q. s.*  
*n. f. pil. Nr. 50.*

*S. Früh und Abds. je 3 Pill.*

817. Rp. *Decoct. Tamarind.*  
*e 20·0 ad 150·0,*  
*Acid. tartar.* 2·0,  
*Syr. mannat.* 20·0.  
*S. Stündlich 1 Esslöffel.*

Bei hystero-epile-  
 Anfällen:

811. Rp. *Chloral. hy-*

*Morfi mur.* 0·

*Sacch. alb.* 2·

*M. f. Pulv.*

*S. Auf 1mal z:*

Bei Schlaflosig-

812. Rp. *Paraldeh-*  
 2·0 - 2

*Syr. cort. aur.*

*S. Auf 1mal z:*

814. Rp. *Acid. acet.*

*Spir. vini galli*

*S. Zu Umschlä-*

818. Rp. *Natr. bic*

*Aquae destill.* 1

*Syr. Mororum*

*S. Stündlich 1*

819. Rp. *Calomelis,*

*Sacch. alb. aa.*

*M. f. Pulv. div. in*

*S. Jede 3. Stunde*

Gegen das Hautju-

Icterus Essigwasc

warme Bäder o

820. Rp. *Aether. Petr*

*Spir. vin. Gall*

*Acid. carbol.* 1

*Glycerini* 1·50.

*S. Zum Einreib*

**Impetigo, Pustelflechte.** Ermittlung des ursä-  
 Momentes und Beseitigung der schädlichen P-  
 Erweichung der Borken durch Fett oder Oel.  
*Bäder und Umschläge* mit blossem Wasser od-  
*caementösen Zusätzen*; Salben. Carbolverband-  
*theerpalver.*

**Impotenz.** Rücksicht auf eventuelle organische Leiden, auf psychische Momente. In diesen Fällen, sowie bei vorausgegangener Onanie Hebung des Selbstbewusstseins, Elektrizität, Hydrotherapie, Eisencuren. Locale Behandlung allfälliger veralteter Tripperformen durch Aetzungen der Pars prostatica und durch Injection mittels Catheterspritze (vide: Pollution und Blennorrhoea urethrae).

**Intercostal-Neuralgie.** In leichten Fällen Ruhe und Kälte oder Wärme; bei grösserer Intensität Sinapis-mus. Morflum-Injection; Elektrizität. Points de feu.

821. Rp. Chloroformi 5'0,  
Ol. Hyosciam. coct. 20'0.  
S. Zum Einreiben.

822. Rp. Veratrini,  
Morf. mur. aa. 0'10,  
Ung. emoll. 10'0.  
S. Zum Einreiben.

823. Rp. Extr. opii aq. 2'0,  
Ung. emoll. 10'0.  
S. Zum Einreiben.

824. Rp. Morf. mur. 0'10,  
Aqua dest. 10'0.  
S. Zu subcutanen In-  
jectionen.

**Intermittens, Wechselfieber.** Während des Frostan-falles Betruhe, Erwärmung durch Frottiren mit warmen Tüchern; warmer Thee, Wärmetaschen etc.; während des Hitzestadiums kalte Umschläge, kühlende Getränke. Die eigentliche Therapie in der anfallfreien Zeit. Haupt-mittel Chinin. Bei Kachektischen auch Eisen. Luft-veränderung. Milcheur,

825. Rp. Sulf. Chin. 1'0—1'50,  
Sacch. alb. 2'0,  
M. f. Pulv. div. indos. = 5.  
D. ad. capsulas amy lac.  
S. Nach Bericht. (1 Pulv.  
3 Stund., 1 Pulv. 2 Stund.,  
und 1 Pulv. 1 Stunde vor  
dem Anfalle zu nehmen.)

Wenn die Zeit des Anfalles unbekannt so gebe man Früh, Mittags und Abends je 1 Pulver oder unmittel-barnach Beginn d. Schweiss-stadiums.

Andere Chininpräparate:

826. Rp. Chinin. sulf. 1'0,  
Extr. Gent. q. s.,  
u. f. pil. Nr. 5.  
S. Vor dem Anfalle zu  
nehmen.

827. Rp. Chinoidini 4'0.  
Ac. tartar. 0'30,  
Muc. gumm. ar. q. s.  
u. f. pil. Nr. 30.  
S. Stündl. 1—2 Stück.

828. Rp. Dect. cort. Chin. rep.,  
r. t. e 10'0 ad 100'0.  
Sol. arsenic. Fowler. 1'0.  
Syr. cinnamom. 20'0.  
S. Früh, Mittags und  
Abends 1 Esslöffel.

829. Rp. Dect. cort. Chin. fusc.  
conc. cum Vinorubr.,  
e 25'0 ad 150'0.  
Tinct. Zingiberis 1'0,  
Syr. cinnamom. 25'0.  
S. Stündlich 1 Esslöffel  
(in der Apyrexie).

830. Rp. Tinct. Chinoid. 20'0,  
Acid. Haller. 2'0,  
Aq. Menth. pip. 50'0.  
S. 2stündl. 1 Kaffeelöffel.  
In denselben Dosen wie  
Chinin auch Conchini-num sulf.

831. Rp. Chin. hydrobr. 20'0,  
Ac. citr. 0'60,  
Aqua destill. 20'0.  
S. Zu subcut. Inj. (etwa  
2 Spritzen zu inj.).

Gegen das Ohrensausen nach grossen Chinindosen:

832. Rp. *Acid. hydrobrom.* 10'0.  
S. 4stündlich 15 Tropfen in Wasser.

Als Febrifugum auch:

833. Rp. *Antifibrin.* 2'0.  
Sacch. alb.,  
Gummi arab. aa. 1'0.  
F. c. Aq. dest. pil. Nr. 20.  
S. 3–5 Pillen zu nehmen.

834. Rp. *Dect. fol. Eucalypt. gl.*  
e 10'0–20'0 ad 150'0.  
Syr. cort. aur. 20'0.  
S. Stündlich 1 Esslöffel.

835. Rp. *Fol. Eucalypt. glob.*  
pule. 0'20–0'30.  
Sacch. alb. 5'0.  
M. f. p. Dis. in dos = 10.  
S. 3mal täglich 1 P.

836. Rp. *Ammonii picronitr.*  
0'3–1'50.

Pule. rad. Liquir.,  
Sacc. Liquir. aa. 1'50.  
F. c. Aq. pil. Nr. 30.  
S. 4–5 St. tagsüber z. n.

837. Rp. *Resorcini puriss.* 0'30.  
Dentur tales dos. Nr. 3.  
Capsul. gelatinos.  
S. Alle 2 St. 1 Pule.

838. Rp. *Sol. arsen.* Fowler, 5'0.  
S. 3–5 Tropfen 4mal  
tägl. (ind. anfallfreien Zeit).

Bei Collapsus während des  
Frostanfalles:

839. Rp. *Aetheris sulfur.* 10'0.  
Camphorae ras. 0'20.  
S. Tropfen.

**Intertrigo, Frattsein.** Streupulver in leichten Fällen;  
in Fällen von Excoriationen und Geschwürsbildung  
Salben nach vorübergehender Waschung mit lauwarmem  
Seifenwasser oder Kleienabsud.

840. Rp. *Amyl. pur.* 50'0.  
S. Streupulver.

841. Rp. *Oxydi Zinci* 5'0.  
*Amyl. pur.* 50'0.  
S. Streupulver.

842. Rp. *Atom. plumos.*  
Pule. r. Treos fl. aa. 5'0.  
*Amyl. pur.* 50'0.  
S. Streupulver.

843. Rp. *Magn. ust. pulv.* 5'0.  
Talei ven. 20'0.  
*Ac. salicyl.* 0'20.  
S. Streupulver.

Streupulver eignen sich für  
Fälle ohne Excoriationen.

844. Rp. *Oxydi Zinci* 5'0.  
*Vaselini* 50'0.  
S. Salbe.

845. Rp. *Merc. praecipit. alb.*  
*Oxydi Zinci* aa. 2'0.  
*Vaselini* 50'0.  
S. Salbe.

Vor Erneuerung der Salbe  
Waschungen angezeigt.

846. Rp. *Zinci sulfur.* 5'0.  
*Aquae destill.* 200'0.  
S. Zu Umschlägen oder  
Waschungen.

Statt Zink auch Plumbum  
od. adstring. Mittel zu ver-  
wenden (Sublimat 0'05 auf  
100'0 Aq. u. dgl.).

847. Rp. *Ac. salicyl.* 2'0.  
*Vaselini* 50'0.  
*Zinci oxydat.*  
*Amyl. pur.* aa. 25'0.  
S. Pasta.

848. Rp. *Cocaini oleinici* 0'5  
bis 1'0.

*Lanolini* 18'0.  
*Ol. Olivar.* 2'0.  
S. 2mal täglich einzu-  
reiben und hierauf einzu-  
pudern.

**Iritis, Regenbogenhautentzündung.** Berücksichtigung  
der ursächlichen Momente: Einreibungscur etc., bei  
*Syphilis*, Salicylsäure bei rheumatischer Form; in



manchen Fällen Bettruhe; Atropineinträufelung, Verdunkelung des Zimmers, Schutzbrillen, keinerlei Anstrengungen der Augen, Sorge für Leibesöffnung, Blutegel. Bei starken Schmerzen heisse Umschläge. Zur Zerreissung hartnäckiger Synechien, als stärkeres Myriaticum Hyoscin oder der abwechselnde Gebrauch eines Myoticum und Mydriaticum (Eseria und Atropin).

849. Rp. *Atropini sulf.* 0'05,  
*Aquae destill.* 10'0.

S. Augentropfen (je 1 bis 2 Tropfen in den Bindehautsack einzuträufeln). Bei Atropin-Conjunctivitis ist dieses zu sistiren; auch Intoxications-Erscheinungen können sich einstellen. Als Ersatzmittel des Atropins gilt Duboisin:

850. Rp. *Duboisini* 0'03,  
*Aquae destill.* 3'0.

S. Augentropfen.

851. Rp. *Homatropini hydrobromat.* 0'10,  
*Aquae dest.* 10'0.

S. Augentropfen (sehr schwaches Mydriaticum).

852. Rp. *Extr. Bellad.* 150,  
*Ung. cinerei* 10'0.

S. Auf Stirne u. Schläfe erbsengross einzureiben.

Bei grossem Schmerz und Licht-chen.

853. Rp. *Cocaini mur.* 0'25,  
*Atropini sulf.* 0'03,

*Aquae dest.* 5'0.

S. Augentropfen.

854. Rp. *Morfi mur.*,  
*Atropin. sulf.* aa. 0'05

*Aquae dest.* 10'0.

S. Augentropfen.

855. Rp. *Hyoscini hydrojod.* 0'01,  
*Aquae dest.* 5'0.

S. Augentropfen.

(1 Tropfen einzuträufeln; Intoxicationsgefahr grösser als bei Atropin!)

855. Rp. *Eserini sulf.* 0'05,  
*Aquae dest.* 10'0.

S. Augentropfen (Myoticum).

857. Rp. *Pilocarpini mur.* 0'05,  
*Aquae dest.* 10'0.

S. Augentropfen (Myoticum.)

Bei Syphilis Einreibungsur, eventuell:

858. Rp. *M. subl. corr.* 0'10,  
*P. et. Extr. Acor.* aa. q. s.

u. f. pill. Nr. 20.

S. Früh u. Abends 1 St. (Mundwasser!)

859. Rp. *Kal. jodat.* 5'0.

*Aquae destill.* 150'0.

*Syr. cort. aur.* 15'0.

S. Früh, Mittags und Abends 1 Esslöffel.

860. Rp. *Calomelanos* 0'10,  
*Sacch. alb.* 2'0.

*M. f. Pulv. div. in dos.* = 5.

S. 2 Pulver täglich.

Auch subcutane Injectionen von Mercurial-Präparaten vide: Syphilis.

851. Rp. *Natr. salicyl.* 10'0,  
*Div. in dos.* = 5.

*D. ad caps. amyl.*

S. Täglich 1—3 Pulv.

**Ischias, Hüftweh.** Berücksichtigung des ursächlichen Momentes; im Falle von Constipation sind Abführmittel anzuwenden, ferner Dampfbäder und locale Reize, Einreibung von Ichthyol; Elektrizität, Points de feu; in unheilbaren Fällen subcut. Morphium-injection. Nebst Jod zuweilen auch Salicylsäure.



862. Rp. *Opodeldoc* 50'0,  
*Extr. Op. ag.* 1'0.  
*S. Früh u. Abends einzur.*

863. Rp. *Veratrin.* 0'10,  
*Vaselini* 30'0.  
*S. Zum Einreiben.*

864. Rp. *Tinct. Jodinae* 20'0,  
*S. Zum Bepinseln.*

865. Rp. *Acid. hyperosmii* 0'10,  
*Aquae dest.* 10'0,  
*S. 3—5 Tropfen subcutan.*

866. Rp. *Kal. hydrojod.* 5'0,  
*Aq. dest.* 150'0.  
*Syr. simpl.* 15'0.  
*S. Früh, Mitt. u. Ab. 1 Essl.*

867. Rp. *Acid. salicyl.* 5'0,  
*F. Pulv. div. indos.* = 10.  
*S. 1—2ständl. 1 Pulver*  
*in Oblaten.*

868. Rp. *Natr. salicyl.* 10'0,  
*F. Pulv. div. indos.* = 10.  
*S. 1—2ständl. in Oblaten*  
*zu nehmen.*

869. Rp. *Ol. Tereb. rectific.* 5'0,  
*Magnes. carb. q. s.,*  
*n. f. pil. Nr. 50.*  
*S. Früh u. Abends je 5 Pill.*

870. Rp. *Ol. Terebinth.* 5'0,  
*Mellis despum.* 30'0.  
*S. Früh und Abends*  
*1 Kaffeelöffel.*

**Kephalaematoma, Kopfblutgeschwulst.** Behandlung expectativ; Umschläge auf den Kopf mit blossem, kaltem oder Goulard'schem Wasser in den ersten Tagen; nach 3—4 Tagen sind die Umschläge zu sistiren; die Geschwulst schwindet sodann von selbst.

**Keratitis, Hornhautentzündung.** Berücksichtigung der ursächlichen Momente, ob consecutiv (Bindehautentzündung etc.), ob primär (Scrophulose, Lues, Trauma, Refrigerium etc.) und eventuell Allgemeinbehandlung. Atropin-Eintränkung, eventuell Schutzverband, Schutzbrillen; bei intensiven Schmerzen in sonst kräftigen Individuen Blutegel; körperliche u. Augenruhe; leichte Abführmittel.

871. Rp. *Atropini sulf.* 0'05,  
*Aquae destill.* 10'0.  
*S. Augentropfen.*

Gegen Lichtsehen und Schmerz;

872. Rp. *M. praec. alb.* 1'0,  
*Extr. Belladonna.* 1'50,  
*Ung. simpl.* 10'0.  
*S. Bohnengross an Stirne*  
*und Schläfe einzureiben.*

873. Rp. *Cocaini mur.* 0'10,  
*Aquae dest.* 5'0.  
*S. Augentropfen.*

Gegen intensive und ausstrahlende Schmerzen:

874. Rp. *Extr. Belladonna.* 1'0,  
*Ung. cinerei* 5'0.  
*S. Auf Stirne u. Schläfe*  
*einzureiben.*

875. Rp. *Extr. Opil ag.* 0'50,  
*Ung. Hydrarg.* 10'0.  
*S. Wie vorher.*

Wenn keine Reizungserscheinungen vorhanden sind und zur Aufhellung der Trübungen:

876. Rp. *Calomelan. laevig.*  
*alcool.* 5'0.

*S. Zu Handen des Arztes.*  
*(Zum Einstreuen in den*  
*Bindehautsack.)*

877. Rp. *Jodoformi pulv.* 5'0,  
*S. Wie vorher.*

878. Rp. *M. praecip. flav.* 0'20,  
*Vaselini* 5—10'0,  
*M. exactiss., f. Ung. ophth.*

*S. Stecknadelkopfg. auf*  
*die abgezogene Lidbindehaut*  
*gleichmässig zu verthei-*  
*len. (Pagenstecher-*  
*sche Salbe.)*

879. Rp. *Tinct. Opil croc.* 5'0,  
*S. Je 1 Tropfen in den*  
*Bindehautsack einzutr.*

Zur Aufhellung von Trübungen auch Massage:

Bei Keratitis scrophulosa  
Halber Jodwasser oder:

**Kolik.** Berücksichtigung der causalen Verhältnisse (schwer verdauliche Nahrungsmittel, Verstopfung, Menstruationsanomalien, Gallensteinbildung etc.), sodann Verordnung entsprechender Kost, Abführmittel etc. Warme Umschläge auf den Unterleib, warme Bäder, Massage, Clystiere.

881. Rp. *Aq. Laurocer.* 10'0,  
*Tinct. Laud. simpl. gtt.* 15.  
*S. Stündl.* 10 Tropfen  
(wenn keine Stuhlverstopfung vorliegt).

880. Rp. *Kal. jodat.* 1'0,  
*Aquae destill.* 100'0,  
*Syr. cort. aur.* 15'0.  
*S. Stündlich* 1 Esslöffel.  
Vide: *Ulcus corneae.*

Bei Flatulenz eine Tasse  
Thee, Kamillen, Mentha  
pip., Valeriana etc., vide:  
*Colica flatulenta.*

**Laryngismus stridulus** vide: *Spasmus glottidis.*

**Laryngitis acuta, acuter Kehlkopfcatarrh.** Kalte Ueberschläge um den Hals, leichte schweisstreibende Mittel (Flüederthee); Ruhe und gleichmässige Temperatur. Meidung kalter Getränke; empfehlenswerth Selterswasser, Giesshübler mit Milch; Krondorfer, Radeiner Sauerbrunn; Milderung des Hustenreizes durch *Narcotica*. Aufenthalt in warmer Atmosphäre. Inhalationen warmer Dämpfe, erst später eines leicht adstringirenden Mittels.

Bei Kindern Bettruhe, feuchte Zimmerluft, warme Umschläge, warme Limonade, warmes Zuckerwasser; bei schwerer Respiration statt der bisher üblichen Brechmittel Einathmung heisser Wasserdämpfe, selbst bei kleinen Kindern leicht ausführbar durch Thätigkeit des Inhalationsapparats unter der über das Gesicht gehobenen Decke.

882. Rp. *Inf. rad. Ipecacuanh.*  
*e* 1'0 ad 200'0,  
*Syr. rub. Idaci* 20'0.  
*S. Stündlich* 1 Esslöffel.

883. Rp. *Extr. Bellad.* 0'10,  
*Sacch. alb.* 2'0,  
*M. f. P. div. in dos.* = 10.  
*S. Fröh, Mittags und*  
*Abends* 1 Pulver.

Zur Verminderung des  
Hustenreizes:

884. Rp. *Pulv. Doveri,*  
*Natr. bicarb.,*  
*Sacch. alb. aa.* 1'0,  
*M. f. P. div. in dos.* = 10.  
*S. Fröh, Mittags und*  
*Abends* 1 Pulver.

885. Rp. *Aquae Lauroc.* 10'0,  
*Mur. Morfil* 0'05.  
*S. Jede* 2. *Stunde* je  
10 Tropfen

886. Rp. *Cocaini mur.*  
*0'25—0'50,*  
*Aquae dest.* 250'0.  
*S. Zu Inhalationen.*

887. Rp. *Cocaini mur.*  
*0'25—0'50,*  
*Aquae dest.* 250'0.  
*Kal. chlor.* 5'0.

*Aquae Lauroc.* 10'0.  
*S. Zur Inhalation.*  
888. Rp. *Kal. chloric.* 2'0.  
*Aquae destill.* 200'0.  
*S. Zur Inhalation.*

889. Rp. *Atum. crud.* p. 2'0,  
*Aquae destill.* 200'0.  
S. Zur Inhalation.
890. Rp. *Natr. bicarb.* 2'0,  
*Aquae dest.* 200'0.  
S. Zur Inhalation.
891. Rp. *Aquae Lauroc.* 10'0,  
*Mur. Morfii* 0'10.  
S. Je 10 Tropfen in das  
zu inhalirende Flüssigkeits-  
quantum.
892. Rp. *Morfii mur.* 0'20,  
*Atum. crud. pulv.* 2'0,  
*Sacch. alb.* 15'0.  
S. Zum Einblasen mit  
Hilfe d. Kehlkopfspiegels  
und des hiezu geeigneten  
Instrumentes.
893. Rp. *Cocaini mur.*  
0'20—0'50,  
*Bism. subnitr.,*  
*Sacch. alb. aa.* 5'0,  
*Morf. mur.* 0'20.  
S. Zur Insufflation.
894. Rp. *Apomorph. mur.* 0'10,  
*Aquae dest.* 10'0.  
S. Zu subcut. Inj.  
Bei Kindern:
895. Rp. *Inf. rad. Ipecac.*  
e 0'30 ad 100'0,  
*Extr. Hyosc.* 0'10,  
*Syr. rub. Id.* 10'0.  
S. Stündl. 1 Kindertöffel.
896. Rp. *Inf. rad. Ipecac.*  
e 0'30 ad 100'0,  
*Extr. cann. Ind.* 0'10,  
*Syr. rub. Idaei.* 10'0.  
S. Stündl. 1 Kindertöffel.

897. Rp. *Extr. Hyosc.* 0'20,  
*Aq. Amygd. amar.* 5'0,  
*Muc. Gumm. arab.* 20'0,  
*Syr. emulsio.* 30'0.  
*F. Linctus.*  
S. Stündl. 1 Kaffeelöffel.
898. Rp. *Mixt. oleos.* 100'0,  
*Aquae Lauroc. glts* 20,  
*Syr. Ipecac.* 10'0.  
S. Stündl. 1 Kaffeelöffel.
899. Rp. *Dec. Altheae* 100'0,  
*Sal. Ammon. dep.* 1'0,  
*Syr. cap. Ven.* 10'0.  
S. Stündl. 1 Kaffeelöffel.

Wenn gleichzeitig Schwel-  
lung der Tonsillen oder gar  
ein Belag an denselben sich  
einstellt:

900. Rp. *Kal. chlorici* 1'0,  
*Aquae destill.* 80'0,  
*Syr. rub. Id.* 10'0.  
S. Jede 2. St. 1 Kindert.
901. Rp. *Linct. gumm.* 50'0,  
*Tart. emetic.* 0'20.  
S. Je 10 Min. 1 Kaffeel.,  
bis Erbrechen erfolgt.
902. Rp. *Inf. rad. Ipecac.*  
e 1'0 ad 50'0,  
*Syr. rub. Idaei* 10'0.  
S. Wie das Vorige.

Bei Anämie, Scrophulose  
etc. Berücksichtigung des  
Allgemeinzustandes n. ins-  
besond. Regelung der Diät.

### Laryngitis chronica, chronischer Kehlkopf-Catarrh.

Ermittelung der Ursache und allenfallsige allgemeine  
Behandlung (Syphilis, Tuberculose, Stimmbandlähmung).  
Jedweder Reiz auf den Kehlkopf hintanzuhalten; Ver-  
meidung von kalten Getränken, von Alcoholicis, reizenden  
Speisen, staubigen oder raucherfüllten Localen;  
Verbot des Ausgehens bei Wind und Staub, des Rauchens  
etc. Starker Hustenreiz durch Narcotica zu mildern.

*Inspersionen* pulverisirter Medicamente mit  
Hilfe eines einfachen Pulverbläfers und Kehlkopfspiegels.

Man inspergirt: Alumen crud. pulv., Ac. tannicum, Plumb. acet., Sacch. alb. allein oder mit Narcoticis.

Einpinselungen (anfangs schwacher Lösungen) unter Controle des Kehlkopfspiegels mit Hilfe des Aetzpinsels. Jede Cauterisation muss unterbleiben, falls die unter allen Umständen vor auszuhende Untersuchung eine Infiltration der Lunge constatirt.

903. Rp. Extr. Belladon. 0'50,  
Alum. crud. pulv.,  
Sacch. alb. aa. 5'0.

S. Zum Einblasen. (Insufflation mit Hilfe des Kehlkopfspiegels.)

904. Rp. Pulv. Dover.,  
Sacch. alb. aa. 5'0.  
S. Zum Einblasen.

905. Rp. Morfii muriat. 0'50,  
Tannini pur.,  
Sacch. alb. aa. 5'0.  
S. Zum Einblasen.

906. Rp. Acid. carbol. 2'0,  
Spir. vini conc.,  
Glycerini aa. 10'0.  
S. Zum Bepinseln.

907. Rp. Argent. nitr. cryst.  
1'0—2'0—5'0—10'0,  
Aqua destill. 50'0.

S. Zum Bepinseln. (Im Beginne die schwächeren, allmählig die stärkeren Lapis-Lösungen zu verwenden.)

In geeigneten Fällen durch 10—20 Min. Inhalationen von adstringirenden Mitteln, ferner Ol. Terebinth., Juniperi etc. Vide: Anhang. Gegen den Husten:

908. Rp. Aq. Laurocer. 10'0,  
Morf. mur. 0'10,  
S. Tropfen.

909. Rp. Extr. Belladonn. 0'10,  
Sacch. alb. 2'0,  
M. f. P. div. in dos. = 10.  
S. Früh u. Abds. 1 Pulv.

910. Rp. Morf. mur. 0'10,  
Pulv. rad. Ipecac. 0'20,  
Sacch. alb. 2'0,  
M. f. P. div. in dos. = 10.  
S. Früh u. Abds. 1 Pulv.

Bei Schlaflosigkeit:

911. Rp. Chloral. hydr. 2'0,  
Mixt. gummos.,  
Syr. simpl. aa. 50'0.  
S. In 3 Portionen zu nehmen, bis Schlaf erfolgt.

## Laryngitis crouposa (häutige Bräune), Angina

membranacea, Croup. Bettruhe, Eisumschläge auf den Hals, Eispillen, Gefrorenes; Inhalation von heissen Wasserdämpfen, Cauterisation der croupösen Partie mit Hilfe des Kehlkopfspiegels. Gurgelwässer, Abführmittel; reizende Clystiere, Lüftung des Krankenzimmers; gegen das Fieber Chinin, Salicylsäure. Diät: Milch, Kalbsbrühe, bei reichlicher Schleimabsonderung und Athembeschwerden die üblichen Mittel (Ipecac., heisse Dämpfe), in hartnäckigen Fällen Einführung eines Katheters (Tubage) in Kehlkopf und Trachea; in letzter Linie Brechm. Bei drohend. Gefahr Tracheotomie.

912. Rp. Kal. chlorici 10'0,  
Aqua destill. 500'0,  
Syr. rub. Idaei 20'0.

S. Mundwasser, jede  $\frac{1}{2}$  Stunde zu verwenden (auch innerl. stündl.  $\frac{1}{2}$  Essl.).

913. Rp. Ac. carbol. 2'0,  
Spir. vin. conc. 20'0,  
Glycerini 50'0,  
Aqua destill. 150'0.  
S. Mundwasser.



914. Rp. *Kal. jodat.* 1'5,  
*Aq. dest.* 100'0,  
*Syr. rub. Id.* 20'0.  
*S.* 2ständl. 1 Kinderlöffel.

915. Rp. *Acid. salicyl.* 2'0,  
*Natr. carb.* 1'0,  
*Aquae destill.* 500'0,  
*Syr. rub. Idaci* 20'0.  
*S.* Stündlich 1 Kinderlöffel (lauwarm).

916. Rp. *M. subl. corr.*  
 0'01—0'05,  
*Aquae dest.* 100'0,  
*Syr. rub. Idaci* 10'0,  
*S.* Stündlich 1 Theelöffel.

Bei hohem Fieber:

917. Rp. *Chinini sulf.* 1'0—2'0,  
*Sacch. alb.* 5'0,  
*M. f. p. Div. in dos.* = 10.  
*S.* Jede 2 St. 1 Pulv.

Als Abführmittel:

918. Rp. *Inf. fol. Sennae*  
 c 2'0 ad 150'0,  
*Kal. chloric.* 5'0,  
*Syr. mannat.* 20'0.  
*S.* Stündlich 1 Esslöffel.

919. Rp. *Acid. carbol.* 1'0,  
*Spir. vin. conc.*,  
*Glycerini pur. aa.* 10'0.  
*S.* Zum Bepinseln.

Zum Bepinseln der croupösen Membranen:

920. Rp. *Kal. caust.* 1'0,  
*Aquae destill.* 20'0.  
*S.* Zum Bepinseln.

921. Rp. *Jodoform. p.*,  
*Sacch. Lactis aa.* 3 0.  
*S.* Zu Insufflationen.

*Natr. benzoicum* 5 bis 10'0 je nach dem Alter des Kindes.

Im Bedarfsfalle Brechmittel:

922. Rp. *Tart. stibiat.* 0'10,  
*Muc. Gumm. arab.*,  
*Syr. rub. Id. aa.* 30'0.  
*S.* ¼ständl. 1 Kinderlöffel.

923. Rp. *Inf. rad. Ipecac.*  
 c 0'50 ad 100'0,  
*Syr. Diacod.* 20'0,  
*S.* Jede ¼ Stunde 1 Kinderlöffel. (Brechmittel.)

Kann wegen asphyctischer Erscheinungen kein Erbrechen hervorgerufen werden, so schickt man dem Brechmittel ein Excitans voraus:

924. Rp. *Moschi* 0'15—0'20,  
*Sacch. alb.* 2'0,  
*M. f. Pulv. div. in dos.* = 5.  
*S.* Jede 2. St. 1 Pulver.

Zu Inhalationen: *Kal. chloricum*, *Alum. crudum*, *Aqua calois* etc.

925. Rp. *Bromi pur.*,  
*Kal. bromat. aa.* 0'20,  
*Aquae dest.* 100'0,  
*S.* Zu Inhal. (auf einem Schwamm aufgeträufelt).

926. Rp. *Ol. Eucalypt. e fol.* 5'0,  
*Spir. vini rectif.* 20'0,  
*Aquae destill.* 180'0,  
*S.* Umgeschüttelt zu gebrauchen (für 10 Inhalat.).

**Leukaemie.** Rücksicht auf die Ursache: Erkältung, Traumen, Menstruationsanomalien, psychische Einflüsse, Syphilis, Intermittens, Darmentarrhe. Verabreichung grosser Dosen von Chinin (bes. das amorphe salzsaure Chinin) bei gleichzeitiger Anwendung der Kälte auf die Milzgegend. Bei Knochenaffection Jodkali 1—2'0 p. die. Zur Verkleinerung chron. Milztumoren wurden parenchymatöse Injectionen von Extr. secal. coru., Sol. ars. Fowleri mit Erfolg ausgeführt. Zweckmässige Ernährung: Fleischsuppe mit Pepton, Bier.



**Leukorrhoe** vide: Fluor albus.

**Lichen, Knötchenflechte.** Bei *L. scrophulosorum* innerlich und äusserlich Leberthran; bei *L. pilaris* Seifenwaschung und Einreibung irgend einer weichen Salbe; bei *L. ruber* Arsenikpräparate (vide Psoriasis). Statt der innerlichen Behandlung wird Carbol-Sublimat-salbe empfohlen.

927. Rp. Ung. Diachyl. 500'0,  
Acid. carbol. 20'0,  
M. subl. corr. 0'5—1'0.

S. Mehrmals des Tages  
über den ganzen Körper  
einzureiben.

**Lupus, fressende Flechte.** Auskratzen mit dem scharfen Löffel, Sticheln mit einem Spitzbistouri oder einer Stichellanze oder multiple, lineare Scarification bei localer Aetheranästhesie; Wattedruckverband. Aetzung der Knoten und Infiltrate, besonders im Gesichte zweimal wöchentlich mit einem gut gespitzten Lapisstifte, Pacquelin's Thermokauter etc. Bei Kindern zuvor Versuche mit gelinden Mitteln, Jodglycerin, Jodtinctur, graues Pflaster. Innerlich Leberthran, Jodkali, Eisen.

928. Rp. Argent. nitr. fusi 10'0.  
S. Aetzstift (Lapis en  
Crayon).

929. Rp. Argent. nitr. cryst.,  
Aqua destill. aa. 5'0.  
S. Zum Bepinseln (bei  
ulcerirten Formen).

930. Rp. Kali caust. 5'0,  
Aqua destill. 10'0.  
S. Mit Charpiepinsel anzu-  
wenden.

931. Rp. Kali caust.,  
Calcis vivae aa. 20'0,  
Spir. vin. conc. q s.,  
n. f. pasta.

S. Wiener Aetzpasta.  
— Muss unmittelbar vor  
der Application bereitet  
und durch 10 Minuten  
liegen gelassen werden,  
aus welchem Grunde die  
einzelnen Bestandtheile  
separat zu verordnen sind,  
nämlich:

932. Rp. Kali caust. fusi 20'0.  
S. Aetzkali.

933. Rp. Calcis vivae 20'0.

S. Aetzkalk.

934. Rp. Spir. vini 50'0.

S. Weingeist.

Auch Chlorzink, Carbol-  
und Pyrogallussäure, die  
Cosme'sche, Landolf'sche u.  
Canquoin'sche Pasta (vide  
Nr. 200—202), sowie die Gal-  
vanokaustik anwendbar.

935. Rp. Acid. lactic. 10'0.  
S. Mit Pinsel od. Watta  
zu appliciren.

936. Rp. Kali hydrojod. 10'0,  
Jodi pur. 5'0,  
Glycerini 20'0.

S. 3mal wöch. zu bepins.  
Bei Lupus erythematodes:

937. Rp. Empl. Hydrarg. 15'0.  
S. Pflaster (tägl. frisch  
aufzulegen).

938. Rp. Resorcini 3'0,  
Vaselini 10'0,  
Amyli 5'0.

S. Früh und Abends ein-  
zureiben.

**Lyssa, Hydrophobie, Wuthkrankheit.** Sofortige Excision,  
besser Canterisation der Bisswunde als Vorbeugungsmaass-  
regel. Beim Ausbruche der Krankheit Isolirung, strenge  
Beobachtung, Schutz vor Selbstverletzungen; bei krat-

tigen Individuen Aderlass. Eventuell Chloralhydrat, subcutane Injectionen von Morphinum, Pilocarpin oder Curare u. dgl.

939. Rp. Kal. caust. 5'0,  
Aquae destill. 500.  
S. Aeusserlich (zum Aus-  
waschen der Bisswunde).

940. Rp. Acid. carbol. 10'0,  
Spir. vin. conc. q. s.,  
Aquae destill. 200'0.  
S. Aeusserlich. (Ebenso.)

**Malleus, Rotz.** Cauterisation der infectirten Stellen mit Kali causticum, Salpeter- od. Carbolsäure. Die auftretenden Erscheinungen sind entsprechend zu behandeln, Abscesse zu eröffnen, die Nase auszuspritzen etc. Fleissiges Waschen u. Ausspritzen der Nase mit Salicylsäurelösung.

**Mania.** Sorge für Ruhe, Bettlage, bei congestiven Zuständen Umschläge auf den Kopf. Bei Anämischen kräftige Ernährung. Aufsicht; bei grosser Aufregung und Jactation Isolirung, prolongirte warme Bäder (26° bis 23° R.) mit gleichzeitigen kalten Umschlägen auf den Kopf; bei Schlaflosigkeit Bromkali 2—3'0, Hyoscinamin 1—2'0 int. od. subcut., Chloralhydrat, Paraldehyd.

**Mastodynie, Brustdrüsenschmerz.** Unterstützung der Brust durch Bandagen in Fällen von bedeutender Schwere derselben; warme Bekleidung (Flanell, Fell auf die Brust). Bei sehr bedeutenden Schmerzen subcutane Injectionen.

941. Rp. Empl. saponat.,  
Extr. Belladonn. aa. 10'0.  
S. Pflaster (auf Lein-  
wand gestrichen an die  
schmerzhafteste Stelle).

942. Rp. Tinct. Belladonn. 5'0.  
Aq. amygd. am. conc. 20'0.  
Spir. Aetheris 5'0.  
F. Früh und Abends ein-  
zureiben.

**Melancholia.** Hebung des Ernährungszustandes (Eisen etc.), Ruhe in der Umgebung. Fernhalten von Aufregungen, Vermeidung lärmender Vergnügungen und Zerstreungen, am besten Abgeschiedenheit, eventuell Bettlage, Vorsichtsmassregeln gegen Selbstmordversuche. Bei Depression Morfin, Alkohol (Cognac), schwere Weine; bei Angstanfällen Morfininj.; bei Schlaflosigkeit Bier in grosser Quantität, Paraldehyd. Bei Abstinenz künstl. Ernährung mittels Schlundsonde.

943. Rp. Morphii mur. 1'0,  
Aquae dest. 25'0.  
S. Zu subc. Inj. (1 Spritze).

945. Rp. Ferr. pyrophosph.  
c. Ammon. citr. 2'0.

944. Rp. Paraldehyd. 3—6'0.  
Tinct. c. Aurant. 20'0.  
S. Auf 1mal zu nehmen.

Sacch. albi 5'0.  
M. f. p. Dic. in dos. = 10  
S. 3 Pulver täglich.

**Meningitis, Hirnhautentzündung.** Anwendung eigiger antiphlogistischer Mittel, so: Eisumschläge den Kopf, starke Abführmittel, kalte Clystiere, Ue-giessungen des Kopfes mit kaltem Wasser, Blut- bei Kräftigen etc., später Jodkali innerlich.

946. Rp. Calomelan. 0'50,  
Pulv. rad. Jalapae,  
Sacch. alb. aa. 2'0,  
M. f. Pulv. div. indos. = 5,  
S. 3stündlich 1 Pulver.

947. Rp. Kal. jodat. 2'0,  
Aqua destill. 150'0,  
Syr. Moror. 20'0.

S. 2stündlich 1 Esslöffel.

948. Rp. Camphor. ras. 0'50,  
Mist. gumm. 200'0.

S. Zu 2 Clystieren.

Bei Kindern: Möglichste Ruhe in der Umgebung, Verdunkeln des Zimmers, Eisumschläge, Einhüllung in kalte Tücher. Auch Chinin und Jodkali innerlich 1—2'0 pro die; später robo-

rende Diät und Mittel (Eisen etc.); bei wiederholtem Auftreten von Fraisens Bromkali oder Jodkali. Vide: Eclampsie.

949. Rp. Calomelan. 0'10,  
Sacch. alb. 2'0,  
M. f. Pulv. div. indos. = 5,  
S. Stündlich Pulver.

Bei heftigen Delirien:

950. Rp. Morf. mur. 0'02,  
Sacch. alb. 2'0,  
M. f. Pulv. div. indos. = 5,  
S. Früh u. Abds. 1 Pulv.

951. Rp. Chloral. hydr. 1'0,  
Aqua destill. 80'0,  
Syr. simpl. 10'0.  
S. Stündl. 1 Kinderlöffel.

**Metracinesis, Wehenschwäche.** In der ersten Geburtsperiode (Eröffnungsperiode) bloß symptomatisch; erst in der zweiten (Austrittsperiode) und zwar gegen das Ende derselben Verabreichung von Secale gestattet; jedoch bloß bei regelmässigen Fötaltönen, bei heberfreiem Zustande der Gebärenden und bei der Möglichkeit, die begonnene Geburt manuell oder instrumentell zu beenden. Massiren des Uterus. Entsprechende Lagerung der Gebärenden. Sprengen der Blase.

952. Rp. Secalis cornuti pulv.,  
Sacch. alb. aa. 2—3'0  
M. f. Pulv. div. indos. = 5.  
S. Jede  $\frac{1}{4}$  Stunde 1 Pulv.

953. Rp. Inf. Secal. corn.  
e 5'0 ad 150'0.  
Syr. rub. Idaci 20'0.

S. Jede halbe Stunde 1 Esslöffel.

954. Rp. Extr. Secal. corn. 3'0,  
Aqua destill. 100'0,  
Syr. rub. Idaci 10'0.  
S. Jede  $\frac{1}{2}$  St. 1 Esslöffel.

**Metritis, Gebärmutterentzündung.** Ermittlung und Beseitigung der Ursache (Erkältung, menstruelle Congestion) Absolute Ruhe, erhöhte Lagerung des Beckens. Locale Blutentziehungen (Blutegel am Hypogastrium). Bei chronischen Formen Eingiessung von heissem Wasser (30—35° R.) in die Vagina 1—2mal täglich. Sorge für Stuhlentleerung; feuchtwarme Umschläge. Beseitigung von wunden Stellen am Blasenhal, Behandlung der Endometritis. Badecuren.

**Metrorrhagie, Blutungen aus dem Uterus.** Ermittlung des ursächlichen Momentes (zurückgebliebene Eihaut- oder Placentarest, mangelhafte Involution des Uterus, Polypen, Fibrom, Carcinom, Adenom) und Behandlung desselben; Bettruhe; Diät: kühlende Getränke und Injectionen. Injectionen von heissem Wasser

(40°), Tamponade, kalte Umschläge auf den Unterleib. Als ultimum refugium intrauterinale Injection, doch ist hier conditio sine qua non, dass der Uteruscanal gut durchgängig sei. Subeutane Ergotin-Injection. Als Indicatio vitalis subeutane Injection von Aether.

955. Rp. *Infus. Secal. cornuti*  
e 5'0 ad 150'0.  
*Elixir. acid. Halleri* 2'0.  
*Syr. rub. Idaei* 20'0.  
S. Alle 10 Min. 1 Esslöffel.

956. Rp. *Secal. corn. pulv.* 2'0.  
Die. in dos. = 10.  
S. Jede Stunde 1 Pulver.

957. Rp. *Extr. Secal. corn.* 1'0.  
*Aquae destill.* 100'0.  
*Syr. flor. aurant.* 15'0.  
S. Stündlich 1 Esslöffel.

958. Rp. *Tinct. Cinnam.* 50'0.  
S.  $\frac{1}{2}$ stündl. 1 Kaffelöffel.

959. Rp. *Tinct. Ferr. ac. aeth.*  
10'0.  
*Aetheris acct. dep.* 5'0.  
S.  $\frac{1}{2}$ stündl. 15 Tropfen.

960. Rp. *Aluminis crud.* 5'0.  
*Aquae destill.* 200'0.  
S. Zu Einspritzungen.

961. Rp. *Ferr. sesquichl. sol.*  
10'0.

S. Zu Handen des Arztes  
(mittels d. Braun'schen  
Spritze lauwarm einige  
Tropfen in d. Uterushöhle  
einzuspritzen).

962. Rp. *Extr. Secalis corn.*  
*Glycerini pur. aa.* 1'0.  
*Aquae destill.* 5'0—10'0.  
S. Zu subc. Inj. (1 Spritze  
voll zu inj.).

963. Rp. *Aetheris sulf.* 5'0.  
S. Zu subc. Inj. (1 Spritze  
voll zu injiciren, Indica-  
tio vitalis!)

**Migraine** vide Hemicrania.

**Mollimina menstruationis** vide: Amenorrhoe und  
Dysmenorrhoe.

**Molluscum contagiosum** vide: Condylomata sub-  
cutanea.

**Morbilli, Masern.** Behandlung ganz expectativ. Bett-  
ruhe bei entsprechender Zimmer- und Luft-Temperatur.  
Lüftung, Verdunkeln des Zimmers, Abhaltung von  
Schädlichkeiten. Wegen Disposition zu Catarrhen gleich-  
mässige Wärme des Körpers; Warme Getränke, even-  
tuell ein indifferentes Mittel; leichte Abführmittel,  
mässige Nahrung. Treten Complicationen hinzu, so ist  
die entsprechende Behandlung einzuleiten, Isolirung der  
gesunden Kinder.

964. Rp. *Emuls. comm.* 100'0.  
*Tct. Land. spl. gtts* 2—5.  
S. Ständl. 1 Kindertöffel.

Bei sehr heftigem Husten:

965. Rp. *Pulv. Dover.* 0'20.  
*Sacch. alb.* 2'0.

M. f. *Pulv. die. in dos.* = 5.  
S. Fröh. Mittags und  
Abends 1 Pulver.

966. Rp. *Inf. rad. Ipecac.*  
e 0'30 ad 100'0.  
*Extr. Op. aq.* 0'03.

*Liq. Ammon. anis. gtts* 20.

*Syr. simpl.* 20'0.

S. Stündlich 1 Esslöffel.

967. Rp. *Morfi mor.* 0'01.

*Aquae Lauracer.* 10'0.

Je 5 Tropfen auf Zuc-

(mehrmals täglich).



**Morbus Basedowi.** Meidung psychischer Aufregungen, Reduction geistiger und körperlicher Arbeit, reizlose Diät, Landaufenthalt, Application kalter Umschläge auf die Herzgegend. Bei Anämischen Eisenpräparate, Chinin bis etwa 1·0 p. die, auch Digitalis, Jodpräparate. In passenden Fällen Hydrotherapie oder schwache galvanische Ströme auf den Hals sympatheticus.

968. Rp. *Duboisini sulf. neutr.* 0·01.

*Aq. Laurac.* 20·0.

S.  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  Spritze (=  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  Milligr.) subcutan.

**Morbus Brightii, Nierenentzündung.** Im Anfangsstadium expectativ; leichtes Diureticum: Kali aceticum; bei Hydrops heisse Bäder (40° bis 42° C. durch  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{2}$  Stunde) mit nachfolgender Einwicklung in warme Decken durch 2—3 Stunden, nebst dem schweiss-treibende Mittel (besonders Jaborandi oder Pilocarpin), Thee etc. Bei längerer Dauer der Krankheit Sorge für Ruhe, eiweissreiche Nahrung (nach Andren eiweissärmere Kost: weisses Fleisch, Fische, auch Gemüse), günstige Beschaffenheit der Wohnung etc. Behandlung der eventuellen Complicationen. In chronischen Formen Eisen, Verdauung befördernde Mittel. Grosse Mengen von Getränk: Giesshübler, Biliner, Radeiner, Preblauer, Krondorfer; Milcheur  $\frac{1}{2}$  bis mehrere Liter tägl. Hygienische u. diätetische Massregeln, warme Kleidung, wenig Bewegung, eventuelle causale Therapie (Syphilis, Malaria). Aufenthalt in warmem Klima.

969. Rp. *Sulf. Chinini* 1·0,

*Acid. sulf. dil. qttis* 10,

*Aquae destill.* 150·0,

*Roab Juniperi* 15·0.

S. Jede 2. St. 1 Esslöffel.

Im acuten Stadium mit Fieber zu verabfolgen. Im späteren fieberfreien Stadium erst passende Diuretica.

970. Rp. *Blattae orient.* 2·0,

*Die. in Dos.* = 10.

S. 2—3 Pulver täglich.

971. Rp. *Decoct. Ononid. spin.*

*e* 20·0 ad 200·0,

*Kali acetici,*

*Roab Juniperi aa.* 20·0.

S. Jede 2. St. 1 Esslöffel.

972. Rp. *Decoct. Equiseti*

*e* 10·0 ad 150·0,

*Syr. Juniperi* 20·0.

S. Stündlich 1 Esslöffel.

973. Rp. *Inf. bacc. Juniperi*

*e* 20·0 ad 200·0,

*Kali acetici,*

*Oxymell. Scill. aa.* 20·0.

S. Jede 2. St. 1 Esslöffel.

974. Rp. *Extr. Scillae* 0·30,

*Aqu. Petroselini* 100·0,

*Liq. Kali acetici* 25·0,

*Roab Juniperi* 20·0.

S. Jede 2. St. 1 Esslöffel.

Auch andere pflanzliche Diuretica (*Carex arenaria*, *Flor. Spiraeae*, *ulmariae* 5 bis 10 auf 200), ferner *Coffeinum citricum* empfohlen. Bei Vorhandensein v. reichlichem Eiweiss im Urin:

975. Rp. *Tannini pur.* 5·0,

*Extr. Aloës aqu.* 2·0.

*Pulv. et extr. Tarax. q. s.*

*u. f. pil. Nr. 50.*

S. Früh, Mittags und

Abends je 3 Pillen.



976. Rp. Tannini pur. 0·5,  
Sacch. alb. 2·0,

M. f. Pulv. div. in dos. = 5.

S. Jede 3. Stunde 1 Pulv.

977. Rp. Acid. tannic. 1—5·0,

Aqu. dest. 150·0,

Adde Sol. Natr. bic. q. s.  
ad react. alcalin.

S. In 1—2 Tagen zu ver-  
brauchen (Natrium tau-  
nicum).

978. Rp. Alum. crud. p. 2·0

Aq. dest. 100·0,

Syr. simpl. 15·0.

S. 2stündlich 1 Esslöffel.

Bei uraemischen Erschei-  
nungen Benzoëpräparate,  
gegen eclamptische Anfälle

Eisumschläge auf den Kopf,  
excitirende Clysmata, Ab-  
führmittel; Morfium-Inj.

979. Rp. Acid. benzoic. 0·50,

Elacosacch. Citr. 2·0,

M. f. Pulv. div. in dos. = 5.

S. Jede 2. Stunde 1 Pulv.

980. Rp. Flor. Benzoës,

Sacch. alb. aa. 2·0,

M. f. P. div. in dos. = 10.

S. Jede 3. Stunde 1 Pulv.

Zu versuchen ist auch:

981. Rp. Kal. jodat. 5·0,

Aquae destill. 150·0,

Syr. cort. aur. 15·0.

S. Fröh., Mittags und

Abends je 1 Esslöffel.

### Morbus maculosus Werlhofii, Blutfleckenkrankheit.

Regelung der Diät, der Wohnungsverhältnisse. Bei Nasenbluten Ausspülen mit kaltem Wasser, eventuell Tamponade; bei Bluterbrechen Eispielen. Bei schwachen Individuen Bettruhe

982. Rp. Elix. ac. Hall. 5·0,

Syr. rub. Idaci 30·0,

Aquae destill. 200·0.

S. Stündl. je 2 Esslöffel.

983. Rp. Acid. sulf. dil. 5·0,

Syr. rub. Idaci 20·0.

S. 2stündl. 1 Kaffeeöffel

in 1 Glas Wasser.

984. Rp. Decoct. cort. China,

reg. e 10·0 ad 150·0,

Acid. sulf. dil. 5·0,

Syr. cort. aur. 20·0.

S. Stündlich 1 Esslöffel.

985. Rp. Extr. Sec. corn. aq. 2·0,

Aquae dest. 120·0,

Syr. rub. Idaci 20·0.

S. Jede 2. St. 1 Kinderl.

**Morfinismus.** Entziehungscur je nach der eingeführten Menge des Morfin: plötzlich oder allmähig, Vorsorge gegen Einschmuggelung von Morfin, strenge Absonderung des Kranken. In den ersten Tagen der Entziehungscur Opium, Chloralhydrat als Ersatz. Bei eintretendem Collaps starken Wein, Cognac, eventuell interimistisch 1—2 Morfin-Injectionen. Prophylactisch: Beschränkung der Morfin-Injectionen auf die streng indicirten Fälle und insbesondere des Gebrauchs der Spritze von Seite der Kranken selbst oder deren Umgebung.

**Morpiones, Filzläuse.** Anwendung des Mittels zur Beseitigung derselben am zweckmässigsten des Abends; am darauffolgenden Tage ein Seifenbad. Allenfalls vorhandene Eczeme nachträglich zu behandeln.

986. Rp. Ung. Hydrarg. 5·0.

S. Salbe.

(Blos jene Partien einzureiben, wo Morpiones sitzen,

und nur wenig Salbe zu verwenden, damit nicht Stomat. od. Eczem erfolge.)

987. Rp. *Naphthol* 1'0,

*Ol. olivar.* 10

*S.* Zum Einreiben.

**Mydriasis, Erweiterung der Pupillen.** Ermittlung der Ursache, womöglich Beseitigung derselben. Palliativ versuche man Calabar und seine Präparate. — Optische Hilfsmittel; — Elektrizität.

990. Rp. *Eserini sulf.* 0'03,

*Aquae destill.* 3'0.

*S.* Je 1 Tropfen in den Bindehautsack einzubringen.

991. Rp. *Pilocarp. mur.* 0'10,

*Aquae dest.* 10'0.

*S.* Wie vorher. (bei Herzschwäche Vorsicht!)

988. Rp. *Petrolei* 20'0,

*Bals. Peruviani* 1'0.

*S.* Zum Bepinseln.

989. Rp. *Acid. carbol.* 0'5,

*Spir. vini Gall.* 50'0,

*S.* Zum Bepinseln.

992. Rp. *Veratrini pur.* 0'50,

*Ung. simpl.* 10'0.

*S.* 3mal täglich an Stirne und Schläfe einzureiben.

(War früher gebräuchlich.)

**Myelitis, Rückenmarksentzündung.** Rücksicht auf ein ursächliches Leiden (Syphilis, Blei-Intoxication etc.). Passende Lagerung und möglichste Ruhe, kalte Umschläge und Abreibungen; auch Kaltwassercur; Massage, bei intensiven Schmerzen Sinapismus, bei längerer Dauer Sorge für Reinhaltung.

**Nasenbluten** vide: Epistaxis.

**Nephritis** vide: Morbus Brightii.

**Neuralgia intercostalis** vide: Intercostal-Neuralgie.

**Neuralgia, Trigemini, Prosopalgia, Dolor Fothergilli, Tic douloureux, Gesichtsschmerz.** Womöglich Ermittlung und Entfernung der Ursache; bei Neuralgia rheumatica Schwitzbäder. Elektrizität frühzeitig angewendet; Behandlung mit Kälte, Einreibung von Salben; Waschungen mit Aether sulf. oder Petroleumäther; Chloroforminhalationen; Morfium-Injectionen; bei typischen Anfällen Chinin, in passenden Fällen Neurotomie.

993. Rp. *Sulf. Chinini* 2'0,

*Div. in dos.* = 5.

*S.* Vor jedem Anfalle 2 Pulver.

994. Rp. *Sol. ars. Fowler.* 10'0.

*S.* Je 5 Tropf, jede 3. St.

995. Rp. *Flor. Zinci.*

*Extr. Valerian. aa.* 2'0,

*F. pil. Nr.* 20.

*S.* Je 3 Pillen beim Anfalle zu nehmen.

996. Rp. *Veratrini pur.* 0'50,

*Vasellini* 20'0.

*S.* Salbe.

997. Rp. *Aconitini* 0'05,

*Ung. emoll.* 20'0.

*S.* Salbe.

998. Rp. *Aconitini cryst.* 0'01,

*Spir. vini conc.*

*Aq. destill. aa.* 30'0.

*S.* 1—2mal tägl. 1 Theel.

Gegen Ciliarneurose wurde auch empfohlen:

999. Rp. Crotonchlor. hydr. 1'0,  
Spir. vin. conc. 5'0,  
Aqua destill. 150'0,  
Syr. cort. aur. 15'0.  
S. Alle 2 Stunden 1 Essl.

**Noma, Wasserkrebs.** Locale Behandlung; Aetzmittel, Glüheisen; fleissige Reinigung der brandigen Flächen; antifebrile Mittel, kräftige Kost, Wein, Cognac.

1002. Rp. Calcar. chlor. 5'0,  
Aqua destill. 500'0.  
S. Zum Abspülen.  
1003. Rp. Kal. chloric. 2'0,  
Aqua destill. 200'0.  
S. Mundwasser.

1000. Rp. Morf. mar. 0'20,  
Aqua destill. 10'0.  
S. Zu subcutan. Injection.  
1001. Rp. Tinct. Gelsemi 5'0.  
S. Je 20 Tropfen 3mal  
in  $\frac{1}{2}$ stündiger Pause. (Nach-  
lass meist nach 3 Dosen.)

1004. Rp. Acid. carbol. 1'0,  
Ol. olivarium 20'0.  
S. Zum Bepinseln.  
1005. Rp. Acid. muriat. 1'0,  
Mellis rosar. 20'0.  
S. Zum Bepinseln.

**Obesitas, Fettleibigkeit.** Dauernde Umänderung der Lebensweise nach physiologischen Principien; vorübergehende sogenannte „Kuren“ verwerflich. Diät, vornehmlich aus Eiweiss und Fett bestehend, kein Zucker, auch nicht Kartoffeln etc., von Gemüsen: Spargel, Spinat, Kohl und Leguminosen. Medicamentöse Behandlung und Mineralwassercuren nur von vorübergehender Wirkung. Lebensweise im Allgemeinen ruhig und gleichmässig thätig, körperliche Bewegung mässig, also keine vermehrte Muskelthätigkeit.

**Obstipatio alvi, Stuhlverstopfung.** Beseitigung der Ursachen, sowohl bei temporärer als auch bei habitueller Stuhlverstopfung. Regelung der Diät, Mineralwässer.

1006. Rp. Infus. fol. Sennae  
e 20'0 ad 150'0,  
Magnes. sulf. 30'0,  
Syr. rub. Idaci 20'0.  
S. 2stündlich 1 Esslöffel.

1007. Rp. Olei Ricini 30'0,  
Olei Crotonis gtt. 3.  
S. 2stündlich 1 Esslöffel.  
(Beide ziemlich kräftige  
Abführmittel.)

1008. Rp. Ol. Ricini 50'0.  
S. Kaffee- bis Esslöffelw.  
(in Suppe, Thee etc.)  
Ricinusöl auch in Kapseln  
à 3—5'0 erhältlich.

1009. Rp. Ol. Ricini 30'0,  
Pulv. Gumm. arab. 10'0,  
Aqua destill. 150'0,  
Syr. mannal. 15'0.  
S. Stündlich 1 Esslöffel.

1010. Rp. Salis amari 20'0,  
Aqua destill. 200'0,  
Acid. sulf. dil. 2'0.  
S. Stündlich 1 Esslöffel.

1011. Rp. Salis amari 3'00.  
S. in Wasser aufgelöst  
auf 1—2mal z. n.

Als leichtere Abführmittel  
zu empfehlen:

1012. Rp. Spec. laxant. St. Ger-  
main. 30'0.  
S. Thee. (Der 4. Theil  
als Aufguss in einer  
Tasse z. n.)

1013. Rp. Aqua laxativa  
Viennensis 50'0,  
Syrup. rubi Idaci 10'0,  
Aqua Laurocerasi 5'0.  
S. Lauwarm zu nehmen  
(für Damen).

1014. Rp. *Elect. lenitiv.* 50° 0.  
S. In 2 Portionen z. n.

1015. Rp. *Tinct. Rhei aqu.*  
150° 0.  
S. Esslöffelweise.

1016. Rp. *Resinae Jalap.* 0° 5,  
*Vitelli ovi* Nr. 1,  
*Aq. flor. Naphae* 30° 0,  
*Syr. emulsiv.* 15° 0.

S. Stündl. 1 Kaffelöffel.  
1017. Rp. *Dect. pulp. Tamarind,*  
20° 0 ad 200° 0.

*Magnes. citricae,*  
*Syr. mannat.* aa. 20° 0.  
S. Jede 2. St. 1 Esslöffel.

1018. Rp. *Mannae calabrinae*  
*elect.* 50° 0,  
*Aquae Menth. pip.* 150° 0.  
S. Esslöffelweise.

Bei habitueller Verstopfung  
eine Zeit lang regelmässig  
zu nehmen:

1019. Rp. *Extr. Aloës aquos.*  
*Extr. Jalapae,*  
*Sapon. medicin.* aa. 5° 0,  
*P. et Extr. Rhei ch. q. s.*  
u. f. pil. Nr. 50.  
S. Morgens 4 Stück z. n.

1020. Rp. *Extr. Aloës aquos.,*  
*Extr. Taraxac.* aa. 5° 0,  
*F. pil.* Nr. 50.  
S. Früh und Abends je  
2 Pillen.

1021. Rp. *Sal. ammon. dep.* 2° 0,  
*Tart. emet.* 0° 50,  
*Pulv. Liquir.* 20° 0,  
*M. f. Pulv. D. ad Scat.*  
S. Messerspitze voll Früh  
und Abends z. n.

1022. Rp. *Cremor. Tart.* 15° 0,  
*Magn. carbon.* 0° 50,  
*Sacch. alb.* 30° 0.  
*M. f. Pulv. D. ad Scat.*  
S. Früh und Abends  
1 Kaffelöffel.

1023. Rp. *Cremor. Tart.* 15° 0,  
*Pulv. fol. Sennae* 1° 50,  
*Sacch. alb.* 30° 0.  
*M. f. Pulv.* S. Früh und  
Abends 1 Kaffelöffel.

1024. Rp. *Kali sulfurici,*  
*Cremor. Tartar.* aa. 15° 0,  
*Sacch. alb.* 30° 0,  
*M. f. Pulv.* S. Früh und  
Abends 1 Esslöffel.

1025. Rp. *Cremoris Tart.* 15° 0,  
*Coque c. suff. q. Aq. font.*  
ad 150° 0,  
*Syr. Ribiam* 15° 0.  
S. Esslöffelweise.

1026. Rp. *Pulv. rad. Rhei,*  
*Extr. Aloës aqu. au.* 5° 0,  
*Extr. Tarax. q. s.*  
u. f. pil. Nr. 50,  
S. Morgens 4 Stück zu  
nehmen.

Bei gleichzeitiger Appetit-  
losigkeit:

1027. Rp. *Pulv. r. Rhei ch.* 5° 0,  
*Extr. Trifol. fibr. q. s.,*  
u. f. pil. Nr. 50.  
S. Morgens 5 Stück z. n.  
Kräftiger wirksam sind:

1028. Rp. *Ol. Croc. Tigl. gttis* 5,  
*Pulv. et Extr. Acor. q. s.,*  
u. f. pil. Nr. 10.  
S. Morgens 3 Stück zu n.

1029. Rp. *Ol. Croton. gttis* 2—5,  
*Mucil. Gumm. arab.* 15° 0,  
*Aq. destill. cer. nigr.* 50° 0,  
*Syr. Altheae* 10° 0.  
S. Kaffee- bis Esslöffelw.

Ol. Crotonis vide ferner  
Nr. 449.

1030. Rp. *Pulv. r. Rhei ch.* 5° 0,  
*Extr. Aloës* 2° 0,  
*Extr. Colocynth.* 0° 5,  
*Extr. rad. Rhei q. s.*  
u. f. pil. Nr. 50.

S. Früh u. Abends je 2 Pill.  
1031. Rp. *Podophyllini,*  
*Saponis med.* aa. 0° 2,  
*Mellis desp. q. s.,*  
u. f. pil. Nr. 20.  
S. 1—3 Stück täglich.

1032. Rp. *Podophyllini*  
0° 05 bis 0° 20,  
*Aquae destill.* 10° 0.  
*Liq. Ammon. c. gttis* 5.  
S. Zu subcut. Inject.



1033. Rp. *Resinae Podophyll.*  
1'50.

*Extr. Hyosciami* 1'0,  
*Sapon. med. q. s.,*  
*n. f. pil.* 50.  
*S. 1—2 Stück täglich.*

1034. Rp. *Extr. Coloquinth.,*  
*Pule. rad. Rhei,*  
*Pule. Aloës,*  
*Resinae Jalapae,*  
*Gummi gutti aa.* 1'0,  
*Myrrhæ* 2'0.  
*F. Pill. Nr.* 50.  
*S. 1—4 Stück tägl. (sog.*  
*Pilul. Morissoni.)*

1035. Rp. *Pule. Jalapae,*  
*Pule. Scammonii aa.* 2'0,  
*Extr. r. Gent. q. s.,*  
*n. f. pil. Nr.* 10.  
*S. 2—5 St. bis zur erfolg-*  
*ten Wirkung.*

1036. Rp. *Resin. Jalapae,*  
*Mass. pil. Ruffii* 2'0,  
*Extr. rad. Liq. q. s.*  
*n. f. pil. Nr.* 25.  
*S. 2mal tägl. je 4—5 St.,*  
*vide Nr. 609, 610.*

Limonade gazeuse, Bitter-  
wasser: Ofen, Püllna,  
Saidschütz, Friedrichshall;  
Marienbad, Carlsbad etc.

1037. Rp. *Natr. sulf.* 100'0,  
*Natr. bicarb.* 80'0,  
*Natr. chlorat.* 40'0,  
*Kali sulf.* 5'0.  
*M. f. P. S. Künstliches*  
*Carlsbader Salz;*  
*etwa 25 Gramm in 1 Liter*  
*warmen Wassers.*

Bei Kindern eventuell  
gleichzeitige Behandlung  
der Rhachitis und Anämie.

1038. Rp. *Hydrom. infant.* 20'0  
*S. Kaffeelöffelweise.*

1039. Rp. *Manniti cryst.* 10'0,  
*Aq. dest.* 100'0.  
*S. stündl. 1 Kaffeelöffel*  
*(für Säuglinge).*

1040. Rp. *Syr. mannat.,*  
*Tinct. Rhei aa.* 20'0.  
*S. Stündl. 1 Kinderlöffel*  
*(bis Stuhlgang erfolgt).*  
1041. Rp. *Syr. mannat.* 30'0,  
*Tinct. Rhei aqu.* 10'0.  
*S. Stündl. 1 Kinderlöffel.*  
1042. Rp. *Natr. sulf. cryst.* 15'0,  
*Aquae Rub. Idaei* 100'0,  
*Syr. Cich. cum Rtheo* 15'0.  
*S. Jede 2. St. 1 Kinderl.*  
1043. Rp. *Kal. natr. tart.* 2'0,  
*Aquae cerei* 50'0,  
*Syr. mannat.* 20'0.  
*S. Jede 2. St. 1 Kinderl. coll.*

Bei erwachsenen Kindern  
und lang andauernder Con-  
stipation:

1044. Rp. *Dect. Pulp. Tama-*  
*rind. e* 15'0 *ad* 150'0,  
*Salis amar.* 10'0,  
*Syr. mannat.* 15'0.  
*S. Jede 2. St. 1 Kinderl.*  
1045. Rp. *Inf. rad. Rhei*  
*e* 2'0 *ad* 50'0,  
*Syr. mannat.* 20'0.  
*S. Stündlich 1 Esslöffel.*  
1046. Rp. *Dect. Pulp. Tama-*  
*rind. e* 15'0 *ad* 150'0,  
*Natr. phosphor.* 10'0,  
*Syr. citri* 15'0.  
*S. Jede 2. St. 1—2 Esslöff.*  
1047. Rp. *Inf. fol. Sennae*  
*e* 3'0 *ad* 50'0,  
*Syr. mannat.* 20'0.  
*S. Stündl. 1 Esslöffel.*  
1048. Rp. *Calomel. laevis.,*  
*Ple. rad. Jalap. aa.* 0'20,  
*Sacch. alb.* 2'0,  
*M. f. Ple. dic. indos.* = 10.  
*S. Fröh, Mittags u. Abds.*  
*1 Pulver.*

Clystiere mit Camillenthee,  
Wasser etc. Stuhlzäpfchen  
aus Cacao butter. Irrigatio-  
nen des Mastdarmes.

In passenden Fällen Gym-  
nastik, Eisenmittel, Eisen-  
wasser, insbes. Pyrmont,  
rein oder mit Molke.



**Odontalgie, Zahnschmerz.** Bei Caries des Zahnes Ausspritzen der Höhle mit lauem Wasser behufs Beseitigung von Speiseresten etc., sorgfältige Reinhaltung, Anwendung schmerzstillender Präparate.

Bei Periostitis (Wurzelhautentzündung) Anwendung von Mundwasser, lauwarmem Thee; Application von 2—3 Blutegeln in die Umgebung des kranken Zahnes. Bepinselung mit Jodtinctur oder Senfgeist. Ist es zur Abscedirung gekommen, Eröffnung des Zahnfleischabscesses. Entfernung des Zahnes, wenn auf diesem Wege der Eiter nicht zu entleeren ist.

Bei schwammigem lockerem Zahnfleisch Entfernung des Zahnsteines und Anwendung von adstringirenden Mundwässern.

1049. Rp. *Tinct. Opii croc.*,  
*Spir. aeth. sulf.*,

*Ol. Menthae pip. aa. 2'0*,  
S. Zahntinctur (mittelst  
Watta in d. hohlen Zahn  
zu bringen oder zum Be-  
pinseln des Zahnfleisches  
in dessen Umgebung).

1050. Rp. *Mastiches*,  
*Spir. Terebinth. rectif.*,  
*Liq. amm. caust. aa. 2'0*,  
*Chloroformi 15'0*.  
S. Zahntinctur.

1051. Rp. *Tinct. Myrrhae 5'0*,  
*Tinct. Opii simpl.*,  
*Ol. caryophyll. aa. 1'0*.  
S. Zahntinctur.

1052. Rp. *Crocoti 0'30*,  
*Tinct. Menthae pip. 15'0*.  
S. Zahntropfen.

1053. Rp. *Camphorae 2'0*,  
*Ol. Cajeputi 5'0*,  
*Ol. Caryophyll. gtt. 2*,  
*Chloroform. 10'0*.  
S. Zahntropfen.

1054. Rp. *Tinct. Guajaci 15'0*,  
*Tinct. Valerian. 30'0*,  
*Tinct. Benzoes comp.*,  
*Spir. Cochlear. aa. 5'0*,  
*Laud. Liq. Sydenh. 2'0*.  
S. 1 Theelöffel voll in eine  
Tasse warmen Wassers (hie-  
von öfter 1 Esslöffel im  
Munde zu behalten),

1055. Rp. *Thymoli 0'30*,  
*Spir. Cochlear.*,  
*Spir. Melissa aa. 30'0*,  
*Tinct. Ratanh. 10'0*.  
*Ol. Mentha pip. 0'50*,  
*Ol. Caryoph. 1'0*.  
S. 10 Tropfen in 1 Glas  
Wasser zu Mundwasser.

1056. *Tinct. Jodinac*,  
*Glycerini aa. 20'0*,  
S. Alle 2 Stunden das  
Zahnfleisch um den kranken  
Zahn bepinseln und 10 Min.  
darauf mit kaltem Wasser,  
ausspülen.

Empfohlen wird das Ein-  
legen von krystall. Chlo-  
ralhydrat in Baumwolle  
eingewickelt.

1057. Rp. *Herbae Hyosciami*,  
*Herbae Maleae aa. 20'0*.  
S. Thee (je  $\frac{1}{4}$  auf eine  
Tasse zum Ausspülen des  
Mundes).

Zweckmässiger ist der Ver-  
schluss des hohlen Zahnes  
mittels eines in eine Harz-  
lösung getauchten Baum-  
wollbäuschchens nach vor-  
ausgegangen. Ausspritzung  
mittelst lauwarm. Wassers.  
Eventuell kann zuvor ein  
mit Carbols. imprägnirtes  
Baumwollkugeln und  
dann erst das Harzpräparat

(Nr. 1058) in den hohlen Zahn eingefügt werden.

1058. Rp. *Sandaraccae* 5·0,

*Aetheris sulf.* 10·0.

S. Zahnharz.

Rührt der Schmerz vom Blossliegen der Pulpa her, so erzielt man ein bleibendes Resultat nur durch Zerstörung d. Zahnnerven mittels Causticums. (Arsenikpasta.)

1059. Rp. *Arsenici albi* 2·0,

*Morf. mur.* 1·0,

*Creosoti* q. s.,

u. f. pasta mollis.

S. Arsenikpasta. Ein stecknadelkopfgrosses Stück auf Watte nach gründlicher Reinigung der cariösen Höhle behutsam auf die blossliegende Pulpa gelegt und sodann mit in Harz getauchter Baumwolle zu verstopfen.

1060. Rp. *Calc. carb. praec.*

100·0,

*Pulv. Rhiz. Ir. fl.* 5·0.

*Oss. Sepiae pulv.* 4·0,

*Sacch. alb.*,

*Myrrhae pulv.* aa. 2·0,

*Mellis et Glycer.* aa. q. s.,

u. f. Pasta.

S. Zahnpasta.

Als adstringirendes Mundwasser zu empfehlen:

1061. Rp. *Kino* 1·0,

*Spir. vin. rectif.* 60·0,

*Ol. Menth. pip.* gtts 15,

*Ol. Cinnamom. acuti*,

*Ol. Macidis* aa. gtts 5,

*Ol. Caryophyll.* gtts 2.

S. Zahntinctur. (30 Tropf.

In ein halbes Glas Wasser z. Ausspülen d. Mundes.)

1062. Rp. *Acid. thymic.* 0·25,

*Acid. benzoic.* 3·0,

*Fluct. Eucalypt.* 15·0,

*Alcoh. absol.* 100·0,

*Ex. Gaulther.* gtts 15.

D. S. Zahntinctur.

1063. Rp. *Magnes. carb.*,

*Rhiz. Ir. fl.*,

*Talci.*

*Sap. medic.* aa. 5·0,

*Ol. Menthae pip.* gtts 10,

*Muc. gummi. ar.* q. s.

f. Massa. S. Zahnseife.

1064. Rp. *Cretae praepar.*

alb. 15·0,

*Rad. Iridis flor.* 5·0,

*Ol. Menthae pip.* gtts 5,

S. Zahnpulver.

1065. Rp. *Oss. Sep. praep. alb.*

25·0,

*Pulv. rad. Ircos flor.*,

*Magnes carb.* aa. 3·0,

*Ol. Menthae pip.* gtts 3,

S. Zahnpulver.

1066. Rp. *Carbonis Tiliae* 15·0,

*Cortic. Chinae* 5·0,

*Catechu*,

*Myrrhae*,

*Cinnamomil*,

*Caryophyll.* aa. 2·0,

*Ol. Bergamott.* gtts 20,

*M. f. Pulv. subtilissimus.*

S. Zahnpulver.

1067. Rp. *Rad. Calami arom.*,

*Rad. Iridis flor.* aa. 15·0,

*Corall. rubr. praep.*,

*Ligni Santali rubr.*,

*Natr. carb. dep. succ.*

aa. 5·0,

*M. f. Pulv. subtilissimus.*

S. Zahnpulver.

1068. Rp. *Calc. carb. praec.*

120·0,

*Cort. Chin. fusc.*,

*Conchae praep.* aa. 60·0,

*Pulv. Myrrh.* 30·0,

*Pulv. Caryophyll.* 15·0,

*Ol. Cinnam.* gtts 10 15,

*M. f. p.* S. Zahnpulver.

1069. Rp. *Calc. carb. praec.*

120·0,

*Rhiz. Ir. fl.* 60·0,

*Oss. Sep. pulv.* 30·0,

*Sacch. alb.* 30·0,

*Natr. bicarb.* 15·0,

*Ol. Rosae* gtts 15.

S. Zahnpulver.

**Oedema glottidis.** Scarification der Wülste mit dem Messer auf laryngoskopischem Wege vor Allem zu versuchen; ausserdem Eispillen, Blutegel, starke Abführmittel oder Clystiere, kräftige Reizmittel auf die Haut. Aderlass. Als ultima ratio Tracheotomie.

**Oedema pulmonum acutum, Lungenödem.** Brechmittel, Excitantia, Abreibung der Haut; Clystiere mit Eiswasser oder Essigwasser.

1070. Rp. *Tart. stib.* 0·20,  
*Pulv. rad. Ipecac.* 3·0,  
*Sacch. alb.* 2·0,  
*M. f. P. div. in dos.* = 5.  
*S.*  $\frac{1}{4}$ stündlich 1 Pulver.  
(Brechmittel.)

1071. Rp. *Inf. flor. Arnicae*  
*e* 10·0 ad 200·0,  
*Liq. corn. cerv. succ.* 2·0,  
*Syr. Senegae* 10·0,  
*S.*  $\frac{1}{4}$ stündlich 1 Esslöffel.

1072. Rp. *Inf. flor. Arnicae*  
*e* 50·0 ad 150·0,  
*Aetheris acet.* 2·0,  
*Syr. cort. aur.* 15·0,  
*S.*  $\frac{1}{2}$ stündl. 1 Esslöffel.

1073. Rp. *Camphor. ras.* 0·50,  
*Sacch. alb.* 2·0,  
*M. f. Pulv. div. in dos.* = 5.  
*S.* Stündlich 1 Pulver.

1074. Rp. *Aether. acet.* 5·0,  
*S.* Jede halbe Stunde je  
10 Tropfen.

1075. Rp. *Moschi orient.* 0·50,  
*Sacch. alb.* 2·0,  
*M. f. Pulv. div. in dos.* = 5,  
*S.* Stündlich 1 Pulver.

1076. Rp. *Aetheris sulf.*,  
*Spir. vin. conc. aa.* 5·0,  
*Aquae destill.* 150·0,  
*Syr. rub. Idaei* 15·0,  
*S.* Stündlich 1 Esslöffel.

Bei Herzfehlern:

1077. Rp. *Inf. f. Digit. purp.*  
*e* 0·50 ad 120·0,  
*Liq. terr. fol. tart.*,  
*Oxymell. Scillae aa.* 15·0,  
*S.* Je 2 Esslöffel jede  
2. Stunde,

**Omphalitis, Nabelentzündung.** Sorgfältige Reinigung mit lauem Wasser oder Thee; Bestreuung mit Amylum allein oder mit Salicylsäure oder mit Jodoform. Einlagen von Bruns'scher Baumwolle, Lapis mit Vorsicht zu verwenden. Im Falle von Gangränescenz desinficirende Mittel. Prophylactisch: Nabel kurz abzuschneiden, Trocken- und Reinhaltung, Desinfection der Verbände und Utensilien.

1078. Rp. *Aq. Goulardi* 200·0.  
*S.* Aeusserlich.

1079. Rp. *Plumb. acet. bus.*  
*sol.* 5·0,  
*Aquae. destill.* 200·0.  
*S.* Verbandwasser.

1080. Rp. *Acid. carbol.* 5·0,  
*Aq. dest.* 250·0.  
*S.* Zum Abspülen.

1081. Rp. *Camphor. rasae* 2·0,  
*Mucil. Gumm. arab.*,  
*Aquae destill. aa.* 50·0.  
*S.* Aeusserlich.

1082. Rp. *Ac. salicyl.* 2·0,  
*Amyli pur.* 30·0,  
*S.* Streupulver.

1083. Rp. *Oxyd. Zinc.* 2·0,  
*Ung. emoll.* 10·0.  
*S.* Salbe.

**Oophoritis, Eierstockentzündung.** In acuten Fällen kalte, bei manchen Personen heisse Umschläge; Rp.

(Nr. 1058) in den hohlen Zahn eingefügt werden.

1058. Rp. *Sandaraccae* 5'0,

*Aetheris sulf.* 10'0,

*S. Zahnharz.*

Rührt der Schmerz vom Blossliegen der Pulpa her, so erzielt man ein bleibendes Resultat nur durch Zerstörung d. Zahnnerven mittels Causticums. (Arsenikpasta.)

1059. Rp. *Arsenici albi* 2'0,

*Morf. mur.* 1'0,

*Creosoti* q. s.,

*u. f. pasta mollis.*

*S. Arsenikpasta.* Ein stecknadelkopfgrosses Stück auf Watte nach gründlicher Reinigung der cariösen Höhle behutsam auf die blossliegende Pulpa gelegt und sodann mit in Harz getauchter Baumwolle zu verstopfen.

1060. Rp. *Calc. carb. praec.*

100'0,

*Pulv. Rhiz. Ir. fl.* 5'0,

*Oss. Sepiae pulv.* 4'0,

*Sacch. alb.*,

*Myrrhae pulv.* aa. 2'0,

*Mellis et Glycer.* aa. q. s.,

*u. f. Pasta.*

*S. Zahnpasta.*

Als adstringirendes Mundwasser zu empfehlen:

1061. Rp. *Kino* 1'0,

*Spir. vin. rectif.* 60'0,

*Ol. Menth. pip.* gtts 15,

*Ol. Cinnamom. acuti,*

*Ol. Macidiz* aa. gtts 5,

*Ol. Caryophyll.* gtts 2,

*S. Zahntinctur.* (30 Tropf.

in ein halbes Glas Wasser z. Ausspülen d. Mundes.)

1062. Rp. *Acid. thymic.* 0'25,

*Acid. benzoic.* 3'0,

*Tinct. Eucalypt.* 15'0,

*Alcoh. absol.* 100'0,

*Ol. Gaulther.* gtts 15,

*M. D. S. Zahntinctur.*

1063. Rp. *Magnes. carb.*,

*Rhiz. Ir. fl.*,

*Talci.*

*Sap. medic.* aa. 5'0,

*Ol. Menthae pip.* gtts 10,

*Muc. gummi. ar.* q. s.

*f. Massa. S. Zahnschleife.*

1064. Rp. *Cretae praepar.*

alb. 15'0,

*Rad. Iridis flor.* 5'0,

*Ol. Menthae pip.* gtts 5,

*S. Zahnpulver.*

1065. Rp. *Oss. Sep. praep. alb.*

25'0,

*Pulv. rad. Ireos flor.*,

*Magnes carb.* aa. 3'0,

*Ol. Menthae pip.* gtts 3,

*S. Zahnpulver.*

1066. Rp. *Carbonis Tiliae* 15'0,

*Cortic. Chinae* 5'0,

*Catechu,*

*Myrrhae,*

*Cinnamomi,*

*Caryophyll.* aa. 2'0,

*Ol. Bergamott.* gtts 20,

*M. f. Pulv. subtilissimus.*

*S. Zahnpulver.*

1067. Rp. *Rad. Calami arom.*,

*Rad. Iridis flor.* aa. 15'0,

*Corall. rubr. praep.*,

*Ligni Santali rubr.*,

*Natr. carb. dep. sicc.*

aa. 5'0,

*M. f. Pulv. subtilissimus.*

*S. Zahnpulver.*

1068. Rp. *Calc. carb. praec.*

120'0,

*Cort. Chin. fusc.*,

*Conchae praep.* aa. 60'0,

*Pulv. Myrrh.* 30'0,

*Pulv. Caryophyll.* 15'0,

*Ol. Cinnam.* gtts 10 15,

*M. f. p. S. Zahnpulver.*

1069. Rp. *Calc. carb. praec.*

120'0,

*Rhiz. Ir. fl.* 60'0,

*Oss. Sep. pulv.* 30'0,

*Sacch. alb.* 30'0,

*Natr. bicarb.* 15'0,

*Ol. Rosae* gtts 15,

*S. Zahnpulver.*



**Oedema glottidis.** Scarification der Wülste mit dem Messer auf laryngoskopischem Wege vor Allem zu versuchen; ausserdem Eispillen, Blutegel, starke Abführmittel oder Clystiere, kräftige Reizmittel auf die Haut. Aderlass. Als ultima ratio Tracheotomie.

**Oedema pulmonum acutum, Lungenödem.** Brechmittel, Excitantia, Abreibung der Haut; Clystiere mit Eiswasser oder Essigwasser.

1070. Rp. Tart. stib. 0·20,  
Pulv. rad. Ipecac. 3·0,  
Sacch. alb. 2·0,  
M. f. P. div. in dos. = 5.  
S.  $\frac{1}{4}$ stündlich 1 Pulver.  
(Brechmittel.)

1071. Rp. Inf. flor. Arnicae  
e 10·0 ad 200·0,  
Liq. corn. cerv. succ. 2·0,  
Syr. Scenegae 10·0.  
S.  $\frac{1}{2}$ stündlich 1 Esslöffel.

1072. Rp. Inf. flor. Arnicae  
e 50·0 ad 150·0,  
Aetheris acet. 2·0,  
Syr. cort. aur. 15·0.  
S.  $\frac{1}{2}$ stündl. 1 Esslöffel.

1073. Rp. Camphor. ras. 0·50,  
Sacch. alb. 2·0,  
M. f. Pulv. div. in dos. = 5.  
S. Stündlich 1 Pulver.

1074. Rp. Aether. acet. 5·0,  
S. Jede halbe Stunde je  
10 Tropfen.

1075. Rp. Moschi orient. 0·50,  
Sacch. alb. 2·0,  
M. f. Pulv. div. in dos. = 5.  
S. Stündlich 1 Pulver.

1076. Rp. Aetheris sulf.,  
Spir. vin. conc. aa. 5·0,  
Aqua destill. 150·0,  
Syr. rub. Idaei 15·0.  
S. Stündlich 1 Esslöffel.

Bei Herzfehlern:

1077. Rp. Inf. f. Digit. purp.  
e 0·50 ad 120·0,  
Liq. terr. fol. tart.,  
Oxymell. Scillae aa. 15·0.  
S. Je 2 Esslöffel jede  
2. Stunde.

**Omphalitis, Nabelentzündung.** Sorgfältige Reinigung mit lauem Wasser oder Thee; Bestreuung mit Amylum allein oder mit Salicylsäure oder mit Jodoform. Einlagen von Bruns'scher Baumwolle. Lapis mit Vorsicht zu verwenden. Im Falle von Gangränescenz desinficirende Mittel. Prophylactisch: Nabel kurz abzuschneiden, Trocken- und Reinhaltung, Desinfection der Verbände und Utensilien.

1078. Rp. Aq. Goulardi 200·0.  
S. Aeussertlich.

1079. Rp. Plumb. acet. bus.  
sol. 5·0.  
Aqua destill. 200·0.  
S. Verbandwasser.

1080. Rp. Acid. carbol. 5·0,  
Aq. dest. 250·0.  
S. Zum Abspülen.

1081. Rp. Camphor. rasae 2·0,  
Mucil. Gumm. arab.,  
Aqua destill. aa. 50·0,  
S. Aeussertlich.

1082. Rp. Ac. salicyl. 2·0,  
Amyli pur. 30·0.  
S. Streupulver.

1083. Rp. Oxyd. Zinc. 2·0,  
Ung. emoll. 10·0.  
S. Salbe.

**Oophoritis, Eierstockentzündung.** In acuten Fällen kalte, bei manchen Personen heisse Umschläge; Ruhe;



innerlich milde saline Abführmittel; gegen den Schmerz Morium- oder Opium-Suppositorien, auch Application von in Opiate getauchten Baumwollkugeln an den Cervix. Bei gleichzeitigem Fluor albus vorsichtige milde Injectionen; Coitus zu verbieten, eventuell zu beschränken.

1084. Rp. Extr. cann. Ind. 0.20,  
Extr. Laudan. aq. 0.50,  
Camphorae 10,  
M. f. pil. 10.  
S. Im Anfalle 1 Stück z. n.

1085. Rp. Kal. bromat. 2.0,  
Magnes. sulf. 3.0,  
Aqua dest. 100.0.  
S. Auf 3mal des Tags  
zu nehmen.

### Orchitis, Hodenentzündung vide: Epididymitis.

**Otitis, Entzündung des Gehörganges.** Bei Otitis externa, Abscessen im Gehörgang: über die Ohrgegend anfänglich kalte, im späteren Stadium lauwarme Umschläge, Drainage, Einreibung von narcotischen Salben; bei sehr heftigen Schmerzen und vollblütigen Individuen Blutegel. Einträufelung in den Gehörgang: Eröffnung der Abscesse. Inductionsstrom. Bei Otitis med. acuta: Antiphlogose; Gurgelwässer, Lufteinreibung, wenn solche keine Schmerzen hervorrufen; keine Einträufelung in den Gehörgang, so lange keine Otorrhoe vorhanden ist. Rücksicht auf den Allgemeinzustand, Inspection der Nase und des Rachens. Bei perforirtem Trommelfell hat man den äusseren Gehörgang jedesmal zum Schutze der Paukenhöhle mit Wattatampon zu versehen.

1086. Rp. Morf. muriat. 0.2,  
bis 0.4,  
Ung. emoll. 10.0.  
S. Salbe, erbsengross ums  
Ohr einzureiben, eventuell  
in den Gehörgang einzupinseln.

1087. Rp. Aquae destill. 20.0,  
Aqua Opii 10.0.  
S. Stündlich lauwarm  
in's Ohr zu träufeln.

1088. Rp. Ol. Olive. 10.0,  
Morfii acet. 0.20.  
S. 10 Tropfen in der  
Umgebung des Ohres einzu-  
reiben, oder 5 Tropfen er-  
wärmt auf Baumwolle in  
den Gehörgang gesteckt.

1089. Rp. Ol. Hyoscam. 10.0,  
Extr. Laudan. aq. 0.50.  
S. Wie das Vorige.

1090. Rp. Ol. Hyoscam.,  
Chloroformi,  
Tinct. Opii spl. aa. 20.0.  
S. Ein Kaffeelöffel voll in  
der Umgebung des Ohres  
einzureiben.

1091. Rp. Dect. capit. Papav.  
e 10.0 ad 100.0,  
Filtr. bene, adde:  
Tinct. Opii simpl. gtt. 10.  
S. Stündlich lauwarm in's  
Ohr zu träufeln u. 10 Min.  
darin zu lassen.

Bei Otorrhoe und noch  
bestehenden Schmerzen:

1092. Rp. Morf. muriat. 0.20  
bis 0.40.  
Aq. dest. od. Laurac. 10.0.  
S. 10 Tropfen lauwarm  
in's Ohr zu träufeln und  
10 Min. darin lassen, 3 bis  
4mal täglich.

1093. Rp. *Cocaini mur.* 0·20,  
*Aquae dest.* 10·0.  
*S. Ins Ohr lau einzu-*  
*gossen und 10 Min. darin*  
*zu lassen.*

Nach

Sistirung der Schmerzen:

1094. Rp. *Acid. boric. subtiliss. pulv.* 10·0.  
*S. Mittels Federkiels mehr-*  
*mals täglich (je nach der*  
*Stärke der Secretion) ein-*  
*zublasen.*

Nach Ablauf des acuten Stadiums:

1095. Rp. *Plumb. ac. bas. sol.* 15·0.

*S. Tropfen* (anfänglich 1 Tropfen auf  $\frac{1}{2}$  Kaffeel. lauen Wassers, später 3 bis 5 Tropfen pur in's Ohr zu träufeln und 3 Min. lassen, 1—2mal tägl. nach vorausgegangener Ausspritzung des Ohres).

1096. Rp. *Zinci sulf.* 0·50,  
*Aquae destill.* 50·0.  
*S. 2mal täglich je 10*  
*Tropfen lauwarm in's Ohr*  
*zu träufeln.*

Bei chronischer Otorrhoe Plumbum od. Zincum; erst später zur Beseitigung der Secretion und Schwellung;

1097. Rp. *Argent. nitr. cryst.* 0·5—0·7,  
*Aquae dest.* 10·0.

*S. 10—15 Tropfen in den Gehörgang.* (Bei nach vorn und unten seitlich geneigtem Kopfe.) Im Falle dabei keine Schmerzen auftreten, 2—3 Min. darin lassen, 2—3mal wöchentlich.

Vor und nach der Anwendung dieses Mittels wird das Ohr mit lauwarmem

Wasser ausgespritzt. Auch Inspersionen von Alumen crud. pulv., eventuell von purer Borsäure in die Paukenhöhle mittels Federkiel zu empfehlen.

Bei übelriechendem Ohrenflusse:

1098. Rp. *M. subl. corr.* 0·10  
 bis 0·20,

*Aquae dest.* 100·0,

*S. 2mal tägl. lauwarm in's Ohr zu giesen.*

1099. *Aq. Calcis,*  
*Aq. destill. aa.* 50.  
*S. Wie das Vorige.*

Ferner Ausspritzung mit 1—2 $\frac{0}{10}$ ig. Carbolsäure, rosa-rother hypermangans. Kalilösung.

1100. Rp. *Thymol.* 0·50,  
*Aquae destill.* 500·0.  
*S. Zu Ausspritzungen.*  
*(Zur Hälfte mit Wasser*  
*verdünnt.)*

1101. Rp. *Acidi carbol.* 1·0  
 bis 2·0,  
*Aquae destill.* 100·0.  
*S. Zum Ausspritzen.*

Bei diphtheritischen Processen:

1102. *Acid. salicyl.* 5·0,  
*Acid. boric.* 15·0,  
*M. f. Pulv. subt.*  
*S. In's Ohr eingeblasen*  
*nach Bedarf öfter des Tgts.*

Geg. nervöses Ohrensausen neben allgemeinem Regime elektrische Behandlung, eventuell:

1103. Rp. *Natr. bromat.* 15·0,  
*Dio. in das.* = 15.  
*S. 3 Pulv. täglich.*

Bei allgemeiner Neurose:

1104. Rp. *Tinct. Aconiti* 5·0,  
*S. 8—10 Tropfen täglich.*

(NB. Die Wirkung stellt sich in der Regel erst nach 4 Tagen ein.)

1105. Rp. *Camphorae ras.* 1'0.  
bis 2'0,

*Aether. sulf.* 20'0.

S. 6 - 8 Tr. m. Luftdouche,  
Ballon od. Pollitzerschem Ver-  
fahren in's Ohr einzutreiben.

Gegen Otolgia nervosa An-  
wendung der narcotischen  
Salben (vide oben); Ein-  
spritzung von 2%igem Co-  
cain (vide Nr. 1093) in die  
Trommelföhle mittels Tuben-  
katheters; Behandlung mit  
Inductions- und galvan.  
Strom.

1106. Rp. *Ol. Hyosc. coct.* 10'0

*Tinct. opii simpl.* gtt. 10.

S. 10 Tropfen auf Baum-  
wolle in's Ohr.

Bei Labyrinthkrankun-  
gen nach Syphilis Jodkali  
innerlich und äusserlich  
und vor Allem Elektrizität:

1107. Rp. *Kal. jodat.* 5'0,

*Jodi pur.* 0'05,

*Camphorae ras.* 0'20,

*Ol. Caryophyll.* gtt. 5,

*Ung. emoll.* 50'0.

S. Haselnussgross einzu-  
reiben.

Bei typischer Otolgie  
Chinin, ferner:

1108. Rp. *Tinct. ars. Fowleri*  
10'0.

S. Je 3-8 Tropfen tägl.  
(zuvor steigen, dann sin-  
ken).

Bei  
gleichzeitiger Dentalgie:

1109. Rp. *Tinct. Chamomillae*  
10'0,

S. 3mal tägl. je 10 Tropf.  
innerlich.

Vor Allem Inspection wegen  
cariöser Zähne.

Bei Anhäufung von Ohren-  
schmalz und eingedickten  
Epidermismassen im äus-  
seren Gehörgang:

1110. Rp. *Bicarb. Sodae* 0'50,

*Aquae destill.* 20'0,

*Glycerin. pur.* 10'0.

S. 3mal des Tages zehn  
Tropfen lauwarm in's Ohr;  
später Ausspülung des  
Ohres mit lauwarmem Was-  
ser.

Gegen nässendes Eczem der  
Ohrmuschel und des äus-  
seren Gehörganges Berück-  
sichtigung der ätiolog.  
Momente:

1111. Rp. *Ung. Diachyl.* 20'0.  
S. Salbe.

1112. Rp. *Florum Zinci* 0'50,  
*Ung. emoll.* 15'0.  
S. Salbe (z. Bepinseln).

1113. Rp. *Acid borac.* 1'0,  
*Ung. emoll.* 10'0,  
S. Salbe (im schmerz-  
haften Stadium).

1114. Rp. *Merc. praecip. rubr.*  
0'10,  
*Ung. emoll.* 5'0.  
S. Salbe (im schuppen-  
haften Stadium).

**Oxalurie.** Rigorose Entziehung aller Kohlenhydrate aus  
der Kost, also keine grünen Gemüse u. Früchte, keine  
mehl- und zuckerhaltigen Speisen, Essig, Citronensaft,  
süßer Wein, wenig Fette. Gestattet ist ausschliesslich  
albuminhaltige Diät wie bei Diabetes, daher Fleisch,  
Fische, Austern, Bouillon. Medicamentös: Salzsäures  
Pepsin, 1 Messerspitze nach der Mahlzeit und noch 2  
derartige Dosen nach je 1 Stunde. Daneben Alkalien

durch mehrere Monate in Pulvern oder Mineralwässer: Vichy, Elster, Baden-Baden; viel Bewegung, gymnast. Uebungen, Hydrotherapie.

III5. Rp. *Natr. bicarb.* 10'0  
bis 40'0,

*Lith. carb. effervesc.* 50'0,

*M. f. p. Div. in dos.* = 20.

*S. Morgens u. Abends 1*

*Pulver mit etwas Wasser.*

III6. Rp. *Natr. phosphor.* 10'0,  
*Div. in dos.* = 10.

*S. 1 P. nach der Mahlzeit, ev. auch Abends.*

III7. Rp. *Natr. bicarb.* 2'0  
bis 5'0.

*Lith. carb. efferv.*

*Kal. carb. neutr. aa.* 0'50,

*Aq. font.* 200'0,

*Aq. Anisi* 30'0.

*S. Morgens und Abends je 1 Hälfte.*

Keine oxalsäurehaltigen  
Medicamente, wie Senna,  
Rheum etc.

**Oxyuris vermicularis, Madenwurm.** Oft genügen Clystiere mit kaltem Wasser; in anderen Fällen medicamentöse Mittel zuzufügen. Empfehlenswerth ein Clystma aus Knoblauch in Milch zerrieben. Auch solches mit Kalkwasser, Kochsalzlösung oder Carbolsäure  $\frac{1}{2}$  bis 1 Percent.

III8. Rp. *Inf. rad. Valerian.*  
e 2'0 ad 150'0,

*Asae foetid.* 10'0.

*S. Zum Clystier.*

III9. Rp. *Inf. flor. Tanacet.*  
e 5'0 ad 80'0,

*Syr. mannat.* 10'0.

*S. Jede 2. St. 1 Kinderlöffel.*

II20. Rp. *Inf. flor. Tanacet.*  
e 5'0 ad 100'0.

*S. Zum Clystier.*

II21. Rp. *Santonini* 0'15.

*Ol. Papaveris* 50'0.

*S. Zum Clystier.*

Auch Befettung der Aftergegend mit Ung. Hydrarg.

**Ozaena, Stockschnupfen.** Bei einfachem, lang anhaltendem, profusum Nasencatarrh ein Schnupfwasser od. Injection von warmen Abkochungen von Flor. Altheae u. dgl. Bei den anderen Formen Beseitigung von Krusten und Behandlung des Grundleidens (Syphilis, Scrophulose). Nachforschung nach necrotischen Knochenstückchen, Polypen etc. Das Schnupfwasser wird, zumal bei Geschwüren etc. in der Nase, am zweckmässigsten mittels Irrigation applicirt.

II22. Rp. *Cocaini mur.* 0'25.  
*Aquae dest.* 5'0.

*S. Zum Bepinseln.*

II23. Rp. *Kal. chloric.* 2'0,  
*Sacch. alb.* 20'0,

*M. f. Pulv. d. ad scat.*

*S. Schnupfpulver (2mal täglich).*

II24. Rp. *Alum. crud. pulv.* 5'0,  
*Sacch. alb.* 20'0,

*M. f. Pulv. d. ad scat.*

*S. Schnupfpulver.*

II25. Rp. *Jodoformi* 2'0,

*Pulv. Gummi ar.* 10'0.

*S. Schnupfpulver (nach Reinigung der Nase 3- bis 5mal täglich).*

1126. Rp. Jodoformi 0·30,  
Vasellini 30·0.  
S. Salbe.

1127. Rp. Calcii chlor. 5·0,  
Aqua destill. 500·0.  
S. Schnupfwasser.

1128. Rp. Kal. chloric. 5·0,  
Aqua destill. 500·0,  
S. Schnupfwasser.

1129. Rp. Kal. jodati 2·0,  
Jodi pur. 0·10,  
Aqua destill. 500·0.  
S. Schnupfwasser (bes.  
bei Syphilis).

1130. Rp. Acid. salicyl. 4·0,  
Natr. borac. 6·0,  
Glycerini 75·0,  
Aq. dest. 200·0.  
S. 1 Kaffeel. in 1 Glas  
Wasser zu Injectionen oder  
als Gurgelwasser.

1131. Rp. Kal. hyperm. 0·20,  
Aqua destill. 500·0.  
S. Schnupfwasser.

1132. Rp. Cocaini mur. 0·25,  
Aqua font. 250·0.  
Kal. chlor. 5·0.  
Aqua Lauroc. 10·0.  
S. Zu Injection (od. zur  
Zerstäubung).

1133. Rp. Ac. thymol. 0·25,  
Aqua destill. 1000·0.  
S. Zu Einspritzungen.

1134. Creosoti 2·0,  
Ung. Glycer. 50·0.  
S. Salbe.

Bei Syphilis, Scrophul. etc.  
innerlich Jodkali, Eisen etc.

1135. Rp. Acid. carbol. 5·0,  
Alcoholis rectif. 15·0,  
Liq. Ammon. caust. 5·0,  
Aqua destill. 10·0.  
D. in vitrum epistomio  
vitr. clausum.  
S. Einige Tropfen auf  
Fliesspapier z. Einathmen.

1136. Rp. Argent. nitr. cryst.,  
0·10 - 0·50,  
Gel. q. s. u. f. bacillae,  
Dent. tal. dos. Nr. 10.  
S. Nasenbougie. (Ueber  
Nacht in die Nase zu  
schieben.)

1137. Rp. Cupr. sulfur.  
0·10 - 0·30,  
Gel. q. s. u. f. bacillae,  
Dent. tal. dos. Nr. 10.

1138. Rp. Ichthyoli p. 10·0,  
Ol. Ricini 20·0,  
Spir. vin. 100·0.  
S. Zu Inhalationen.

**Pannus.** Ermittlung der Ursachen, ob Trachom oder  
Conj. scroph.; im ersten Falle Cuprum Nr. 488, im letzten  
Falle bei starken Reizerscheinungen Atropin, beim  
Fehlen solcher Calomel etc. (Nr. 485). Bei inveterirt.  
Pannus und beim Fehlen trachomatöser Wucherungen  
auf der Conjunctiva, sowie bei narbiger Schrumpfung  
der Bindehaut Zerstäubung mittels des Sigle'schen  
Zerstäubungsapparates oder künstliche Bleennorrhoe oder  
Jequirity (Nr. 494) Peritomie, Scarification, Thermo-  
cauter.

1139. Rp. Tinct. Op. croc.,  
Aqua dest. aa. 10·0.  
S. Zur Zerstäubung.

1140. Rp. Natr. carbon. 1·0,  
Aqua dest. 25·0,  
S. Wie vorher.

1141. Rp. Cupr. sulf. 1·0,  
Aqua dest. 20·0.  
S. Wie vorher.

1142. Rp. Cupr. sulf. 1·0,  
Glycerini 20·0.  
S. Wie vorher.



**Paralysis, Lähmungen.** Die allenfalls bekannte Ursache zu berücksichtigen; warme und Dampfbäder; in manchen Fällen dagegen Kälte in Form von Douchen oder die Kaltwassercur; entsprechende Diät; Elektricität; Massage in passenden Fällen.

1143. Rp. *Strychnini sulf.* 0·10,  
*Chloroform.* 30·0.

S. Zum Einreiben.

1144. Rp. *Extr. Nuc.vom.* 0·20,

*P. et Extr. r. Acor. q. s.,*  
*u. f. pil.* Nr. 20.

S. Früh, Mittags und  
Abends je 1 Pille.

1145. Rp. *Strychnini sulf.* 0·02,

*Sacch. alb.* 2·0,

*M. f. Pulv. div. indos.* = 5.

S. Täglich 3 Pulver.

1146. Rp. *Strychn. mur.* 0·05,

*Aquae destill.* 3·0.

S. 10 Tropfen 3mal tgl.  
(subcut.).

**Paralysis progressiva.** Im Prodromalstadium Unter-  
sagung jeder geistigen und körperlichen Anstrengung,  
namentlich vollständige Entlastung von Geschäften,  
Vermeidung jeder Aufregung, von Excessen; zurück-  
gezogenes einsames Leben in guter Luft, regelmässige  
Lebensweise. Jod- und Bromkali, gegen Kopfschmerz  
kalte Umschläge, Morphin, bei Schlaflosigkeit Bier,  
Paraldehyd; prolongirte Bäder, Einpackungen. Bei  
grösserer Aufregung Hyoseyamin, Cannabinum tann.  
Morf.-Inj. Bei epilepti- und apoplectif. Anfällen kalte  
Umschläge und entsprechende Vorsorge. Bei gehäuften  
Anfällen Chloralhydr. Bei vorgeschrittenem Lähmungs-  
zustand grösste Reinlichkeit; bei Schlingbeschwerden  
behutsame Ernährung, am besten ausschliesslich  
flüssige Nahrung.

**Paraphimosis, spanischer Kragen.** Bei mässiger  
Schwellung des eingeklemmten inneren Vorhautblattes  
sofortige Reposition; bei bedeutender Schwellung  
Ueberschläge mit kaltem Wasser (Plumbum, Kal.  
chlor. etc.) durch 1 Stunde in horizontaler Lagerung  
anzuwenden, worauf die Reposition zu erfolgen hat.  
Ist die Einklemmung am Dorsum zu stark, so wird  
eine Incision der einschnürenden Stelle nöthig sein.

1147. Rp. *Aquae plumb.* 200·0.

S. Zu Umschlägen.

1148. Rp. *Kal. chloric.* 2·0,

*Aquae destill.* 200·0.

S. Aeusserlich.

Beide auch nach erfolgter  
Reposition zu Umschlägen  
oder Ausspritzungen, falls  
Phimosis sich etablirte.

**Parotitis, Entzündung der Ohrspeicheldrüse, Mumps.**

Anwendung von feuchter Wärme (Haarlinsenumschläge).  
Nur bei heftiger Entzündung und Schmerzhaftigkeit  
kalte Umschläge; säuerliches Getränk und Abführmittel.  
Falls Eiterung erfolgt, ist die Incision am Platze mit  
darauffolgenden warmen Carbolumschlägen.

1149. Rp. *Kali jodat.* 1'0,*Jodi pur.* 0'10.*Ung. emoll.* 20'0.*S. Salbe.*1150. Rp. *Ung. Hydrarg. Lano-*  
*lin.* 10'0.*S. Zum Einreiben.*1151. Rp. *Empl. sapon.* 10'0.*S. Pflaster.*1152. Rp. *Acid. carbol.* 5'0.*Aquae dest.* 200'0.*S. Erwärmt zu Umschlägen (mittels Carbolgaze).***Pediculi pubis vide: Morpiones.**

**Pemphigus, Blasenausschlag.** Gegen das Fieber im Beginne und Verlaufe Chinin, Säuren etc.; warme Bäder allein oder mit medicamentösem Zusatz; Amylum, indifferente Salben; bei ausgedehnten Formen Einhüllungen in feuchte Tücher, continuirliches Bad. — Amara, Ferrum, Arsenik, Chloralhydrat.

1153. Rp. *Sulfatis Chinini* 2'0,  
*Div. in dos.* = 10.*S. Früh, Mittags und Abends 1 Pulver (in Oblaten).*1154. Rp. *Natr. carb.* 500'0.*S. In's Bad.*1155. Rp. *Merc. subl. corr.* 5'0,*Aquae destill.* 200'0.*S. In's Bad.*1156. Rp. *Protojod. Hydr.* 0'10,*Pulv. gum.*,*Sacch. alb. aa.* 2'0,*M. f. P. Div. in dos.* = 15.*S. 3 Pulv. täglich.*

Auch Theerbäder passend. Bei stärkerer Eiterung der zur Wundfläche gewordenen Blasen:

1157. Rp. *Acid. carbol.* 5'0.*Ol. olivarum* 100'0.*S. Verband.* (Zur Bedeckung mit in dem Oel getränkten Leinwandlappen.)

Auch Kalkliniment Nr. 456 od. passende Salben (Zink, Blei etc.), ferner die Lassarsche Pasta Nr. 591.

**Pericarditis, Herzbeutelentzündung.** Absolute Ruhe, symptomatische Behandlung des Fiebers; kalte Umschläge auf die Herzgegend; bei vermehrter Herzaction Digitalis; Regelung des Stuhlgangs; bei heftigen Schmerzen subcut. Injection, eventuell Blutegel; roborende Diät. Tonica, Eisen, Bettruhe, so lange Exsudat besteht.

1158. Rp. *Inf. fol. Digit. purp.*  
*e* 1'0 ad 150'0,*Syr. simpl.* 20'0.*S. Stündlich 1 Esslöffel.*1159. Rp. *Inf. fol. Digit. purp.*  
*e* 1'0 ad 150'0,*Kali acet.* 2'0,*Syr. rub. Id.* 15'0.*S. Stündlich 1 Esslöffel.*1160. Rp. *Pulv. fol. Digital.* 0'5,  
*Chinini sulf.* 0'8,*Sacch. alb.* 2'0,*M. f. P. div. in dos.* = 10.*S. Fr., Mitt. u. Abs. 1 Pulv.*1161. Rp. *Acidi phosph. dil.* 2'0.*Syr. rub. Idaci* 20'0.*S. Zusatz zum Getränk.*

1162. Rp. *Natr. salicyl.* 10'0,  
Div. in dos. = 10.  
S. 2ständl. 1 Pulver.

1163. Rp. *Morfi mur.* 0'10,  
*Aquae Laurocer.* 10'0.  
S. Tropfen.

1164. Rp. *Aq. Laurocer.* 5'0,  
*Tinct. Digital. purp.* 1'0.  
S. 2mal tägl. je 10 Tropf.  
(bei heftig. Herzklopfen).

Bei schwacher Herzthätig-  
keit:

1165. Rp. *Ammon. carb.* 2'0,  
*Aquae destill.* 100'0,  
*Syr. rub. Id.* 10'0.  
S. Stündlich 1 Esslöffel.

Gegen d. zurückgebliebene  
Exsudat:

1165. Rp. *Inf. bacc. Juniperi*  
e 20'0 ad 200'0,  
*Liquor. terr. sol. tart.,*  
*Oxymell. Scillae aa.* 20'0.  
S. Jede 2. St. je 2 Esslöffel.

1167. Rp. *Spir. Mindereri* 5'0,  
S. Je 10 Tropfen in eine  
Tasse Thee.

Bei Kindern:

1168. Rp. *Tinct. Digit. pp.* gtt. 5,  
*Aquae destill.* 50'0,  
*Syr. rub. Id.* 10'0.  
S. Jede 2. St. 1 Kaffeelöff.

1169. Rp. *Inf. sol. Dig. purp.*  
e 0'30 ad 100'0,  
*Syrup. rub. Idaei* 10'0.  
S. Jede St. 1 Kindertöff.

**Peritonitis, Bauchfellentzündung.** Absolute Ruhe, Eis-  
umschläge auf den Unterleib, Opium; später warme  
Umschläge; bei ausgedehnter Peritonitis eventuell Blut-  
egel; strenge Diät. Gegen das Fieber Chinin oder  
Salicylsäure; gegen das Erbrechen Eispillen oder Eis-  
wasser in geringer Quantität, Sodawasser. Ernährende  
Clystiere mit Pepton oder Fleischpancreas (v. pag. 15).  
Bei chronischer Peritonitis Einreibungen von Ung.  
einer. etc.; bei Herabgekommenen roborirende Mittel.

1170. Rp. *Opii pur.* 0'50,  
*Sacch. alb.* 2'0,  
M. f. P. div. in dos. = 10.  
S. Jede 2. Stunde 1 Pulv.

1171. Rp. *Aquae Lauroc.* 15'0,  
*Mur. Morf.* 0'10.  
S. Tropfen.

1172. Rp. *Emuls. comm.* 200'0,  
*Aquae Laurocer.* 10'0,  
*Mur. Morfi* 0'10.  
S. Stündl. 1 Esslöffel.

Bei zurückgebliebenem Ex-  
sudate:

1173. Rp. *Tinct. Jodi* 10'0,  
*Tinct. Gallar.* 5'0.  
S. Zum Bepinseln.

1174. Rp. *Ung. Hydrarg.* 10'0.  
S. Bohnengross einzureib.

1175. Rp. *Kali jodat.* 2'0,  
*Jodi pur.* 0'50,  
*Glycerini* 50'0.  
S. Zum Einreiben.

Bei Entzündungen des  
weibl. Beckenbauchfelles:

1176. Rp. *Morf. mur.* 0'10,  
*Ung. Hydrarg.* 1'0,  
*Butyr. Cacao* 15'0,  
*F. suppos. Nr. 6.*  
S. 1—2 Stück täglich.

1177. Rp. *Morf. mur.* 0'10,  
*Sapon med.* 1'0,  
*Gelatini q. s.,*  
*F. Globuli vaginales* 10.  
S. 1—2 Stück tägl. ein-  
zulegen und 1 Stunde ruhig  
liegen lassen.

**Perniones, Frostbeulen.** Möglichste Schonung der er-  
krankten Stelle durch entsprechende Fussbekleidung,  
wenig Bewegung; bei grosser Ausdehnung und Schmerz-  
haftigkeit Ruhe durch einige Tage und Umschläge.

1178. Rp. Merc. præcipitat.  
alb. 5'0,

Ung. emoll. 50'0.

S. Salbe (messerrücken-  
dick auf Leinwand auf-  
zustreichen).

1179. Rp. Arg. nitr. cryst. 0'20,  
Vaselin. 10'0.

S. Salbe.

1180. Rp. Oxyd. Zinc. 5'0,

Ung. emoll. 30'0.

S. Salbe.

1181. Rp. Ac. carbol. 1'0,

Ung. Plumbi,

Lanolin. aa. 20'0.

Ol. amygdul. 10'0,

Ol. lacandul. gtt. 30.

S. Frostsalbe.

1182. Rp. Collodii pur. 20'0,

Jodi pur. 0'20.

S. Zum Bepinseln.

1183. Rp. Collodii 50'0,

Ol. Ricini 2'0,

Terebinth. 7'50.

S. Zum Bepinseln.

1184. Rp. Tinct. Jodi 2'0,

Aether sulf. 15'0,

Collodii 50'0.

S. Zum Bepinseln.

1185. Rp. Camphoracerasae 2'0,

Ol. Terebinth.,

Ol. Petrae aa. 10'0.

S. Zum Einreiben.

1186. Rp. Spir. camph. 10'0,

Tinct. Opii croc. 2'0.

S. Zum Einreiben.

1187. Rp. Acid. nitr. 15'0,

Aquae destill. 100'0.

S. Zu Umschlägen.

1188. Rp. Plumb. ac. bas. s. 5'0,

Aquae destill. 200'0.

S. Zu Umschlägen.

**Pertussis** vide: Tussis convulsiva.

**Pharyngitis chronica.** Beseitigung der Schädlichkeiten;  
Rauchern verbiete man den häufigen Gebrauch starken  
Tabaks; Mundwasser. Bepinseln mit Lapis in Substanz,  
Galvanokaustik. Inhalation.

1189. Rp. Mixt. gumm. 200'0,

Tinct. Laud. simpl. 1'0.

S. Mundwasser.

1190. Rp. Lapidis diuin. 0'50,

Aquae destill. 200'0,

Syr. rub. Id. 20'0.

S. Mundwasser.

1191. Rp. Tinct. Ratanh. 10'0,

Aquae destill. 500'0.

S. Mundwasser.

1192. Rp. Alumin. crud. 10'0,

Aquae destill. 200'0,

Syr. Diacodii 20'0.

S. Mundwasser.

1193. Rp. Arg. nitr. cryst. 0'10,

Aquae destill. 50'0.

S. Zum Bepinseln.

1194. Rp. Kalii iodat. 5'0,

Jodi pur. 0'50,

Glycerin. 15'0.

S. Zum Bepinseln.

**Phimosis, Verengerung der Vorhaut.** In mässigen  
Formen Injection von einfachem oder mit Medicamenten  
gemengtem Wasser bis zur Eichel furche ringsumher;  
bei intensiveren Entzündungen auch Eisumschläge und  
Bettruhe; Incision oder Circumcision der Vorhaut bei  
Drohung von Gangrän, bei längerem Gleichbleiben der  
Erscheinungen, sowie bei hochgradiger angeborener Phi-  
mose. In manchen Fällen reicht Einführung von Press-  
schwamm aus.



1195. Rp. *Kali chlorici* 2'0,  
*Aquae destill.* 200'0.

*S. Aeusserlich* (mit einem länglichen, an eine Spritze oder an einen einfachen Irrigator angebrachten Ansatzstück in den Vorhautsack einzuspritzen).  
*Ebenso:*

1196. Rp. *Kal. hypermang.* 1'0,  
*Aquae destill.* 500'0.  
*S. Aeusserlich.*

1197. Rp. *Plumbi ac. bas. sol.* 5'0,  
*Aquae destill.* 200'0.

*S. Aeusserlich* (kann auch zu Umschlägen auf das Glied verwendet werden). Bei sphacelöser oder gangränöser Beschaffenheit der Vorhaut Injection und Umschläge mit:

1193. Rp. *Calcar. chlorat.* 2'0,  
*Aquae destill.* 200'0.  
*S. Aeusserlich.*

**Phthisis pulm.** vide: Tuberculosis.

**Pityriasis versicolor, Kleinflechte.** Therapie dieselbe, wie bei Herpes tonsurans, vide pag. 55.

**Pleuritis, Brustfellentzündung.** Milderung der Fiebersymptome durch Antiphlogose, säuerliche Getränke etc. Application von Eisumschlägen auf die erkrankte Seite. Gegen die heftigen Schmerzen Chloroformeinreibungen, subcut. Morphinjectionen, eventuell 10–12 Stück Blutegel etc.; später resorptionsbefördernde Mittel, kräftige Nahrung, Eisen etc. Bei hochgradiger Athemnoth und Stationärbleiben des pleurit. Exsudats ist die Paracentesis pectoris vorzunehmen.

1199. Rp. *Chinini mur.* 1'0,  
*Sacch. alb.* 5'0,  
*M. f. p. Div.* in dos = 5.  
*S. Tagsüber zu verwenden.*

1200. Rp. *Chinini mur.*  
*Natr. salicyl. aa.* 2–4'0.  
*Div.* in dos = 4.  
*S. Wie das Vorige.*

1201. Rp. *Ol. Hyosciami coct.,*  
*Chloroform. aa.* 20'0.  
*S. Zum Einreiben.*

Zur Resorption des Exsudates Jodpräparate:

1202. Rp. *Kal. hydrojod.* 2'0,  
*Jodi pur.* 0'50,  
*Glycerini* 20'0.  
*S. Zum Einreiben.*

1203. Rp. *Kal. hydrojod.* 2'0,  
*Jodi pur.* 0'50,  
*Ung. Digitalis* 20'0.  
*S. Salbe* (zum Einreiben der kranken Seite; darüber Guttaperchapapier).

1204. Rp. *Kal. jodat.* 2'0,  
*Aquae destill.* 100'0,  
*Syr. simpl.* 10'0.  
*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

Bei heftigeren Schmerzen subcut. Morphinjection. — Behufs Ableitung des Exsudates eignet sich auch:

1205. Rp. *Decoct. Equiseti* e 10'0 ad 150'0,  
*Syr. Juniper.* 15'0.  
*S. Stündlich 1 Esslöffel.*

1206. Rp. *Inf. fruct. Juniperi* e 10'0 ad 200'0,  
*Extr. Scillae* 0'20,  
*Syr. mannat.* 20'0.

*S. Stündlich 2 Esslöffel.*  
Bei Kindern in acuten Fällen:

1207. Rp. *Tinct. Scillae,*  
*Tinct. Digital. aa. gttss* 10,  
*Oxymell. Scillae* 20'0,  
*Aq. Tiliae* 100'0.  
*S. Stündlich 1 Theelöffel.*



**Pneumonie, Lungenentzündung.** Bettruhe, gleichmässige Temperatur des Zimmers, strenge Diät, methodische Behandlung mit kalten Bädern, bei hoher Temperatur Eisumschläge auf Kopf und Brust, innerlich Digitalis, Chinin oder Salicylsäure. Durststillende Mittel, in Ausnahmefällen Blutentziehung. In Bedarfsfällen Abführmittel; bei Collapsus Rothwein, Cognac, Thee, Champagner. Bei alten Individuen Alkohol-Behandlung gleich im Beginne.

1208. Rp. *Acid. salicyl.* 5'0,  
*F. Pulv. div. in dos.* = 5.  
*S. Alle 3 St. 1 Pulver.*  
(In Oblaten.)

1209. Rp. *Natr. salicyl.* 5'0,  
*Aquae destill.* 200'0,  
*Syr. simpl.* 15'0.  
*S. Stündlich 1 Esslöffel.*

1210. Rp. *Antipyrini mur.* 5'0.  
*Div. in dos.* = 5.  
*D. ad caps. amyl.*  
*S. Jede Stunde 1 Stück.*

1211. Rp. *Inf. rad. Ipecac.*  
*e 2'0 ad 150'0,*  
*Liq. Ammon. anis.* 2'0,  
*Syr. Polyg. Seneg.* 20'0.  
*S. 1/2 stündl. 1 Esslöffel.*

1212. Rp. *Dect. r. Alth.* 200'0,  
*Extr. Opil aquos.* 0'10,  
*Syr. cort. aur.* 20'0.  
*S. Stündlich 1 Esslöffel.*

1213. Rp. *Dect. r. Alth.* 200'0,  
*Syr. rub. Id.* 20'0.  
*S. Zum Getränke.*

1214. Rp. *Dect. Hordei* 200'0,  
*Aquae Lauroc.* 5'0,  
*Oxymell. simpl.* 50'0.  
*S. Zum Getränke.*

1215. Rp. *Acid. phosph.* 10'0.  
*Syr. rub. Id.* 50'0.  
*S. Zusatz zum Getränke.*

Bei Potatoren:

1216. Rp. *Chloral. hydr.* 5'0,  
*Aquae dest.* 25'0.  
*Syr. cort. aur.* 15'0.  
*S. Auf 1mal z. u. (Vorsicht bei Herzschwäche).*

Bei geschwächter Herzthätigkeit und Adynamie.

1217. Rp. *Camphorae* 0'20,  
*Acid. benzoic.* 1'0,  
*Sacch. alb.* 2'0,  
*M. f. Pulv. div. indos.* = 5,  
*S. 3stündlich 1 Pulver.*

1218. Rp. *Inf. flor. Arnicae*  
*e 10'0 ad 200'0,*  
*Liq. corn. cervi succ.* 2'0,  
*Syr. Ipecac.* 20'0,  
*S. 1/2 stündlich 1 Esslöffel.*

1219. Rp. *Amm. pur. liq. gttis* 5,  
*Aquae destill.* 150'0,  
*Syr. cort. aur.* 15'0.

*S. Stündlich 1 Esslöffel.*  
1220. Rp. *Liqu. Amm. anis.* 5'0.  
*S. Je 5 Tropfen 1/2 stündlich auf Zucker.*

Als Expectorans:

1221. Rp. *Apomorf. mur.* 0'01,  
*Aquae dest.* 100'0,  
*Syr. simpl.* 20'0.  
*S. Stündlich 1 Esslöffel.*

Bei Collapsus:

1222. Rp. *Aether. acet. gttis* 10,  
*Aquae foenicul.* 100'0,  
*Syr. cort. aur.* 10'0.  
*S. 1/2 stündl. 1 Kaffeeöffel.*

Bei hohen Temperaturgraden, namentlich bei allabendlich. Exacerbationen; auch später bei herabgekommenen cachectischen Personen:

1223. Rp. *Sulf. Chinini* 1'0,  
*Sacch. alb.* 2'0,  
*M. f. Pulv. div. indos.* = 5.  
*S. Jede 2. St. 1 Pulver.*

1224. Rp. *Sulf. Chinini* 1'0,  
*Morf. muriat.* 0'10,  
*Sacch. alb.* 2'0,  
*M. f. Pulv. div. indos.* = 5,  
*S. Fr., Mitt. u. Ab. 1 Pulv.*

B. chronischen Pneumonien feuchtwarme oder Dunstumschläge.

Bei Kindern eignen sich kalte Umschläge auf die Brust; im Stadium der

**Podagra** vide: Arthritis.

**Pollutionen, unwillkürlicher Samenabgang.** Regelung der Lebensweise, der Diät, namentlich der Abendkost, hartes Bett, leichte Decke, frühes Aufstehen; Meidung geschlechtlicher Erregungen, sowie körperlicher und geistiger Anstrengungen, Land- oder Gebirgsaufenthalt, Milch- oder Kaltwassercur, Fluss- oder Seebäder. Innerlich Tonica etc., elektrische Behandlung mit dem constanten Strom. Am wichtigsten ist die locale Behandlung mit Sondencur, Kühlsonden, Aetzungen der Pars prostatica.

1225. Rp. *Chinini sulf.*,  
*Ferr. oxyd. oxydul.*,  
*Sacch. alb. aa.* 10,  
*M. f. P.* die. in dos. = 10.  
*S. Früh, Mittags und*  
*Abends 1 Pulver.*

Lösung Wein, Kaffee, Excitantia; bei Collapsus Campher.

Vide Delirium potatorum, Diarrhöe.

1226. Rp. *Kalii bromat.* 10·0,  
*Div. in dos. = 10.*

*S. 3 Pulv. tägl. in Oblaten.*

1227. Rp. *Ergotini Bonj.* 1·0,  
*Sacch. alb.* 5·0,

*M. f. p.* *Div. in dos. = 10.*

*S. 3–5 Pulver täglich.*

**Processus puerperalis, Puerperalfieber.** Prophylactisch: Keine Infection der Gebärenden od. Wöchnerinnen von Seiten der Umgebung; strenge Desinfection. Bei constatirter Erkrankung antifebrile Behandlung, Chinin, Salicylsäure, Eisumschläge, eventuell Priessnitz- oder feuchtwarme Umschläge auf den Unterleib. Behandlung der localen Erkrankung (Wunden, Geschwüre). Irrigation mit Carbol- oder Chlorwasser, Kalium hypermangan. etc. Bepinselung von Wunden mit Jodtinctur u. dgl. Berücksichtigung der Entzündung innerer Organe; eventuell chirurgischer Eingriff. Bei Endometritis Ausspülung des Uterus mit 2%iger Carbolsäure oder Sublimat 1:2000. Innerlich: Rum, Opiate; subcutane Morphin- Injection, Sorge für leichten Stuhlgang. Vgl. Peritonitis.

1228. Rp. *Acidi phosph.* 10·0,  
*Syr. rub. Idaci* 50·0.

*S. Zusatz zum Getränk*  
(bei Diarrhöe zu unterlassen).

Bei Fieber, besonders bei Schüttelfrösten:

1229. Rp. *Chinini sulf.* 3·0,  
*F. Pulv.* die. in dos. = 5,  
*D. ad caps. amyloc.*  
*S. Jede 2. St. 1 Pulver.*

1230. Rp. *Antipyrini* 2–5·0,  
*Div. in dos. = 10.*

*S. Stündlich 1 Pulver in Oblaten.*

1231. Rp. *Acid. salicyl.* 5·0,  
*Div. in dos. = 10.*

*S. Jede 2. St. 1 Pulver.*

Bei Delirium u. Collapsus.

1232. Rp. *Camphor. rax.* 0·50,  
*Sacch. alb.* 2·0,  
*M. f. Pulv.* die. in dos. = 5,  
*S. Jede 2. St. 1 Pulver.*

1233. Rp. *M. subl. corr.* 0'25,  
*Aquae dest.* 500'0.  
*S. Zum Ausspülen* (Cave  
 intoxicat!)

1234. Rp. *Acid. carbol.* 10'0.  
*Aq. dest.* 500'0.  
*S. Zum Ausspülen.*

**Prosopalgia** vide: Neuralgia trigemini.

**Prurigo, Juckblattern.** Bei Kindern lauwarme Bäder und gleichzeitige Abreibung mit Schmierseife: nach der Abtrocknung Einreibung mit Fett oder Leberthran; auch Sodabäder. Rücksicht auf den Allgemeinzustand. Bei Erwachsenen kalte Bäder, Douchen, Schmierseife, Solut. Vlemmingkx (vide Nr. 1257).

1235. Rp. *Ol. Rusci* 5'0,  
*Saponis pulv.* 100'0,  
*M. f. sapo.*  
*S. Seife* (bei Kindern in  
 leichten Fällen ausreichend.).

1236. Rp. *Naphtoli* 10'0,  
*Azong. Porc.* 100'0.  
*S. Salbe.* (Ung. *Naphtoli*  
*simplex.*)

1237. Rp. *Acid. carbol.* 1'0,  
*Glycerin.* 10'0,  
*Aquae destill.* 100'0.  
*S. Zu Waschungen.*

1238. Rp. *Kali carb.* 1'0,  
*Kali sulfur.* 2'0,  
*Aquae destill.* 100'0.  
*S. Zu Waschungen.*  
*Empfohl. Pilocarpin subcut.*

**Psoriasis, Schuppenflechte.** Warme Bäder und Einpackungen; systematische Einreibungen mit Schmierseife: zweimal täglich durch 6 Tage, einmal täglich durch 3 Tage, sodann nach fünftägiger Pause am 14. Tage ein Bad (Schmierseifen-cycclus); an die behaarte Kopfhaut Spir. sapon., Chrysarob. gegen Psoriasis erfolgr.

1239. Rp. *Saponis virid.* 100'0.  
*S. Schmierseife.*

1240. Rp. *Spir. sap. kal.* 100'0.  
*S. Mittels Flanell ein-  
 zureiben.*

Bei excoriirter Haut:  
 1241. Rp. *Ichthyoli* 5–20'0,  
*Glycerini* 50'0.

*S. Zum Einreiben.*  
 Nach Heilung der wunden  
 Stellen:

1242. Rp. *Ichthyoli* 5'0,  
*Acid. salicyl.* 3'0,  
*Glycerini* 20'0,  
*Spir. vini* 100'0.

*S. Zum Einreiben.*  
 Für kleinere Flächen eignen  
 sich Salben:

1243. Rp. *Naphtoli* 15'0,  
*Azong. Porc.* 100'0.  
*S. Salbe.*

1244. Rp. *M. praec. alb.* 10'0,  
*Vasellini* 50'0,  
*S. Salbe.*

1245. Rp. *Subnit. Bismuthi.*  
*M. praec. alb. aa.* 5'0,  
*Vasellini* 50'0.  
*S. Salbe.*

Auch Theerpräparate, na-  
 mentlich bei Psoriasis der  
 behaarten Kopfhaut:

1246. Rp. *Olei Cadini* 100'0,  
*S. Mittels Flanelllappen  
 einzureiben.*

1247. Rp. *Olei Cadini,*  
*Sapon. viridis aa.* 50'0,  
*Spir. vini dil.* 100'0,  
*S. Zum Einreiben.* (Flüs-  
 sigo Theerseife.)

1248. Rp. *Ol. Rusci* 50'0,  
*Spir. vini,*  
*Aetheris sulf. aa.* 5'0,  
*Olei Lavandul.,*  
*Olei Ratae aa. gttis* 30,  
*S. Mittels Pinsel einzu-  
 reiben.* (Wegen Verbes-  
 serung des Theergeruchs  
 zu empfehlen.)

1249. Rp. *Naphthol* 15'0.  
*Azung. Parc.* 100'0.  
*S. Salbe.*
1250. Rp. *Chrysarobini* 10'0,  
*Vaselini* 40'0,  
*Ol. Bergumott.* gtt's 10.  
*S. Salbe.* (Mittels Charpiepinsel auf die psoriatische Stelle einzureiben, nachdem zuvor die Schuppen mit *Spir. sapon.* beseitigt wurden. Schutz der Umgebung gegen Erythem.)
1251. Rp. *Goae pulv.* 10'0,  
*Ung. emoll.* 40'0,  
*Acid. acet.* 10'0.  
*S. Salbe.* (wie d. vorige).
1252. Rp. *Chrysarobini* 5'0,  
*Vaselini* 40'0.  
*S. Salbe.*
1253. Rp. *Acid. pyrogall.* 5'0,  
*Vaselini* 50'0.  
*S. Salbe.*
1254. Rp. *Gelatin. alb. sicc.* 50'0,  
*Aq. dest.* 100'0,  
*M. in baln. cap. et sub assid. agit. adde Chrysarobini q. l.*  
*D. ad chart. cer.*  
*S. Chrysarobine-Gelatine.*  
 (In der Wärme aufzulösen und mittels Borstenpinsels einzureiben.)  
 Ebenso Pyrogallus-Gelatin.
1255. Rp. *Chrysarobini* 0'20,  
*Aetheris sulf.* 100'0,  
*Cerae fläv.* 0'3.  
*S. Als Spray zu verwenden* (besond. am behaarten Theil des Kopfes).
1256. Rp. *Chrysarobini* 2'0,  
*Traumaticini* 20'0,  
*S. Mittels Borstenpinsels anzuwenden.*  
*Chrysarobin* auch mit *Collodium* 1:6 gemischt. Bei inveterirter Psoriasis auch die modific. *Solutio Vlemmingkx*:
1257. Rp. *Calcis vivae* 50'0,  
*Florum sulf.* 100'0,  
*Aquae destill.* 1000'0,  
*Cog. ad reman.* 600'0.  
*S. Auf einzelne Partien einzureiben* (hierauf ein lauwarmes Bad durch eine Stunde; sodann Bestreuung mit *Amylum* od. Einreibung einer nicht bleihaltigen Salbe).  
 Innerlich gegen Psoriasis gebräuchliche Mittel:
1258. Rp. *Sol. ars. Fowl.* gtt's 6,  
*Aquae destill.* 50'0.  
*S. In einem Tage z. n.*  
 Alle 4 Tage um je 1 Tropfen mehr; bei 30 Tropfen angelangt, alle 4 Tage je 1 Tropfen weniger, bis die ursprünglichen 6 Tropfen täglich erreicht sind. Kindern weniger!
1259. Rp. *Sol. ars. Fowl.* gtt's 60,  
*Aquae Menth. pip.* 200'0,  
*S. Früh u. Abds. 1 Esslöff.*  
 (so dass das Ganze für 10 Tage reicht; auch hier kann man bis 30 Tropfen täglich steigen und dann wieder herabgehen).
1260. Rp. *Sol. arsen. Fowl.* 2'0,  
*Carbon. ammon.* 5'0,  
*Kal. acet.* 10'0,  
*Aquae destill.* 120'0,  
*Syr. rub. Idaei* 15'0.  
*S. 3mal täglich 1 Esslöffel in Wasser.*
1261. Rp. *Sol. arsen. Fowl.* 2'0,  
*Tinct. Martis pomat.*,  
*Sp. Menth. pip. aa.* 100'0.  
*S. Früh u. Abds. 1 Esslöff.*
1262. Rp. *Natri arsenic.* 0'20,  
*Aquae destill.* 200'0.  
*S. 3mal tägl. je 15 Tropf.*  
 (*Solutio Pearsoni.*)
1263. Rp. *Acid. arsenicos.* 0'10,  
*Mucil. Gummi arab.*,  
*Aquae destill.* aa. q. s.  
*u. f. pil. Nr. 15.*  
*S. Täglich 1 Stück.*



1264. Rp. *Acid. arsenic. sublt.* | *Aquae destill. q. s.*  
   *trit. 0'50.* | *u. f. pil. Nr. 100.*  
*Piper. nigr. pulv. 5'0.* | *S. 1—2—10 Pillen*  
*Gumm. arab. 1'0.* | (*Pilulae asiaticae*)

**Pustula maligna, Carbunkel, Milzbrand.** Cautio-  
 tion der Infectionsstelle mit Kali caust., Salpeter  
 oder Paquelin's Thermocauter. Auch Excision  
 darauffolgender Cauterisation, tiefe Kreuzsch  
 Antisept. Wundbehandlung. Umschläge von Carbo  
 in 2 $\frac{1}{2}$ %ige warme Carbollösung getaucht. Von an  
 Seite wird ein möglichst conservatives Verfahren (C  
 wasser oder Bleiumschläge) empfohlen und die Ae  
 der geritzten Stelle nur in der allerersten Zeit als  
 haft erklärt. Gegen Milzbrand sowie zur Verklein  
 der Indurationszone beim Carbunkel wird Jod i  
 und subcutan empfohlen.

1265. Rp. *Chinini sulf. 2'0.* | 1267. Rp. *Acidi salicyl*  
           *Ac. sulf. dil. gtts 10.* | *Aquae destill. 100'*  
           *Aquae destill. 200'0.* | *Glycerin. pur. 50'*  
           *Syr. simpl. 20'0.* | *S. Zum Verband.*  
           *S. Jede 2. St. 2 Esslöffel.* | 1268. Rp. *Tinct. Jodina*  
 1266. Rp. *Acidi carbol. 5'0.* | *Aq. dest. 50'0.*  
           *Aquae destill. 200'0.* | *S. 10 Tropfen sub*  
           *S. Zu Umschlägen.* | *zu injiciren.*

**Pyämie, Wundfieber.** Beseitigung des ursächl  
 Momentes (operat. Eingriffe), sorgfältige Desinfec  
 antifebrile Therapie; starke Weine, Cognac. Küh  
 Getränke, Wärme.

1269. Rp. *Chinini sulfur. 2'0.* | *S. Jede 2. St. 1 St*  
           *Natr. bicarb.,* | (bis zur Abnahme  
           *Sacch. alb. aa. 1'0.* | Temperatur).  
           *M. f. Pulv. div. in dos. = 5.* | 1271. Rp. *Morf. muriat.*  
           *S. Jede 3. St. 1 Pulver.* | *Sacch. alb. 2'0.*  
 1270. Rp. *Antipyrini 15'0.* | *M. f. Pulv. div. in dos*  
           *Div. in dos. = 10.* | *S. Abends 1 Pulver*

**Pyelitis, Entzündung der Nierenbecken.** Be  
 sichtigung des Causalmomentes. Nur im Anfangsst  
 kalte, später warme Umschläge, warme Bäder. Gege  
 Schmerzen Morfium innerlich oder in Stuhlzäpf  
 (v. Nr. 425). Meidung reizender Speisen und Getr  
 reizlose Flüssigkeiten (Milch, Mandelmilch, Wasse  
 reichlicher Quantität empfehlenswerth; Sorge  
 leichten Stuhlgang. Bei acuter Pyelitis Bettruhe  
 Fieber Chinin, eventuell mit Morfium; bei chroni  
 Pyelitis Milcheur, lauwarmer Bäder.

1272. Rp. *Lupulini 1'0.* | 1273. Rp. *Foliorum ucae*  
           *Sacch. alb. 5'0.* | *Herb. herniar. aa.*  
           *M. f. P. div. in dos. = 10.* | *S. Thee. Fröh u. A*  
           *S. Fr., Mitt. u. Ab. 1 Pulv.* | *1 Tasse.*



*ter. lact. clar.* 500'0,  
*crud. p.* 3'0.  
 einem Tage zu ver-  
 en. (Alaunmolke.)  
*Aquae Calcis* 100'0.  
 Esslöffel in 1 Glas  
 Milch 3mal tägl.  
*Tannini pur.* (oder  
*hinini tannici*) 1'0,  
*l. alb.* 2'0.  
*P. div.* in dos. = 6.  
 täglich 3 Pulver.

1277. *Rp. Tannini puri,*  
*Lupulini puri aa.* 0'50,  
*Sacch. alb.* 2'0.  
*M. f. P. div.* in dos. = 10.  
*S. Früh, Mittags und*  
*Abends 1 Pulver.*  
 1278. *Rp. Bals. Copaiv.* 15'0,  
*Div.* in dos. = 30.  
*Exhibe in capsul. gelatin.*  
*S. Früh, Mittags und*  
*Abends je 3 Stück.*

**englische Krankheit.** Rationelle Anordnung  
 züglich der Nahrung und Wohnung, bezüglich  
 inlichkeit und des Aufenthaltes in frischer Luft  
 der mit Zusatz von Steinsalz oder Halleiner  
 laugensalz oder Franzensbader Moorsalz. Beson-  
 nmerksamkeit ist einer etwaigen Diarrhöe oder  
 ation zu widmen.

*Ol. Jecor. Asell.* 20'0,  
*Früh, Mittags und*  
*1 Kaffeeelöffel,*  
*Ferr. lactici* 0'50,  
*l. lactis* 2'0,  
*P. div.* in dos. = 10.  
*Früh, Mittags und*  
*1 Pulver.*  
*Ferr. carb. sacch.* 1'0,  
*es. carb.* 0'50,  
*l. alb.* 10'0,  
*Pulv. D. ad scat.*  
*esserspitze 3mal tägl.*  
*Aquae Calcis,*  
*destill. aa.* 50'0,  
*simpl.* 10'0.  
*ändt. 1 Kindertöffel.*  
*Ferr. oxyd. dial.* 10'0,  
 —20 Tr. *Früh u. Ab.*  
*Tinct. amarae,*  
*mal. ferr. aa.* 15'0,  
 —20 Tropf. 3mal tägl.  
*Tinct. Bestuscheffi*  
*gtts. 12,*  
*destill. 80'0.*  
 le 2. St. 1 Kindertöff.

1286. *Rp. Tinct. Ferri pom.,*  
*Tinct. Rhei vin. aa.* 10'0,  
*S. Früh u. Abds. 1 Kaffeeel.*  
 1287. *Rp. Calcar. phosph.,*  
*Calcar. carbon. aa.* 2'0,  
*Sacch. Lact.* 5'0.  
*S. Messerspitze weise.*  
 1288. *Rp. Phosphori* 0'01,  
*Ol. amygd. dulc.* 70'0,  
*Sacch. alb. pulv.* 30'0,  
*Aetheris fragorum gtts.* 20.  
*S. 1 Kaffeeel. per Tag 2. n.*  
 1289. *Rp. Phosphori* 0'01,  
*Ol. Jecor. asell.* 100'0,  
*S. Täglich 1 Kaffeeelöffel.*  
 1290. *Rp. Phosphori* 0'01,  
*Ol. amygdal.* 30'0,  
*Pulv. gumm. arab.,*  
*Sacch. alb. aa.* 15'0,  
*Aquae dest.* 40'0.  
*S. 1 Kaffeeelöffel täglich.*  
 1291. *Rp. Phosphori* 0'01,  
*Solve in,*  
*Carbonei sulfurat.* 0'25,  
*Aq. dest.* 100'0.  
*S. 2mal tägl. 1 Kaffeeelöff.*

**itis mus articulo rum. Gelenksrheumatismus.**

age, Eisumschläge in Fällen von grosser Schmerz-  
 teit, Einwicklungung mit Watta, Flachs, Werg (oder  
 eer imprägn. Hanf, wie er zum Kalfatern der  
 dient) in mässig intensiven Fällen; Einreibungen

mit Chloroform oder Aether; Einreibung von Ichthyol; antifebrile Mittel (säuerliche Getränke); Blutegel, Venaesection; bei längerer Dauer der Schmerzen in einem Gelenke Massage, Einpinselung mit Jodtinctur. Bei chronischen, fieberlosen Formen systematischer Gebrauch von lauen oder Dampfbädern, feuchten Einwickelungen, Douchen; auch Kaltwassercuren; Einpinselung mit Jodtinctur, Massage, Badecuren in Aachen, Teplitz, Wildbad.

1292. Rp. *Acidi salicyl.* 5'0,  
F. Pulv. div. in dos. = 10.  
S. Früh, Mittags u. Abds.  
1 Pulver (in Oblaten).

1293. Rp. *Natr. salicyl.* 10'0,  
F. Pulv. div. in dos. = 10.  
S. 1—2stündlich 1 Pulv.  
(Die halbe Dose als Nach-  
cur.)

1294. Rp. *Acidi salicyl.* 5'0,  
Spir. vin. q. s. ad sol.,  
Aqua destill. 150'0,  
Syr. cort. aur. 15'0,  
S. Jede 2. St. 1 Esslöffel.

1295. Rp. *Saloli puriss.*,  
Sacch. alb. aa. 1'0.  
M. f. p. dent. tal. dos. = 10.  
S. 3—4 Pulver täglich.

1296. Rp. *Propylamini* gttss 20,  
Aqua destill. 150'0,  
Elaeos. Menth. pip. 5'0.  
S. 2stündlich 1 Esslöffel.

Bei starken Fieber-Paroxysmen:

1297. Rp. *Sulf. Chinini* 1'0,  
Sacch. alb. 2'0.  
M. f. P. div. in dos. = 10.  
S. Jede 3. St. 1 Pulv.

1298. Rp. *Antipyrini* 5'0,  
Dio. in dos. = 5,  
D. ad caps. amyl.  
S. Jede Stunde 1 Pulv.

1299. Rp. *Antifebrini* 2'0,  
Sacch. alb.,  
Gummi ar. aa. 1'0,  
F. pil. Nr. 20.  
S. 3—5 P. zu nehmen.

Gegen bedeutende Schmer-  
zen Morfium-Injectionen;  
gegen Schlaflosigkeit;

1300. Rp. *Chloral. hydr.* 5'0,  
Aqua destill. 50'0,  
Syr. cort. aur. 20'0,  
S. Die Hälfte auf einmal  
zu nehmen.

1301. Rp. *Extr. cann. Ind.* 50,  
Sacch. alb. 2'0,  
M. f. Pulv. div. in dos. = 5,  
S. 2stündlich 1 Pulver.

Bei fixen Schmerzen:

1302. Rp. *Ol. Sinapis aeth.*  
gtts 10,  
*Ol. Terebinthinac.*,  
Spir. sapon. aa. 20'0,  
S. 3mal tägl. einzupinseln.

1303. Rp. *Liquor. Holland.*  
*Olei Hyosciami* aa. 20'0,  
Glycerini pur. 50'0,  
S. Zum Einreiben.

1304. Rp. *Tinct. Jodinae.*  
*Tinct. Gallar.* aa. 10'0,  
S. Zum Bepinseln (na-  
mentlich auch bei chro-  
nischem Gelenksrheuma-  
tismus).

Bei frequentem Puls und  
hoher Temperatur.

1305. Rp. *Inf. fol. Digit. purp.*  
c 1'0 ad 150'0,  
Syr. rub. Idaei 15'0,  
S. Jede 2. St. 1 Esslöffel.

1306. Rp. *Inf. fol. Digit. purp.*  
c 1'0 ad 150'0,  
Kalii acet. 5'0,  
Oxymell. Scillae 10'0,  
S. Stündlich 1 Esslöffel.

1307. Rp. *Kal. nitrici.*  
*Kal. acet.* aa. 5'0,  
Aqua destill. 200'0,  
Syr. cort. aur. 20'0,  
S. Stündlich 1 Esslöffel.

1308. Rp. Ung. Hydr. 10'0.

*S. Bohnengross 2mal täglich einzureiben.*

1309. Rp. Kal. jodat. 2'0,

*Vaselini 15'0.**S. 3mal tägl. einzureiben.*

Auch bei Arthritis deformans Massage nebst activen und passiven Bewegungen zu versuchen.

**Rheumatismus musculorum, Muskelrheumatismus.**

Locale Behandlung durch Einreibung von Salben. Abreibungen, Massage: in frischen Fällen warmer Thee, warme Einhüllung des Körpers, Dampfbad.

1310. Rp. Ol. Hyosc. coct. 20'0,

*Chloroform. 5'0.**S. Zum Einreiben.*

1311. Rp. Extr. Bellad. 2'0,

*Ung. emoll. 20'0.**S. Salbe.***Salivatio** vide: Stomatitis mercurialis.**Scabies, Krätze.** Nach einem halbstündigen Seifenbade

Einreibung mit einer der folgenden Salben Früh u. Abends durch 2 Tage nebst Einhüllung in wollene Decken; hierauf ein Reinigungsbad. Allenfalls zurückbleibende Eczeme nachträglich zu behandeln. Bei Verhinderung während des Tags Einreibung der Salbe an 3—4 Abenden.

1312. Rp. Calcis vivae 25'0,

*Sulf. citrini 50'0.**Coq. cum Aq. font. 500'0.**Ad remanent. 300'0.*

*S. Zum Einreiben. (Solutio Vlemmingkx, modificirt von Hebra.)*

1316. Rp. Styracis liquidi,

*Florum sulf.,**Cretae albae aa. 15'0.**Saponis viridis,**Axung. Porci aa. 30'0.*

*S. Zum Einreib. (Weinberg's Salbe.)*

1313. Rp. Florum sulf.,

*Olei Cadini aa. 20'0.**Cretae albae 2'0.**Saponis viridis,**Axung. Porci aa. 40'0.**S. Zum Einreiben.*

*(Wilkinson'sche Salbe, modificirt von Hebra.)*

1317. Rp. Flor. sulf.,

*Kali carbon. aa. 10'0.**Axungiae Porci 80'0.**S. Salbe.*

Bei Kindern oder bei geringer Ausdehnung der Krankheit genügen:

1314. Rp. Naphtoli 15'0,

*Axung. Porc. 100'0.**Sapon. virid. 50'0.**Cretae alb. p. 10'0.**S. Zum Einreiben.*

*(Ung. Naphtoli comp.; eine einmalige Einreibung genügt.)*

1318. Rp. Styracis liquidi,

*Balsami Peruv. aa. 50'0.**S. Zum Einreiben.*

Zuweilen genügt auch die Einreibung von Bals. Peruv. allein.

1315. Rp. Naphth. pur. cryst.

*10'0,**Ol. Lini 100'0.**S. 3—4mal in 24—36**Stunden einzureiben.*

1319. Rp. Sulf. venalis 5'0,

*Axung. Porci 50'0.**S. Zum Einreiben.*

1320. Rp. Sulf. venalis,

*Bals. Peruani aa. 10'0.**Axung. Porci 100'0.**S. Zum Einreiben.*

1264. Rp. *Acid. arsenic. sublim.*  
*trit. 0.50.*  
*Piper. nigr. pulv. 5.0.*  
*Gumm. arab. 1.0.*

*Aquae destill. q. s.*  
*u. f. pil. Nr. 100.*  
*S. 1—2—10 Pillen tägl.*  
*(Pilulae asiaticae.)*

**Pustula maligna, Carbunkel, Milzbrand.** Canterisation der Infectionsstelle mit Kali caust., Salpetersäure oder Paquelin's Thermocauter. Auch Excoision mit darauffolgender Canterisation, tiefe Kreuzschnitte. Antisept. Wundbehandlung. Umschläge von Carbolgaze in 2½%ige warme Carbollösung getaucht. Von anderer Seite wird ein möglichst conservatives Verfahren (Chlorwasser oder Bleiurnschläge) empfohlen und die Aetznag der geritzten Stelle nur in der allerersten Zeit als statthaft erklärt. Gegen Milzbrand sowie zur Verkleinerung der Indurationszone beim Carbunkel wird Jod intern und subcutan empfohlen.

1265. Rp. *Chinini sulf. 2.0.*  
*Ac. sulf. dil. gtt. 10.*  
*Aquae destill. 200.0.*  
*Syr. simpl. 20.0.*  
*S. Jede 2. St. 2 Esslöffel.*  
 1266. Rp. *Acidi carbol. 5.0.*  
*Aquae destill. 200.0.*  
*S. Zu Umschlägen.*

1267. Rp. *Acidi salicyl. 1.0.*  
*Aquae destill. 100.0.*  
*Glycerin. pur. 50.0.*  
*S. Zum Verband.*  
 1268. Rp. *Tinct. Jodinae 1.0.*  
*Aq. dest. 50.0.*  
*S. 10 Tropfen subcutan zu injiciren.*

**Pyämie, Wundfieber.** Beseitigung des ursächlichen Momentes (operat. Eingriffe), sorgfältige Desinficirung, antifebrile Therapie; starke Weine, Cognac. Kühlende Getränke, Wärme.

1269. Rp. *Chinini sulfur. 2.0.*  
*Natr. bicarb.,*  
*Sacch. alb. aa. 1.0.*  
*M. f. Pulv. div. in dos. = 5.*  
*S. Jede 3. St. 1 Pulver.*  
 1270. Rp. *Antipyrini 15.0.*  
*Div. in dos. = 10.*

- S. Jede 2. St. 1 Stärk*  
*(bis zur Abnahme der*  
*Temperatur).*  
 1271. Rp. *Morf. mariat. 0.03.*  
*Sacch. alb. 2.0.*  
*M. f. Pulv. div. in dos. = 5.*  
*S. Abends 1 Pulver.*

**Pyelitis, Entzündung der Nierenbecken.** Berücksichtigung des Causalmomentes. Nur im Anfangsstadium kalte, später warme Umschläge, warme Bäder. Gegen die Schmerzen Morphin innerlich oder in Stuhlzäpfchen (v. Nr. 425). Meidung reizender Speisen und Getränke; reizlose Flüssigkeiten (Milch, Mandelmilch, Wasser) in reichlicher Quantität empfehlenswerth; Sorge für leichten Stuhlgang. Bei acuter Pyelitis Bettruhe, bei Fieber Chinin, eventuell mit Morphin; bei chronischer Pyelitis Milcheur, lauwarme Bäder.

1272. Rp. *Lupulini 1.0.*  
*Sacch. alb. 5.0.*  
*M. f. P. div. in dos. = 10.*  
*S. Fr. Mitt. u. Ab. 1 Pulv.*

1273. Rp. *Foliorum uvae Ursi*  
*Herb. herniar. aa. 20.*  
*S. Thee. Fröh u. Ab.*  
*1 Tasse.*



Kartoffeln). Säuren, Wein. Gegen Ecchymosen, Infiltrationen Umschläge mit Essig oder Bleilösung.

1336. Rp. *Dec. Multic. tur. Pini*  
e 20°0 ad 200°0,

*Fermenti cerevisiae,*  
*Oxymell. Scillae aa. 20°0.*  
S. Stündlich 1 Esslöffel.

1337. Rp. *Ferm. cerevis. 50°0,*  
*Aquae destill. 150°0.*

*Oxymell. Scillae 20°0.*  
S. Stündlich 1 Esslöffel.

1338. Rp. *Decoct. cort. Peruv.*  
e 20°0 ad 200°0,

*Elixir. acid. Haller. 2°0,*  
*Syr. capillor. ven. 20°0.*  
S. Stündlich 1 Esslöffel.

Als Roborans:

1339. Rp. *Tet. Chin. comp. 40°0,*  
*Tinct. Aurant. 10°0.*

S. 4mal tägl. 1 Esslöffel.

1340. Rp. *Kal. hypermang. 5°0,*  
*Aquae destill. 200°0.*

S. Mundwasser (zu verdünnen).

1341. Rp. *Acidi salicyl. 5°0,*  
*Aquae destill. cum pau.*

*spir. vin. 500°0.*  
S. Mundwasser.

1342. Rp. *Tinct. Ratanh. 20°0,*  
*Aquae destill. 200°0.*

S. Mundwasser.

1343. Rp. *Tinct. Ratanh.,*  
*Tinct. Gallar. aa. 15°0.*

S. Zum Bepinseln des  
Zahnfleisches.

1344. Rp. *Acid. mur. dil. 2°0,*  
*Mellis rosat. 20°0.*

S. Wie das Vorige.

1345. Rp. *Fol. Salviae 50°0.*  
S. Thee (Aufguss als

Mundwasser).

Gegen Nasenbluten:

1346. Rp. *Aq. haemostat. 50°0,*  
*Alumin. crud. pulv. 20°0.*

S. Zum Aufschnupfen.

**Scrophulosis.** Vor Allem zweckmässige Anordnungen betreffs der Nahrung. Strenge Einhaltung von regelmässigen Mahlzeiten. Milch, Eier, Suppe, Fleisch, am besten gebraten, leichtes grünes Gemüse; keine schwer verdaulichen Speisen, keine Hülsenfrüchte, keine Erdäpfeln, wenig Brod etc. — Sorge für frische Luft im Wohn- und Schlafzimmer, Bewegung im Freien, am besten Landaufenthalt; Bäder, denen allenfalls etwas Steinsalz beizufügen ist. Hall, Lipik, Darkau, Kreuznach. Abscesse, Caries, Augenkrankheiten, Hautausschläge sind nebst innerlichen Medicamenten nach den speciellen Regeln zu behandeln.

1347. Rp. *Ol. jecor. Asell. 50°0.*  
S. Kaffee-b. Esslöffelweise.

1348. Rp. *Ferr. carb. sacch.,*  
*Sacch. alb. aa. 5°0.*

S. Messerspitze Fröh und Abends.

1349. Rp. *Ferr. lactici,*  
*Pulv. rad. Rhei. ch. aa. 1°0,*

*Sacch. alb. 2°0,*

*M. f. P. die. in dos. = 10.*

S. Fröh u. Abds. 1 Pulv.

1350. Rp. *Syr. Ferri jodat. 5°0,*  
*Syr. cort. Aur. 15°0.*

S. Fröh und Abends 1  
Kaffeelöffel.

1351. Rp. *Tinct. amar. 15°0,*  
*Tinct. mal. Ferr. 5°0.*

S. 15 Tropfen vor jeder  
Mahlzeit.

1352. Rp. *Chinini sulf. 1°0,*  
*Ferr. carb. sacch. 2°0.*

*Sacch. alb. 10°0,*

*M. f. Pulv. D. ad Scat.*

S. Fröh und Abends 1  
Messerspitze voll.

1353. Rp. *Jodoformi 1°0,*  
*Ol. Jecor. Asell. 200°0.*

*Ol. Anisi 0°50.*

S. 1 Esslöffel 3mal tägl.



1321. Rp. *Petrolei*,  
*Ol. olivar. aa. 50° 0*,  
*S. Zum Einreiben.*  
 Für Wohlhab. empfehlensw.:  
*Bourguignon's Salbe*,  
 modificirt von Hebra.

**Scarlatina, Scharlach.** Symptomatische Behandlung.  
 Unter allen Umständen Bettruhe bis nach Ablauf des  
 Desquamationsprocesses, Lüftung des Krankenzimmers;  
 Zimmertemperatur 15° R.; Isolirung der Gesunden.  
 Chinin oder Salicylsäure gegen das Fieber, säuerliche  
 Getränke. Bei intensivem Fieber Eisumschläge auf den  
 Kopf, auch Kaltwasserbehandlung in gewissen Fällen;  
 dem Fieber anpassende Diät; Sorge für Stuhlgang,  
 häufige Besichtigung des Halses. Tritt Nephritis mit  
 Hydrops dazu (Uraemie, Anurie), subcut. Injection von  
 Pilocarpin. p. die 0'005—0'01—0'025 je nach dem Alter des  
 Kindes; warme Bäder, Giesshübl. mit Milch, Radeiner.

1323. Rp. *Chin. sulf. 0'30—1'0*,  
*Sacch. alb. 1'0*,  
*M. f. Pulv.*  
*S. Abends zu nehmen.*

1324. Rp. *Natr. salicyl. 10'0*,  
*Div. in dos. = 10.*  
*S. Jede 2 St. 1 P. (bis z.*  
*Herabsetzung d. Temp.).*

1325. Rp. *Acidi sulf. dil. 2'0*,  
*Aquae destill. 150'0*,  
*Syr. rub. Id. 20'0*.  
*S. Zum Getränk.*

1326. Rp. *Elix. acid. Hall. 5'0*,  
*Syr. rub. Idaci. 50'0*.  
*S. Zusatz zum Getränk.*

1327. Rp. *Mixt. oleos. 100'0*,  
*Tinct. Belladonn. gtts 5.*  
*S. Jede 2. St. 1 Kaffeeöffel.*

1328. Rp. *Pilocarp. mar. 0'20*.  
*Aquae destill. 10'0*.  
*S. Zu subcut. Injection*  
*(bei kleinen Kindern  $\frac{1}{4}$ ,*  
*bei grösseren  $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$  oder*  
*die ganze Spritze zu inj.).*

Bei Hydrops nach Scarlat.  
 als erfolgreiches Diuretic.:

1322. Rp. *Olei Lavandulae*,  
*Olei Caryophyll. aa. 1'0*,  
*Kal. carbon. 25'0*,  
*Lactis sulf. 75'0*,  
*Azong. Porc. q. s.*  
*ut f. Ung. S. Salbe.*

1329. Rp. *Blattae orient. 2'0*,  
*Div. in dos = 10.*  
*S. Jede 2. Stunde 1 Dose.*  
 1330. Rp. *Alum. crud. p. 1—2'0*,  
*Aq. dest. 100'0*,  
*Syr. rub. Id. 15'0*.

- S. Stündl. 1 Kindertöffel.*  
 1331. Rp. *Mixt. gumm. 100'0*,  
*Camphor. subact. 0'10*,  
*Syr. rub. Idaci 10'0*.  
*S. Stündlich 1 Kaffeeöffel.*

1332. Rp. *Chlorinae liq. 1'0*,  
*Aquae destill. 100'0*,  
*Syr. rub. Idaci 10'0*.  
*S. Stündl. 1 Kaffeeöffel.*

1333. Rp. *Kal. chloric. 0'5*,  
*Aquae destill. 100'0*,  
*Syr. rub. Id. 10'0*.  
*S. Stündl. 1 Kindertöffel.*

1334. Rp. *Chinini sulf. 0'5*.  
*Sacch. alb. 2'0*,  
*M. f. Pulv. div. in dos. = 5,*  
*D. ad capsul. amylic.*  
*S. Jede 2. St. 1 Pulver.*

1335. Rp. *Chinini tann. 1'0*,  
*Sacch. alb. 2'0*,  
*M. f. Pulv. div. in dos. = 5.*  
*S. Jede 2. Stunde 1 Pulv.*

**Schanker** vide: Ulcus contagiosum und Sklerosis.  
**Scorbutus, Scharbock.** Berücksichtigung der ursächl.  
 Momente. Sorge für reine Luft, trockene Wohnung, ent-  
 sprechende Ernährung (Obst, Gemüse, namentlich

Kartoffeln), Säuran, Weig. Gegen Ecchymosen, Infiltrationen Umschläge mit Essig oder Bleilösung.

1336. Rp. Dec. Multi c. tur. Pini  
e 20°0 ad 200°0.

*Fermentū cerevisiae,*  
*Oxymell. Scillae aa. 20°0.*

*S. Stündlich 1 Esslöffel.*

1337. Rp. *Ferm. cerevis.* 50°0,  
*Aquae destill. 150°0.*

*Oxymell. Scillae 20°0.*

*S. Stündlich 1 Esslöffel.*

1338. Rp. Decoct. cort. Peruv.  
e 20°0 ad 200°0.

*Elizir. acid. Haller. 2°0.*

*Syr. capillor. ven. 20°0.*

*S. Stündlich 1 Esslöffel.*

Als Roborans:

1339. Rp. Tct. Chin. comp. 40°0,  
*Tinct. Aurant. 10°0.*

*S. 4mal tägl. 1 Esslöffel.*

1340. Rp. *Kal. hypermang.* 5°0,  
*Aquae destill. 200°0.*

*S. Mundwasser (zu verdünnen).*

1341. Rp. *Acidi salicyl.* 5°0,  
*Aquae destill. cum pau.*

*spir. vin. 500°0.*

*S. Mundwasser.*

1342. Rp. *Tinct. Ratanh.* 20°0,  
*Aquae destill. 200°0.*

*S. Mundwasser.*

1343. Rp. *Tinct. Ratanh.,*  
*Tinct. Gallar. aa. 15°0.*

*S. Zum Bepinseln des Zahnfleisches.*

1344. Rp. *Acid. mur. dil.* 2°0,  
*Mellis rosat. 20°0.*

*S. Wie das Vorige.*

1345. Rp. *Fol. Salviae* 50°0.  
*S. Thee (Aufguss als*

*Mundwasser).*

Gegen Nasenbluten:

1346. Rp. *Aq. haemostat.* 50°0,  
*Alumin. crud. pulv.* 20°0.

*S. Zum Aufschnupfen.*

**Scrophulosis.** Vor Allem zweckmässige Anordnungen betreffs der Nahrung. Strenge Einhaltung von regelmässigen Mahlzeiten. Milch, Eier, Suppe, Fleisch, am besten gebraten, leichtes grünes Gemüse; keine schwer verdaulichen Speisen, keine Hülsenfrüchte, keine Erdäpfel, wenig Brod etc. — Sorge für frische Luft im Wohn- und Schlafzimmer; Bewegung im Freien, am besten Landaufenthalt; Bäder, denen allenfalls etwas Steinsalz beizufügen ist. Hall, Lipik, Darkau, Kreuznach. Abscesse, Caries, Augenkrankheiten, Hautausschläge sind nebst innerlichen Medicamenten nach den speciellen Regeln zu behandeln.

1347. Rp. *Ol. jecor. Asell.* 50°0.  
*S. Kaffee-b. Esslöffelweise.*

1348. Rp. *Ferr. carb. sacch.,*  
*Sacch. alb. aa. 5°0.*

*S. Messerspitze Fröh und Abends.*

1349. Rp. *Ferr. lactici,*  
*Pulv. rad. Rhei. ch. aa. 1°0,*

*Sacch. alb. 2°0,*

*M. f. P. div. in dos. = 10.*

*S. Fröh u. Abds. 1 Pulv.*

1350. Rp. *Syr. Ferri iodat.* 5°0,  
*Syr. cort. Aur.* 15°0.

*S. Fröh und Abends 1 Kaffelöffel.*

1351. Rp. *Tinct. amar.* 15°0,  
*Tinct. mal. Ferr.* 5°0.

*S. 15 Tropfen vor jeder Mahlzeit.*

1352. Rp. *Chinini sulf.* 1°0,  
*Ferr. carb. sacch.* 2°0.

*Sacch. alb. 10°0,*

*M. f. Pulv. D. ad Scat.*

*S. Fröh und Abends 1 Messerspitze voll.*

1353. Rp. *Jodoformi* 1°0,  
*Ol. Jecor. Asell.* 200°0.

*Ol. Anisi* 0°50.

*S. 1 Esslöffel 3mal tägl.*

1321. Rp. *Petrolei*,  
*Ol. olivar. aa.* 50° 0,  
*S.* Zum Einreiben.  
 Für Wohlhab. empfehlensw.:  
 Bourguignon's Salbe,  
 modificirt von Hebra.

1322. Rp. *Olei Lavandulae*,  
*Olei Caryophyll. aa.* 10,  
*Kal. carbon.* 25° 0,  
*Lactis sulf.* 75° 0,  
*Azung. Porc. q. s.*  
*ut f. Ung. S. Salbe.*

**Scarlatina, Scharlach.** Symptomatische Behandlung.  
 Unter allen Umständen Bettruhe bis nach Ablauf des  
 Desquamationsprocesses, Lüftung des Krankenzimmers;  
 Zimmertemperatur 15° R.; Isolirung der Gesunden.  
 Chinin oder Salicylsäure gegen das Fieber, säuerliche  
 Getränke. Bei intensivem Fieber Eisumschläge auf den  
 Kopf, auch Kaltwasserbehandlung in gewissen Fällen;  
 dem Fieber anpassende Diät; Sorge für Stuhlgang,  
 häufige Besichtigung des Halses. Tritt Nephritis mit  
 Hydrops dazu (Uraemie, Anurie), subcut. Injection von  
 Pilocarpin, p. die 0'005—0'01—0'025 je nach dem Alter des  
 Kindes; warme Bäder, Giesshübl. mit Milch, Radeiner.

1323. Rp. *Chin. sulf.* 0'30—1° 0,  
*Sacch. alb.* 1° 0,  
*M. f. Pulv.*  
*S.* Abends zu nehmen.

1329. Rp. *Blattae orient.* 2° 0,  
*Div. in dos. = 10,*  
*S.* Jede 2. Stunde 1 Dose.

1324. Rp. *Natr. salicyl.* 10° 0,  
*Div. in dos. = 10.*  
*S.* Jede 2 St. 1 P. (bis z.  
 Herabsetzung d. Temp.).

1330. Rp. *Alum. crud. p.* 1—2° 0,  
*Aq. dest.* 100° 0,  
*Syr. rub. Jd.* 15° 0.  
*S.* Stündl. 1 Kindertöf. f.

1325. Rp. *Acidi sulf. dil.* 2° 0,  
*Aquae destill.* 150° 0,  
*Syr. rub. Id.* 20° 0,  
*S.* Zum Getränk.

1331. Rp. *Mixt. gumm.* 100° 0,  
*Camphor. subact.* 0'10,  
*Syr. rub. Idaci* 10° 0.

1326. Rp. *Elix. acid. Hall.* 5° 0,  
*Syr. rub. Idaci.* 50° 0,  
*S.* Zusatz zum Getränk.

1332. Rp. *Chlorinae liq.* 1° 0,  
*Aquae destill.* 100° 0,  
*Syr. rub. Idaci* 10° 0.

1327. Rp. *Mixt. oleos.* 100° 0,  
*Tinct. Belladonn. gttss* 5.  
*S.* Jede 2. St. 1 Kaffetöf. f.

1333. Rp. *Kal. chloric.* 0'5,  
*Aquae destill.* 100° 0,  
*Syr. rub. Id.* 10° 0.

1328. Rp. *Pilocarp. mur.* 0'20,  
*Aquae destill.* 10° 0.  
*S.* Zu subcut. Injection  
 (bei kleinen Kindern  $\frac{1}{4}$ ,  
 bei grösseren  $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$  oder  
 die ganze Spritze zu inj.).

1334. Rp. *Chinini sulf.* 0'5,  
*Sacch. alb.* 2° 0,  
*M. f. Pulv. div. in dos. = 5.*

*Bei Hydrops nach Scarlat.*  
*als erfolgreiches Diuretic.:*

1335. Rp. *Chinini tann.* 1° 0,  
*Sacch. alb.* 2° 0,  
*M. f. Pulv. div. in dos. = 5.*

*S.* Jede 2. Stunde 1 Pulv.

**Schanker** vide: *Ulcus contagiosum* und *Sklerosis*.  
**Scorbutus, Scharbock.** Berücksichtigung der ursächl.  
 Momente, Sorge für reine Luft, trockene Wohnung, ent-  
 sprechende Ernährung (Obst, Gemüse, namentlich

**Chilis, harter Schanker.** Aetzung bis zur Erlangung einer rein eiternden Wundfläche, hierauf Anwendung von Verbandwasser, Salben oder Pflaster bei Ueberhäutung; entsprechende Reinigung vor dem Umschlagen. Bei Entzündung und ödematöser Schwellung Infiltration der Umgebung kalte Umschläge. Gleichzeitige Behandlung der Complicationen. *Vide: Syphilis.*

*Rp. Cupri sulfur. 10, Aquae destill. 1000.*

*S. Zum Bepinseln (stark emoll., missfärbiger Substanztherit. Sklerosen).*

*Rp. M. subl. corr. 050, Aquae destill.,*

*Rp. vin. conc. aa. 100.*

*S. Zum Bepinseln.*

*Rp. Cupri sulf. 050, Ol. emoll. 150.*

*S. Salbe.*

*S. Ausspülen der exulcerirten oder excoriirten Flächen:*

*Rp. Kali chlorici 20, Aquae destill. 2000.*

*S. Außerlich.*

*S. Bei weiternder Sklerose, bei verdächtigen Excoriationen:*

*Rp. M. subl. corr. 020, Aquae destill. simpl. 1000.*

*S. Verbandwasser.*

*1375. Rp. Acid. carbol. 10, Aquae destill. 1000.*

*S. Verbandwasser.*

*1376. Rp. Thymol. 050, Aquae dest. ferv. 5000.*

*S. Außerlich.*

*1377. Rp. Jodoformi pulv. 100 Ol. Bergamott. gtt. 1.*

*S. Zum Bestreuen.*

*Bedeckung mit Bruns'scher Wolle, hydrophil. Verbandstoff oder Jodoformgaze.*

*1378. Rp. Empl. Hydrarg., Empl. sapon. aa. 50,*

*M. Tend. s. linteum.*

*S. Pflaster (graues Pfl.).*

*Ebenso Unna's Quecksilber-Pflastermull.*

*1379. Rp. M. praec. rubr. 010, Vaselini 200.*

*S. Salbe (direct aufzutragen u. mit Leinwand zu bedecken).*

*Bei Gangrän:*

*1380. Rp. Gypsi pur. 250, Picis liq. 50.*

*S. Streupulver.*

**Statisch, Insolation.** Entfernung der beengenden Kleidungsstücke, Lagerung auf kühlem Platze, kühlende Getränke, allenfalls Bier, Wein. In höherem Grade Entziehung.

**Schwämmchen.** Häufige Reinigung der ganzen Höhle durch Auswischen mit einem feuchten Tuche oder mit feuchten Charpiepinseln, besonders nach dem Umschlagen. Vorsicht wegen Uebertragung!

*Rp. Kal. chloric. 10, Aquae destill. 1000,*

*Sub. Id. 200.*

*S. Indl. 1 Kinderlöffel.*

*Tinct. Myrrh. 50,*

*Rosat. 300.*

*S. Zum Bepinseln.*

*1383. Rp. Borac. venet. 20, Aquae destill. 1000,*

*Mellis rosat. 200.*

*S. Zum Bepinseln und*

*Ausspülen.*

*Vide: Aphthae.*



1354. Rp. *Jodoformi*,  
*Extr. r. Gentian. aa.* 0'50,  
*Rad. Gent. q. s.*,  
*u. f. pil.* 100.  
*S. 3—5 St. 3—4mal tägl.*

Bei örtlich. Formen (Ozaena u. dgl.) sorgfältige Pflege der Theile nach strikten Belehrungen.

**Seborrhoea, Schmeerfluss.** Entfernung der Borken nach hinlänglicher Erweichung derselben mit Oel etc.; Waschung mit flüssiger Glycerinseife, Seifenwasser oder Spir. sapon. kalinus; Befettung und Waschung mit nachfolgenden Mitteln später fortzusetzen, bis zur Sistirung der Borkenbildung. Berücksichtigung des Allgemeinzustandes. Eisenpräparate, Solut. ars. Fowleri.

1355. Rp. *Spermat. ceti*,  
*Ol. Olivarum aa.* 25'0.  
*S. Salbe.*

1360. Rp. *Acid. carbol.* 5'0.  
*Spir. vini Gallici* 100'0.  
*S. Zu Waschungen.*

1356. Rp. *Cerae alb.*,  
*Paraffini aa.* 5'0.  
*Liquef. adde:*  
*Ol. amygdal.* 30'0,  
*Acid. boric.* 3'0.

1361. Rp. *Acid. salicyl.* 5'0.  
*Aquae destill.* 200'0.  
*S. Zu Waschungen.*

*S. Salbe* (vor dem Gebrauche in lauwarmes Wasser zu stellen).

1362. Rp. *Tinct. Benzoës* 5'0.  
*Spir. vini Gall.* 100'0.  
*S. Zu Waschungen.*

1357. Rp. *Oxyd. Zinci* 10'0,  
*Vaselini* 50'0.  
*S. Salbe.*

Bei reichlichen kleienartigen Schuppen:

1358. Rp. *Plumb. carbon.* 10'0,  
*Ung. emoll.* 50'0.  
*S. Salbe.*

1363. Rp. *Acidi carbol.*,  
*Balsam. Peruviani*,  
*Spir. Lavandulae aa.* 5'0,  
*Spir. vini Gallici* 200'0.  
*S. Zu Waschungen.*

1359. Rp. *Sapon. viridis* 50'0,  
*Spir. vini conc.* 20'0,  
*Spir. Lavandul.* 5'0.

1364. Rp. *Ac. pyrogall.* 2'0,  
*Ung. simpl.* 20'0.

*S. Zum Einreiben.* (Spir. saponis kalinus.)

*S. Salbe* (bei inveter. Leiden im Beginn der Behandlung tägl. durch 1 Woche).

**Singultus, Schluchzen.** Bei typischem Auftreten Chinin, sonst Narcotica; Eispillen zu versuchen. Einreibungen von Spiritus camphoratus in die Magengrube. Auch Schwefeläther mittels Zerstäubungsapparates durch 10 Minuten auf das Epigastrium u. dann 5 Minuten lang auf beide Seiten des Halses applicirt. Subcutane Injection von Morphin oder Atropin; Inhalation von Amylnitrit 1–2 Tropfen; auch Chloroform innerlich. Zu versuchen wäre auch Pilocarpin oder Chloralhydrat in geringer Menge.

1365. Rp. *Subnitr. Bismuth.* 1'0,  
*Sacch. alb.* 2'0,  
*M. f. Pulv. div. in dos.* = 5.

1367. Rp. *Creosoti gtt.* 1–2,  
*Mixt. oleos.* 500'0,  
*Ol. Menthae gtt.* 2.

- S. Fr., Mitt. u. Ab.* 1 Pulv.  
 1366. Rp. *Aquae Laurac.* 5'0,  
*Muriat. Morf.* 0'05

1368. Rp. *Dec. sol. Jaborandi*  
*e* 4'0 ad 150'0.

*S. 5 Tropfen jede 2. St.*

*S. Auf 1–2mal z. u.*



**Sklerosis, harter Schanker.** Aetzung bis zur Erlangung einer rein eiternden Wundfläche, hierauf Anwendung von Verbandwasser, Salben oder Pflaster behufs Ueberhäutung; entsprechende Reinigung vor dem Verbands. Bei Entzündung und ödematöser Schwellung oder Infiltration der Umgebung kalte Umschläge. Gleichzeitige Behandlung der Complicationen. *Vide: Syphilis.*

1369. Rp. *Cupri sulfur. 1'0,*  
*Aquae destill. 10'0.*

*S. Zum Bepinseln (stark eiternder, missfärbiger od. diphtherit. Sklerosen).*

1370. Rp. *M. subl. corr. 0'50,*  
*Aquae destill.,*

*Spir. vin. conc. aa. 10'0.*

*S. Zum Bepinseln.*

1371. Rp. *Cupri sulf. 0'50,*  
*Ung. emoll. 15'0.*

*S. Salbe.*

Zum Abspülen der exulcerirten oder excoriirten Flächen:

1372. Rp. *Kali chlorici 2'0,*  
*Aquae destill. 200'0.*

*S. Aeusserlich.*

1373. Rp. *Zinci muriat. 2'0,*  
*Aquae destill. 200'0.*

*S. Aeusserlich.*

Bei rein eiternder Sklerose, oder bei verdächtigen Excoriationen:

1374. Rp. *M. subl. corr. 0'20,*  
*Aquae destill. simp. 100'0.*

*S. Verbandwasser.*

1375. Rp. *Acid. carbol. 1'0,*  
*Aquae destill. 100'0.*

*S. Verbandwasser.*

1376. Rp. *Thymol. 0'50,*  
*Aquae dest. ferc. 500'0.*

*S. Aeusserlich.*

1377. Rp. *Jodoformi pulv. 10'0*  
*Ol. Bergamott. gtt. 1.*

*S. Zum Bestreuen.*

Bedeckung mit Bruns'scher Wolle, hydrophil. Verbandstoff oder Jodoformgaze.

1378. Rp. *Empl. Hydrarg.,*  
*Empl. sapon. aa. 5'0,*

*M. Tend. s. linteum.*

*S. Pflaster (graues Pfl.).*

Ebenso Unna's Quecksilber-Pflastermull.

1379. Rp. *M. praec. rubr. 0'10,*  
*Vasellini 20'0.*

*S. Salbe (direct aufzutragen u. mit Leinwand zu bedecken).*

Bei Gangrän:

1380. Rp. *Gypsi pur. 25'0,*  
*Picis liq. 5'0.*

*S. Streupulver.*

**Sonnenstich, Insolation.** Entfernung der beengenden Kleidungsstücke, Lagerung auf kühlem Platze, kühlende Getränke, allenfalls Bier, Wein. In höherem Grade Blutentziehung.

**Soor, Schwämmchen.** Häufige Reinigung der ganzen Mundhöhle durch Auswischen mit einem feuchten Tuche oder mit feuchten Charpiepinseln, besonders nach dem Trinken. Vorsicht wegen Uebertragung!

1381. Rp. *Kal. chloric. 1'0,*  
*Aquae destill. 100'0.*

*Syr. rub. Id. 20'0.*

*S. Stündl. 1 Kinderlöffel.*

1382. Rp. *Tinct. Myrrh. 5'0,*  
*Mellis rosat. 30'0.*

*S. Zum Bepinseln.*

1383. Rp. *Borac. venet. 2'0,*  
*Aquae destill. 100'0.*

*Mellis rosat. 20'0.*

*S. Zum Bepinseln und Ausspülen.*

*Vide: Aphthae.*

**Spasmus glottidis, Laryngismus stridulus, Stimmritzenkrampf.** Während des Anfalles Abreibung des Körpers mit Essig oder kaltem Wasser; Bespritzung des Gesichtes mit kaltem Wasser; Inhalation von Chloroform oder Amylnitrit; Clystier mit Aufguss von Camillen; Regelung der Diät: statt künstlicher Ernährung Ammenmilch; sorgfältige Lüftung des Zimmers, wo möglich frische, warme Luft. Bei Kindern hauptsächlich antirachitische Behandlung. Innerlich wird Chloralhydrat 0·12—0·15—0·18 bei  $\frac{1}{2}$ —1—2 jährigen Kindern 3mal täglich empfohlen.

1384. Rp. *Infus. chamomill.*  
e 10·0 ad 100·0,  
*Asae foetid. 1·0.*

S. Zum Clystier. (Erwachsenen d. doppelte Dosis.)

1385. Rp. *Inf. rad. Valerian.*  
e 2·0 ad 100·0,  
*Asae foetid. 1·0.*

S. Zum Clystier.

1386. Rp. *Kal. bromat. 3·0,*  
*Aquae dest. 100·0.*

S. Jede 2. St. 1 Kinderlöffel.

1387. Rp. *Chloralhydr. 1·0,*  
*Aquae dest. 100·0.*

S. Jede 2. St. 1 Kinderlöffel.

**Spermatorrhoe, Samenfluss.** Ermittlung und womöglich Beseitigung der Ursache, Vermeidung alles dessen, was die Genitalien reizt; kalte Waschungen, Douchen, Bäder, Hydrotherapie, Kühlsonde, reizlose Diät, des Abends wenig Nahrung. Luftveränderung, entsprechende Beschäftigung, Berücksichtigung des Allgemeinzustandes durch Verabreichung robor. Mittel (*Ferrum, Chinin etc.*).

1388. Rp. *Lupulini genuini,*  
*Sacch. alb. aa. 5·0,*  
*M. f. P. dic. in dos. = 15.*  
S. Früh, Mittags und Abends je 1 Pulver.

1389. Rp. *Lupulini pur. 1·0,*  
*Camphorae rasae 0·10,*  
*Sacchari albi 2·0,*  
*M. f. P. dic. in dos. = 10.*  
S. Früh u. Abds. 1 Pulv.

1390. Rp. *Camph. subact. 0·20,*  
*Lupulini genuini,*  
*Extr. hum. Lupuli aa. q. s.*  
*u. f. pil. Nr. 30.*  
S. 3mal tägl. je 2 Pillen.

Auch Atropin (0·10 : 10·0)  
Abends 1 Tropfen innerlich  
empfohlen.

1391. Rp. *Kal. bromat. 5·0,*  
*Aquae destill. 150·0,*  
*Syr. rub. Idaci 15·0.*

S. Früh, Mittags und Abends 1 Esslöffel.

Locale Behandlung durch Aetzung der Pars prostat. mittels Endoskops oder des Irrigationskatheters (vide *Catarrhus vesicae*). Auch Sondencur zuweilen erfolgreich.

**Spina bifida.** Empfohlen wird die Entfernung der Flüssigkeit aus den an defecten Stellen der Wirbelsäule befindlichen hernienartigen Geschwülsten durch Aspiration mit einer Pravaz'schen oder einer andern ähnlichen kleinen Spritze; hierauf Anlegung einer Blinde. Injection von Tinctura Jodi neuestens empfohlen. Exstirpation unter antiseptischen Cautelen.

**Stenocardie** vide: Angina pectoris.

**Stomatitis ulcerosa, mercurialis, Stomacace, Mundfäule, Ptyalismus, Speichelfluss.** Sehr häufige und gründliche Reinigung des Mundes durch Ausspülen, besser aber durch Irrigation mit Hilfe eines einfachen passenden Apparates. Weiche Speisen; Wein, Milch. Bei Stomatitis merc. Beseitigung der Mercurialpräparate.

1392. Rp. Kal. chlorici 5'0,  
Aquae destill. 500'0.

S. Mundwasser.

1393. Rp. Acid. salicyl. 5'0,  
Aquae destill. 500'0.

S. Mundwasser.

1394. Rp. Kal. hyperm. 2'0,  
Aquae destill. 500'0.

S. Mundwasser.

1395. Rp. Acid. carbol. 1'0,  
Aquae destill. 400'0.

S. Mundwasser.

1396. Rp. Tinct. Opii. spl. 5'0,  
Aquae destill. 500'0.

S. Mundwasser.

Auch diverse Decocte oder

Infuse mit den adstring.  
Mitteln verwendbar.

1397. Rp. Tinct. Ratanhae,  
Tinct. Gallarum aa. 5'0.

S. Zum Bepinseln des  
Zahnfleisches.

1398. Rp. Tct. Spilanthei ol. 5'0,  
Tinct. Gallarum 10'0.

Tinct. Laudan. spl. 2'0.

S. Zum Bepinseln.

1399. Rp. Ac. thymol. 0'10,  
Aquae destill. 300'0.

S. Zur Bepinselung.

1400. Rp. Pulv. carb. Tillae 20'0.

S. Zahnpulver.

Vide: Odontalgie.

**Struma, Kropf.** Bei parenchymatöser Struma Einpinse-  
lungen mit reiner oder verdünnter Jodtinctur oder mit  
Jodglycerin, Einreib. von Jodkalisalbe oder Ung. einer.;  
Haller oder Darkauer Jodwasser innerlich u. in Form von  
Umschlägen; Jodkali innerlich, parenchymatöse Injec-  
tion von Jodtinctur (1—5 Tropfen 2mal wöchentlich).  
Bei Cysten kropf Function mit nachfolgender Jod-  
injection; hierauf Collodiumverband.

1401. Rp. Kali jodat. 1'0,  
Jodi pur. 0'10,

Glycer. 20'0.

S. Zum Bepinseln.

1402. Rp. Tinct. Jodinae,  
Tinct. Gallarum aa. 10'0.

S. Zum Bepinseln.

1403. Rp. Tinct. Jodinae 15'0.

S. Zum Einpinseln even-  
tuell zu parench. Inj.).

1404. Rp. Jodi 5'0,  
Alcohol. absol. 40'0.

S. Stärkere Jodtinctur.

(Diese nach der engl.  
Pharm. bereite Jodtinc-  
tur ist 2mal so stark als  
die der österr. Letztere  
enthält nämlich reines  
Jod 1 : 16 Alkohol.)

**Sudamina.** Bestreuung mit Amylum, Semen Lycopodii  
oder Alumen plumosum pulv.; jede andere Medication  
überflüssig, Reizmittel schädlich.

**Sykosis, Bartfinne.** Erweichung allenfalls vorhandener  
Borken mit Fett und Beseitigung derselben; Waschun-  
gen mit Schmierseife und Spiritus saponatus. Täglich  
Rasiren und Epiliren. Bedeckung der Haut mit Salbe.  
Abstreifen mit dem scharfen Löffel empfohlen.

1405. Rp. Ung. Diachyl. 30'0.  
S. Messerrückendick auf  
Leinwand aufzustreichen  
und über Nacht aufzulegen.

1406. Rp. M. praec. albi 2'0,  
Vasellini 20'0.  
S. Salbe. (Wie das Vorige.)

1407. Rp. M. praec. rubr. 0'50,  
Ung. emollient. 20'0.

S. Salbe (bei Sykosis der  
Nasenschleimhaut).

Auch Wilkinson'sche  
Salbe Nr. 613 passend.

1408. Rp. Oxydi Zinci 20'0,  
Vasellini 30'0.

S. Salbe (gegen die  
restirende Röthe).

1409. Rp. Resorc. puriss. 10'0,  
Vasellini alb. 50'0,

Amyl. oryzae,

Zinci oxydat. aa. 25'0,

M. f. pasta.

S. 2–3mal wöchentlich  
einzureiben.

1410. Rp. Ung. Diachyl. 30'0,  
Ung. Hydrarg. 10'0.

S. Salbe.

Auch Cupr. oleatum 2:8  
Fett bei mehrtäg. Verband.

Eröffnung u. Cauterisation  
od. Stichelung d. Pusteln.

**Syphilis congenita, angeborene Syphilis.** Womöglich  
Muttermilch, eventuell Ammenmilch (Amme auf die  
Gefahr der Infection aufmerksam zu machen!); sonst  
kräftige Nahrung; sorgfältige Reinhaltung, besonders  
der Mundhöhle, der Genitalien und der Aftergegend.  
Locale Behandlung ebenso dringend wie die allgemeine.  
Gefahr der Infection für die Umgebung! Eventuelle  
Behandlung der Eltern.

1411. Rp. Calomel. 0'20,  
Sacch. alb. 10'0,  
M. f. P. div. in dos. = 15.  
S. Früh und Abends  
1 Pulver.

1412. Rp. Protojod. Hydrarg.  
0'20,  
Sacchari alb. 10'0,  
M. f. P. div. in dos. = 15.  
S. Früh und Abends  
1 Pulver.

1413. Rp. Ferr. oxydul. 0'30,  
Sacch. alb. 3'0,  
M. f. Pulv. div. in dos.  
= 10.  
S. Früh und Abends 1  
Pulver.

1414. Rp. Calomel. 0'20,  
Ferr. carb. sacch. 0'50,  
Sacch. alb. 10'0,  
M. f. P. div. in dos. = 15.  
S. Früh und Abends  
1 Pulver.

1415. Rp. M. subl. corr. 0'10,  
Aq. dest. 100'0.  
S. Nach den Mahlzeiten  
1 Kinderlöffel.

Bei Kindern von 1 bis  
2 Jahren die Einreibungs-  
cur mit entsprechender  
Vorsicht in öfteren Pausen:

1416. Rp. Ung. Hydrarg.,  
Ung. emoll. aa. 2'0,  
Div. in dos. = 10.

S. Für 5 Tage (jeden  
Tag sind je 2 Zeltchen zu  
verwenden; vid. Nr. 1420).

1417. Rp. Hydr. bichl. corr. 5'0,  
Salis ammoniac. 2'0,  
Aquae destill. 200'0.  
S. Zusatz zu 3 Bädern.

Bei excoriirten oder exul-  
cerirten Papeln in der  
Genito-Analgegend:

1418. Rp. M. subl. corr. 0'10,  
Aquae destill. 20'0.  
S. Zum Bepinseln.



Gegen Papeln an der Mundschleimhaut oder Rhagaden am Mundwinkel oder Nasenflügel, graues Pflaster Nr. 1460, oder:

1419. Rp. *M. praec. rubr.* ʒ 50.  
*Ung. emoll.* 10ʒ 0.  
*S. Salbe.*

**Syphilis universalis, allgemeine Syphilis.** Nebst der allgemeinen auch locale Behandlung sowohl der Initialformen, als auch der an einzelnen Körperstellen später auftretenden Erscheinungen der Syphilis. Präparate von Jod und Mercur sind die Hauptmittel; beim Gebrauch der letzteren Vorsichtsmassregeln wegen Stomatitis etc.; Specielle Berücksichtigung u. Behandlung der Exeorationen, Geschwüre, Infiltrationen etc., je nach den Standorten. Badecuren in Hall, Lipik, Darkau, Creuznach, Baden, Aachen. Vide: Schanker, Sklerosis.

1420. Rp. *Ungu. Hydrarg.* 15ʒ 0.  
*Div. in dos.* = 10,  
*D. ad. chart. cer.*

*S. Für 5 Abende (zur Einreibungscur).*

Je 2 Dosen am 1. Abende auf die Unterschenkel, am 2. auf die Oberschenkel, am 3. an die Seitentheile des Thorax, am 4. auf den Rücken, am 5. auf die Arme eingerieben; am 6. Tag lauwarmes Seifenbad. Am folgenden Abende beginnt die zweite Tour. Zugleich zu verwenden Mundwässer, Zahnpulver und Zahntinctur:

1421. Rp. *Kal. chlorici* 5ʒ 0,  
*Aquae destill.* 500ʒ 0.  
*S. Mundwasser.*

1422. Rp. *Kal. hyperm.* 1ʒ 0,  
*Aquae destill.* 500ʒ 0.  
*S. Mundwasser.*

1423. Rp. *Tinct. Gallar.* 5ʒ 0,  
*Aquae destill.* 500ʒ 0,  
*S. Mundwasser.*

1424. Rp. *Acid. salicyl.* 5ʒ 0,  
*Natr. carb.* 2ʒ 0,  
*Aquae destill.* 500ʒ 0.  
*S. Mundwasser.*

1425. Rp. *Tinct. Ratanhae.*  
*Tinct. Gallarum aa.* 5ʒ 0.  
*S. Zahntinctur (zum Benutzen d. Zahnfleisches).*

1426. Rp. *Pulv. carb. Tiliae* 30ʒ 0.  
*S. Zahnpulver (Früh u. Abends zu verwenden).*

1427. Rp. *Carbonis vegetabil.*  
*praep.* 30ʒ 0,  
*Pulv. rad. Ir. flor.* 5ʒ 0,  
*Ol. Menth. pip. gttss* 2.  
*S. Zahnpulver.*

Zahnpulver Nr. 1064 u. ff. Mundwässer, Zahntinctur und Zahnpulver auch bei anderen Mercurialpräpar. Tritt Stomatitis merc. auf, so sind die Quecksilber-Präparate zu sistiren, die obigen Mittel aber um so dringender.

Vide Stomatitis merc.

1428. Rp. *Hydrarg. tannic.*  
*oxydulati* 1ʒ 0,  
*Sacch. Lactis* 5ʒ 0,  
*M.f.p. Div. in dos.* = 10.  
*S. 2—3 P. täglich.*

1429. Rp. *Hydrarg. tann.*  
*oxydul.* 4ʒ 0,  
*Pulv. et Extr. Liq. q. s.,*  
*ut f. pil. Nr. 60.*  
*S. 3—5 Stück des Tags.*

1430. Rp. *Merc. subl. corr.* ʒ 10,  
*Ple. et extr. Acor. aa. q. s.,*  
*u. f. pil. Nr. 20.*  
*S. Früh u. Abends 1 P.*



1431. Rp. Hydr. bichl. corr. 0'10,  
Aqua destill. 200'0.  
S. Früh und Abends 1 Essl.

1432. Rp. Hydr. bichl. corr. 0'10,  
Spir. vini dil. 100'0.

S. Früh und Abends  
1 Kaffeelöffel; bei Erwach-  
senen auch ein Esslöffel in  
ein Glas Zuckerwasser oder  
Milch (nach Van Swie-  
ten's Spir. antivenereus).

1433. Rp. Hydr. bichl. corr. 0'10,  
Opil pur. 0'30.

Ple. et Extr. Acor. q. s.,  
u. f. pil. Nr. 20.

S. Früh u. Abends 1 Pille.

1434. Rp. Protojoduret. Hydr.,  
Opil pur. aa. 0'50.

Ple. et Extr. r. Acor. q. s.  
u. f. pil. Nr. 25.

S. Früh u. Abends 1 Pille.

1435. Rp. Calomelanos 0'15,  
Extr. Bellad. 0'07.

Sacch. alb. 3'0.

Div. in dos. = 8.

S. 4 Pulver tägl.

1436. Rp. Kali jodat. 5'0,  
Aqua destill. 150'0.

Syr. cort. aur. 15'0.

S. Fr., Mitt. u. Ab. 1 Essl.

Gegen Jodschnupfen Bella-  
donna empfohlen.

1437. Rp. Natri jodat. 5'0,  
Aqua destill. 150'0.

Syr. cort. aur. 15'0.

S. Früh, Mittags und  
Abends 1 Esslöffel.

1438. Rp. Kali jodat. 5'0.

Ple. et Extr. r. Acor. q. s.,  
u. f. pil. Nr. 30.

S. Fr., Mitt. u. Ab. je 3 Pil.

1439. Rp. Tinct. Jodi 1'50,  
Aqua destill. 200'0.

S. Früh, Mittags und  
Abends 1 Esslöffel.

1440. Rp. Jodoformi 1'50,  
Elacosacch. Menth. 5'0.  
Div. in dos. = 20.

S. Früh u. Abends 1 P.

1441. Rp. Jodoli 0'25 - 0'50,  
Exh. in caps. amyl.

Dent. tal. dos. = 4.

S. Morgens u. Abends z. n.  
(erst nach 1 Woche zu  
wiederholen).

1442. Rp. Ferri jodat. 2'0.

P. et Extr. r. Acor. au. q. s.,  
u. f. pil. 30.

S. Früh u. Abend je 3 St.

1443. Rp. Syr. Ferr. jod. 5'0,  
Syr. cort. aur. 10'0.

S. Früh u. Abends 1 Kaffeel.

1444. Rp. Syr. Ferr. jod. 2'0,  
Syr. Moror. 20'0.

S. Tagsüber zu nehmen.

1445. Rp. Decoct. Zittmanni  
fort. 200'0.

S. Innerhalb einer Stunde  
Vorm. lauwarm zu nehmen.

1446. Rp. Decoct. Zittmanni  
mit. 300'0.

S. Abends kühl zu nehmen.

Bei Complication der Lues  
mit Anaemie und Malaria:

1447. Rp. Arsenici alb. puriss.  
0'10.

Ferr. muriat. puri 1'0.

Chinini mur. 3'0.

Pulv. et extr. cinnam. q. s.,

F. l. a. pil. pond. 0'20

N. 100.

S. 2 Stück Abends z. n.  
(jeden 3. Abend um 1 P.  
mehr bis zu 5 Stück).

1448. Rp. M. subl. corr. 0'20,  
Natr. chlor. 2'0.

Aqua destill. 50'0.

S. Zu subcut. Injectionen  
(davon 1—2 Spritzen =  
0'01 Sublimat p. d.).

1449. Rp. Solut. Hydrarg.  
albumia. 20'0.

S. Zu sube. Injectionen

In 1:0 ist 0:01 Quecksilberalbuminat enthalten. — Besser Pepton-Quecksilber.

1450. Rp. Solut. Hydrargyr. peptonat. 20°0.

S. Zu subcut. Injectionen.

1451. Rp. Hydr. formamidati 0°10,

Aq. dest. 10°0.

S. Zu subcut. Injectionen.

1452. Rp. Acid. glycocholic. 1°25,

Aquae dest. 5°0.

Hydrarg. oxydat. 0°4.

Filtr. et adde Aq. dest. 50 100°0.

S. Zu subcut. Injection (1/2—1°0 Lösung).

1453. Rp. Calomel. vap. par. 5°0.

Natr. chlorat. 1°25,

Aq. dest. 50°0.

S. Zu subcut. Injection.

1454. Rp. Jodoformi 6°0,

Glycerini 20°0.

S. Zu subcut. Inj.

1455. Rp. Kal. jodat. 0°50,

Aquae dest. 10°0.

S. Zu subc. Inj.

Auch subcut. Inj. von Pilocarpin gegen Syphilis empfohlen.

Bei exulcerirten Papeln an der Mundschleimhaut sowie an d. Tonsille Cauterisation mit Lapis; Mundwasser.

1456. Rp. M. subl. corr. 0°20,  
Spir. vin. conc.,

Aquae destill. aa. 5°0.

S. Zum Bepinseln (von Papeln an der Mundschleimhaut).

1457. Rp. Merc. subl. corr. 0°10,  
Aquae destill. 20°0.

S. Verbandmittel (bei exulcerirten Papeln in der Genito-Analgegend).

Bei hartnäckig persistirenden oder luxurirenden Papeln in der Umgebung der Genitalien eine starke Sublimat-Solution:

1458. Rp. Merc. subl. corr. 1°0,  
Spir. vini conc. 10°0.

S. Zu Händen des Arztes (zum Bepinseln).

1459. Rp. Hydr. bicht. corr. 1°0,  
Aetheris sulf. 2°0,  
Collodii 8°0.

S. Zum Bepinseln.

An passenden Körperstellen anwendbar:

1460. Rp. Empl. Hydrarg.,  
Empl. saponat. aa. 5°0,  
Tende supr. lint.

S. Pflaster. (Graues Pflaster.)

An dessen Stelle auch das Quecksilber-Pflastermull.

1461. Rp. Acid. salicyl. 10°0,  
Empl. saponat.

Empl. ciner. aa. 5°0.

S. Pflaster.

**Tabes dorsualis, Rückenmarksschwund.** Im Beginne der Krankheit Bettruhe, mindestens Verbot grösserer Anstrengungen und Arbeiten, ebenso von Aufregungen. Innerlich eisenhaltige Mittel; ferner Bäder, Kaltwassercur, Chapman'scher Rückenschlauch, Elektrizität, gegen Schmerzen Narcotica.

1462. Rp. Kal. bromat. 5°0,

Aquae destill. 150°0,

Syr. cort aur. 15°0.

S. Fröh, Mittags und Abds. 1 Esslöff. (besonders bei nervösen Zuständen).

1463. Rp. Arg. phosph. 0°50,

P. et Extr. r. acor. q. s.

n. f. pil. Nr. 20—25.

S. Täglich 1—2 Pillen.

1464. Rp. *Argent. chlorat.* 0'10,  
*Natr. subsulf.* 0'60,  
*Aquae dest.* 20'0,  
*S. Zu subc. Inj.* ( $\frac{1}{2}$ —1  
 Spritze.)

1465. Rp. *Camphorae ras.* 1'0,  
*Sacch. albi* 2'0,  
*M. f. P. div. in dos.* = 10.  
*S. Früh u. Abends 1 Pule.*  
 (namentlich bei Pollutionen empfohlen).

**Taenia, Bandwurm.** Am Vorabende der Cur ein leichtes Purgans und eine Tasse Thee oder Suppe. Ueblich ein Häring. Des Morgens, nachdem etwas schwarzer Kaffee oder Thee genossen wurde, wird das verordnete Medicament verabreicht. Etwa zwei Stunden nach Gebrauch desselben noch *Oleum Ricini* u. dgl., sofern bis dahin kein Stuhlgang erfolgte.

Bei Kindern, wenn ganz klein oder herabgekommen, die Behandlung des Bandwurmes nicht einzuleiten. Bei grösseren Kindern, deren Allgemeinbefinden befriedigend, und bei denen keine Disposition zu Diarrhoen vorhanden ist, eines der folgenden Medicamente. An dem der Cur vorhergehenden Abende für breiigen Stuhl sorgen und blos klare Suppe verabreichen. Letztere muss auch am Morgen nach dem Gebrauche des Medicamentes gegeben werden. Wird dieses erbrochen, so ist eine zweite, jedenfalls bereit zu haltende Dose desselben zu nehmen.

1466. Rp. *Cort. rad. Pun. Gran.*  
 50'0—100'0,

*Natri bicarb.* 5'0,  
*Macera per horas 24 in*  
*Aquae destill.* 400'0,  
*Coque ad reman.* 200'0,  
*Extr. Fil. mar. aeth.* 5'0  
*Syr. cort. aur.* 20'0.

*S. Auf 3mal zu nehmen*  
*in dem Zeitraume von 1 bis*  
 *$1\frac{1}{2}$  Stunde.*

1467. Rp. *Cort. Punic. Gran.*  
 50'0,

*Natri bicarbon.* 5'0,  
*Macera per horas 24 in*  
*Aquae destill.* 400'0,  
*Coque ad reman.* 200'0,  
*Syr. mann.* 20'0.  
*S.  $\frac{1}{2}$ stündl. je  $\frac{1}{3}$  z. neh.*

Die Granatwurzeldecocte empfiehlt man zur Vermeidung des widerlichen Geschmacksetc., durch eine in den Oesophagus eingeführte Schlundröhre (oder

Gummischlauch) auf einmal einzugliessen, nachdem Pat. einen Tag gefastet und den Darm entleert hat.

1468. Rp. *Pulv. flor. Kusso.* 25'0,  
*Mellis despumat.* q. s.,  
*u. f. Electuarium.*

*S. Je eine Hälfte im*  
*Zwischenraume von einer*  
*Stunde zu nehmen.*

1469. Rp. *Extr. pun. Gran.* 20'0,  
*Extr. Fil. mar. aeth.* 10'0,  
*Div. in dos. aequal. Nr. 30,*  
*D. ad capsul. gelatinosas.*  
*S. Jede  $\frac{1}{4}$  Stunde je 4 St.*  
*zu nehmen.*

1470. Rp. *Pulv. Kamalae* 20'0,  
*Extr. Fil. mar. aeth.* 5'0,  
*Div. in dos. = Nr. 30,*  
*D. ad capsul. gelatinosas.*  
*S. Je 4 Kaps.  $\frac{1}{4}$ st. zu neh.*

1471. Rp. *Pulv. Kamalae* 20'0,  
*Div. in dos. = 5.*  
*S. Jede  $\frac{1}{4}$  Stunde 1 Pulv.*

1472. Rp. Extr. fil. mar. aeth.  
5'0—10'0.

Aq. Menthae 15'0,

Ol. Ricin. 30'0,

Sacch. alb. 20'0.

F. Emulsio.

S. Morgens und Mittags  
je die Hälfte.

1473. Rp. Extr. filic. mar. aeth.  
30'0,

Div. in dos. aeqn. Nr. 30.

Exhibe in caps. gelat.

S. Je 4 St.  $\frac{1}{4}$  stündl.

1474. Rp. Extr. fl. Brayer. 10'0,

Pulv. flor. Kusso q. s.

u. f. pil. Nr. 50.

S. Jede  $\frac{1}{4}$  Stund. 4 Pillen.

1475. Rp. Extr. filic. mar. aeth.

Pulv. filicis mar. aa. 2'0,

Conserv. rosar. q. s.

u. f. pil. Nr. 15.

S. Jede Stunde 3—4 Pill.

1476. Rp. Extr. filic. aeth. 10'0,

Syr. spin. cerv. 30'0,

Ol. Menth. pip. gtts 10.

S. Nüchtern auf 1mal und

sofort schwarz. Kaffee z. n.

Bei Kindern:

1477. Rp. Extr. fil. mar. aeth.  
rec. par. 5'0,

S.  $\frac{1}{2}$  stündl. auf 2—3mal  
zu nehmen. (Das Medica-

ment auf dem Kaffeelöffel  
mit Zucker zu bestreuen  
und einige Tropfen Citro-  
nensaft hinzuzufügen.)

1478. Rp. Pelletierin. sulf. 0'30,

Tannini pur. 0'50,

Aqua dest. 30'0.

S. Bandwurmmittel.

1479. Rp. Extr. Pun. Gran. 2'0,

Syr. Menthae pip. 10'0,

Mellis despum. q. s.

u. f. Electuarium.

S. Je  $\frac{1}{2}$  früh, Mittags  
und Abends zu nehmen.

1480. Rp. Pale. flor. et fol.

Brayerae 30'0,

Mellis desp. q. s.

u. f. Electuarium.

S. Je  $\frac{1}{2}$  Früh, Mittags  
und Abends zu nehmen.

1481. Rp. Extr. Filic. mar.  
aeth. 1'0,

Mellis desp. q. s.

u. f. l. a. Electuar.

S. Je  $\frac{1}{2}$  Früh, Mittags  
und Abends zu nehmen.

• Auch die anderen oben an-  
geführten Medicamente in  
etwas kleinerer Dosis eigen-  
nen sich bei Kindern.

Auch die Cocosnuss soll als  
Taenifugum wirken.

**Tetanus, Starrkrampf.** Möglichste Ruhe in der Um-  
gebung des Kranken. Gleichmässige Temperatur, zu-  
meist eine kühlere erwünscht; Narcotica gegen die  
Schmerzen, am besten subcutan; Chloroform-Inhala-  
tionen; auch Chloroform Zerstäubung neben dem inner-  
lichen Gebrauch von Chloralhydrat und Morfium (con-  
stanter leichter Schlummer); möglichste Schonung von  
Wunden bei deren Pflege. Bei Trismus Narcose und  
während derselben künstliche Ernährung. In neuerer  
Zeit auch Pilocarpin mit Erfolg angewandt. Heisswasser-  
Compressen (50 bis 55° C.) auf's Hinterhaupt und längs  
der Wirbelsäule; bei Manchen Kaltwasser-Compressen  
(Leiters Kühlapparat).

1482. Rp. Chloral. hydr. 2'0,

Aquae dest.

Muc. gumm. arab. aa.

50'0.

S. Zum Clystier.

1483. Rp. Chlorali hydr. 5'0,

Aquae destill. 100'0,

Syr. cort. aur. 20'0.

S. Jede  $\frac{1}{4}$  Stunde 1 Ess-  
löffel.



1484. Rp. Inf. fol. Nicotian.  
e 1°0 ad 100°0.

S. Zum Clyasma.

1485. Rp. Curare 0°05,

Glycerini 5°0.

S. Je  $\frac{1}{2}$  Spritze subcut.  
in mehrstündigen Pausen  
(Maximum 2 Spritzen!!)

Auch subcutane Injection  
von Calabarextract  
1—2 Spritzen 0°20 : Aq. 10°0  
zu versuchen.

Empfohlen wird ferner  
Sol. Fowleri, auch Tinct.  
Moschi tropfenweise.

**Tic douloureux** vide: Neuralgia trigemini.

**Tonsillitis** vide: Angina.

**Trachom** vide: Conjunctivitis blennorrh. chron.

**Trichinen.** Sind die Trichinen noch im Magen oder Darne, Ausspülung des Magens oder Abführmittel; später Behandlung symptomatisch: milde Laxantien (Ol. Ricini, Calomel). In schweren Fällen, besonders bei remittirendem Fieber und gestörter Nachtruhe nach vorausgegangenem warmen Bade Morium des Abends. Möglichste absolute Ruhe bei Tag und Nacht. Antipyretisch auch Salicylsäure. Prophylactisch Vermeidung von rohem Schweinefleisch.

1486. Rp. Pulv. rad. Jalapae,

Pulv. Filic. maris aa. 2°0,

M. f. Pulv.

Dentur. tales dos. = 5.

S. Jede 3. St. 1 Pulver.

1487. Rp. Acid. salicyl. 0°50,

Sacch. alb. 3°0.

M. f. P. div. in dos. = 10.

S. Abds. jede  $\frac{1}{2}$  St. 1 Pte.

1488. Rp. Magnes. ust. 5°0,

Aquae amygd. 3°0,

Aquae destill. 100°0,

Syr. simpl. 10°0.

S. 1—3ständl. 1 Esslöffel.

Gegen Muskelschmerzen

kalte Waschungen, Einrei-

bungen mit Chloroform.

Eisbeuteln.

1489. Rp. Morf. mur. 0°05,

Sacch. alb. 2°0,

M. f. Pulv. div. in dos. = 5.

S. Abends 1 Pulver.

Bei hochgradigem Fieber  
auch Chinin, Digitalis u. dgl.

Zu versuchen durch 2—3  
Tage:

1490. Rp. Extr. Secal. corn. 2°0,

Aquae destill. 200°0°0,

Syr. cort. Aur. 20°0.

S. Stündlich 1 Esslöffel.

1491. Rp. Benzini 10°0,

Muc. g. arab.

Aquae Menth. aa. 30°0,

Aquae dest. 200°0.

S. 2ständl. 1 Esslöffel.

**Tuberculosis pulmonum et laryngis, Tuberculose**

der Lungen und des Kehlkopfes. Aufenthalt in gesunder Luft, im Winter in einem südlichen Klima, im Sommer in einer Gebirgsgegend, überhaupt Sorge für stets frische Luft. Gute Nahrung, womöglich Leberthran, Selters, Giesshübler, Krondorfer, Biliner, Radeiner, Emser Wasser mit Milch. Mittel gegen den Hustenreiz, Im späteren Stadium Behandlung symptomatisch (Eisen, Chinin etc.). — Gasförmige Rectal-Injection. — Molkencur, Traubencur.



Beituberculösen Geschwüren im Kehlkopfe, die als solche durch exacte Untersuchung der Lunge constatirt sind, absolut keine Aetzung. Hustenreiz und Schlingbeschwerden, selbst Athembeschwerden mässigen Grades hier durch Einblasungen von Morfium, besser durch Bepinselung mit Cocain, mit Hilfe des Kehlkopfspiegels erfolgreich zu bekämpfen. Bei milderer Erscheinungen Einblasung von Alaun, Tannin etc. Symptomatische Behandlung des Grundeidens. Bei zunehmender, von einer Stenose des Kehlkopfes herrührender Athemnoth Tracheotomie.

Bei Kindern: Ammenmilch, später passende Nahrung, wenig Amylacea.

1492. Rp. Antipyrini 5'0.

Die. in dos. = 5.

S. Stündlich 1 Pulver.

1493. Rp. Chinin sulfur. 1'0,

Sacch. alb. 5'0,

M. f. P. die. in dos. = 10.

S. Fröh, Mittags u. Abends  
1 Pulv.

1494. Rp. Chinin. sulfur. 1'0

Morf. mur. 0'05,

Natr. bicarb.,

Sacch. alb. aa. 2'0,

M. f. P. die. in dos. = 10.

S. Fröh, Mittags und  
Abends 1 Pulver.

1495. Rp. Chinini sulf. 2'0,

Pulv. Digitalis 0'10,

Pulv. rad. Ipecac.,

Landan. pur. aa. 0'5,

Ext. Liquir. q. s.,

n. f. pil. Nr. 50.

S. Fröh, Mittags und  
Abends 1 Pulver (bei Fieber mit abendlichen Exacerbationen).

1496. Rp. Inf. Herbae Digital.

e 0'50 ad 150'0,

Plumbi acet. 0'50,

Tinct. Opii simpl. gtts 15,

Syr. Altheae 15'0.

S. Stündlich 1 Esslöffel.

Gegen den Hustenreiz:

1497. Rp. Extr. cann. Ind. 0'50,

Sacch. alb. 5'0,

M. f. P. die. in dos. = 10.

S. Fröh u. Abds. 1 Pulv.

1498. Rp. Extr. Hyosc. 0'50,

Sacch. alb. 5'0,

M. f. P. die. in dos. = 15.

S. Fr., Mitt. u. Ab. 1 Pulv.

1499. Rp. Aq. Laurac. 10'0,

Morf. mur. 0'10.

S. 10 Tropf. 3mal tägl.

1500. Rp. Paraldehyd. 2'0-4'0.

Mixt. gumm. 60'0,

Syr. cort. aur. 30'0.

S. Auf 1mal zu nehmen  
(Schlafmittel).

Bei Anaemischen und  
Chlorotischen:

1501. Rp. Ferr. sulf. cryst.,

Kal. carbon. aa. 1'50,

Gum. resinae Myrrh. 5'0,

Aq. Ment. crisp. 200'0,

Syr. Menthae 15'0.

S. Fr., Mitt. u. Ab. 1 Esslöffel.

1502. Rp. Extr. Ferr. pom. 5'0,

Pulv. trifol. fibr. 1'0,

Extr. Tarax. q. s.

n. f. pil. Nr. 50.

S. Fr. u. Ab. je 2 Pillen.

1503. Rp. Syr. Ferr. jod. 10'0,

Syr. cort. aur. 20'0.

S. Fr. u. Ab. 1 Kaffeelöffel.

1504. Rp. Acetoni 2'0,

Aquae dest. 150'0,

Muc. g. arab.

Syr. simpl. aa. 15'0.

S. 2-3 stündl. 1 Essl.

1505. Rp. Ol. Jecor. Asell.

100'0.

S. Fr. u. Ab. 1 Esslöffel.

Statt des Leberthraus  
empfiehlt man Glycerin.

1506. Rp. *Glycerin*. 40'0,

*Rum* 10'0,

*Ol. Menthae* gtt. 1.

*S.* In 1 Tag zu verbrauch.

Bei nächtlichen

Schweissen 1507—1515.

1507. Rp. *Elix. acid.* Hall. 2'0,

*Syr. rub.* Id. 20'0.

*S.* 1 Esslöff. in 1 Glas Wasser.

1508. Rp. *Acid. salicyl.* 3'0,

*Amyli pur.* 10'0,

*Talci* 87'0.

*S.* Streupulver.

1509. Rp. *Agaric. alb.* 0'50,

*Pulv. Dower.* 0'30,

*Sacch. alb.* 3'0.

*M. f. P. Div.* in dos. = 5.

*S.* 1 Pulver vor dem Schlafengehen.

1510. Rp. *Atropini sulf.* 0'05,

*Aquae destill.* 20'0.

*S.* 10—20 Tropf. vor Eintritt d. Schweißsecretion z. n.

1511. Rp. *Atropini sulf.* 0'02,

*Pulv. et Extr. Ligu. q. s.*

*n. f. pil.* Nr. 20.

*S.* Des Abends je 1 Pille, (eventuell 2—3 Pillen je 2 Stunden).

1512. Rp. *Homatropin. hydro-*

*brom.* 0'30,

*Aquae dest.* 10'0,

*S.* Subcutan ( $\frac{1}{2}$ —1 Spr.).

1513. Rp. *Hyoscini* 0'01.

*Aq. dest.* 10'0.

*S.*  $\frac{1}{2}$  Spritze subcut.

1514. Rp. *Hyosc. hydrojod.* 0'01,

*Argill. q. s.*

*F. pil.* Nr. 20.

*S.* Abends 1 Pille.

1515. Rp. *Agaricin.* 0'10,

*Pulv. Dower.* 2'0,

*Rad. Althaeae,*

*Mucilag. aa.* 1'0,

*M. f. pil.* Nr. 20,

*S.* 1—2 Pillen zu nehm.

1516. Rp. *Cocain. mur.* 0'2—0'5,

*Glycerini,*

*Aquae dest. aa.* 5'0,

*Morf. mur.* 0'20.

*S.* Zum Bepinseln.

1517. Rp. *Cocaini mur.*

0'20—0'50,

*Plumb. ac. aa.* 2'0,

*Sacch. alb.* 8'0.

*S.* Zu Insufflationen.

1518. Rp. *Coc. mur.* 0'20—0'5,

*Bism. subnitr.,*

*Sacch. alb. aa.* 5'0.

*M. f. Pulv.*

*S.* Zur Insufflation.

1519. Rp. *Cocaini mur.* 0'30,

*Ac. carbol.* 0'05,

*Aq. dest.* 2'0.

*S.* Zu submucöser Inject.

1520. Rp. *Inf. Phellandr. aq.*

*e* 2'0 ad 150'0,

*Syr. simpl.* 20'0.

*S.* Zu Inhalationen.

1521. Rp. *Aq. Picis.* 20'0.

*S.* Zu Inhalationen.

Auch Inhalation warmer Dämpfe empfehlenswerth, bei Haemoptoe zu meiden.

1522. Rp. *Acidi carbol.* 0'10,

*Aquae destill.* 10'0.

*S.* Zu subcut. Injection.

1523. Rp. *Creosoti* 1'50,

*Tinct. Gentian.* 5'0,

*Spir. vin. rectificat.* 25'0,

*Vini Xerens. q. s.*

*ad col.* 100'0.

*S.* Tägl. 2—3 Esslöffel in

1 Glas Wasser zu nehmen.

1524. Rp. *Jodoformi* 0'10,

*Pulv. Lycopod.* 0'40,

*Extr. sem. Phellandr.* 1'0,

*M. f. pil.* 10.

*S.* Tägl. 3—5 St.

Bei Diarrhoe:

1525. Rp. *Laudan. pur.* 0'20,

*Tannini pur.* 1'0,

*Pulv. rad. Colomb.* 2'0.

*M. f. P. div.* in dos. = 10.

*S.* 4stündlich 1 Pulver.

1526. Rp. *Dect. rad. Colombo*

*e* 10'0 ad 200'0.

*Mucilag. Salep* 10'0,

*Extr. op. aq.* 0'10,

*Syr. cort. aur.* 20'0.

*S.* Jede 2. St. 1 Esslöffel.

**Tumor albus.** Möglichste Ruhe des Gelenkes; womöglich starrer Verband (Gyps oder Wasserglas, blaue Organtinde), kalte Compressen im Beginne, locale Anwendung resorbirender Mittel, bei jungen Individuen Landaufenthalt, Gebirgsluft, kräftige Kost, Leberthran, Haller Jodwasser, Jodsalzbäder; bei Anaemischen Eisen. Bei älteren Individuen (nach der Pubertät) rechtzeitig Operation. Bei Localtuberculose Kalkbehandlung durch subcutane Injection an verschiedenen Stellen des Fungus bis derselbe von der Lösung durchtränkt erscheint; darüber antisept. Verband. Nach 5–6 Tagen Kleisterverband. Bei aufgebrochenem verkäsenden Fungus zuvor instrum. Erweiterung, sodann Tamponade mit Kalkgaze.

1529. Rp. Calc. phosph. neutr.  
5'0,

Aq. dest. 50'0,  
Ac. phosph. q. s. ad sol. perf.;  
adde:

Ac. phosph. dil. 0'6,  
Aq. dest. q. s. ad 100'0,  
S. Zu subcut. Inject.

1530. Rp. Kal. jodat. 1'0,  
Jodi pur. 0'10,  
Glycerin. 20'0.  
S. Zum Bepinseln.

1531. Rp. Calc. phosph. neutr.  
50'0,

Aq. dest. 500'0,  
Acid. phosph. q. s. a.  
sol. perf.

Ac. phosph. dil. 60'0,  
Aq. dest. q. s. ad 1000'0  
S. Zur Imprägnirung von  
Kalkgaze.

1532. Rp. Tinct. Jodinae,  
Tinct. Gallar. aa. 10'0.  
S. Zum Bepinseln.

**Tussis convulsiva, Pertussis, Keuchhusten.** Im Beginne die gegen Husten gerichteten Mittel gewöhnlich ausreichend. Im entgegengesetzten Falle Bromkali oder Morphin etc. Aufenthalt in frischer Luft, am besten Luftveränderung. Gesunde Kinder streng zu isoliren und vor Erkältungen zu schützen. Während des Anfalles die Kinder zu unterstützen, und bei der Herausbeförderung des Schleimes behilflich sein; gleichmässige warme Zimmertemperatur; später robor. Diät: Chinin, Eisen, Wein, Fleischkost. Nase zu untersuchen!

1533. Rp. Pulv. r. Bellad. 0'10,  
Sacch. alb. 5'0,

M. f. P. div. in dos. = 10.  
S. Fr., Mitt. u. Ab. 1 Pulver.

1534. Rp. Tct. Bellad. gtts 5,  
Aquae destill. 50'0,  
Syr. rub. Iduci 10'0.  
S. Alle 3 St. je 1 Kasseel.

1535. Rp. Extr. Belladonn.,  
Zinc. oxydat. aa. 0'20,  
Sacch. alb. 3'0,  
M. f. P. div. in dos. = 10.

S. Fr., Mitt. u. Ab. 1 Pulv.

1536. Rp. Tinct. Bellad. 5'0.  
S. Alle 3 St. 2–3 Tropf.

Belladonnapräparate im Stadium convulsivum anzuwenden; bei starker Erweiterung d. Pupillen zu sistir.

Im Stad. blennorrhoeicum Einathmung von Dämpfen des Latschenkieferöls, durch 1 Stunde 5–10 Tropfen verdunstet.

1537. Rp. Aq. piccae,  
Aq. dest. aa. 50'0.

S. Zu Inhalationen.

(3–4mal je 2–5 Minut.  
auch prophylactisch bei  
den Geschwistern.)

1536. Rp. *Chinini muriat.* 0'10,  
*Natr. bic.* 0'15,  
*Pule. Gumm. arab.* 3'0,  
*M. f. P. Div. in dos. = 10.*  
*S. Früh u. Abds. 1 Pulv.*

Besser *Chin. tannicum*,  
 n. z. 2mal so viel Decigr.,  
 als das Kind Jahre alt ist.

1537. Rp. *Chinini tann.*,  
*Sodae bicarb.*,  
*Sacch. albi an.* 1'0,  
*M. f. P. Div. in dos. = 10.*  
*S. 2ständl. 1 Pulver.*

1538. Rp. *Antipyrini* 1'0,  
*Vini Tokayens.*,  
*Aq. dest. aa.* 25'0,  
*Syr. cort. aur.* 50'0.  
*S. 2ständl. 1 Esslöffel.*

1539. Rp. *Extr. cann. Ind.* 0'20,  
*Pule. rad. Ipecac.* 0'10,  
*Sacch. alb.* 5'0,  
*M. f. P. div. in dos. = 10.*  
*S. Fr., Mitt. u. Ab. 1 Pulv.*

1540. Rp. *Kal. bromat.* 1'0,  
*Aquae destill.* 100'0,  
*Syr. rub. Id.* 15'0.  
*S. Ständl. 1 Kinderlöffel.*

1541. Rp. *Tinct. Eucalypt.*  
*glob.* 3'0,  
*Glycerin*,  
*Syr. simpl. aa.* 15'0,  
*Aquae dest.* 100'0.  
*S. 3ständl. 1 Kinderlöff.*

**Tyloma, Schwielen, Clavus, Hühneraugen.** Abtragen  
 der harten Epidermis und Ausschneiden des Hühner-  
 auges mit darauffolgender Anwendung von Pflaster-  
 streifen oder Salben. Bei papillomartigen Formen Pac-  
 quelin. — Wollringe empfehlenswerth.

1547. Rp. *Merc. praec. alb.* 2'0,  
*Ung. emollient.* 20'0.  
*S. Salbe. (m. Guttapercha-*  
*papier u. dgl. bedeckt).*

1548. Rp. *Merc. praecip. alb.*,  
*Oxyd. Zinci aa.* 2'0,  
*Ung. simpl.* 20'0.  
*S. Salbe.*

1549. Rp. *Ung. Diachyl.* 20'0.  
*S. Salbe.*

1550. Rp. *Acid. nitr. conc.* 10'0.  
*S. Mit Glasstab. aufzutr.*

1542. Rp. *Chlorali hydrat.* 1'0,  
*Aquae destill.* 100'0,  
*Syr. simpl.* 20'0.

*S. 2ständl. 1 Kaffeelöffel.*  
 Auch *Pilocarpinum mar.*  
 subcutan empfohlen.

1543. Rp. *Extr. Castaneae vesc.*  
*Syr. mannat. aa.* 10'0.  
*S. Tägl. 3—4 Kaffeel.*

1544. Rp. *Chlorali Crotonis*  
 0'25 bis 0'50,  
*Aquae destill.* 80'0,  
*Syr. rub. Id.* 20'0.

*S. Jede 2. St. 1 Kindertl.*  
 Inhalation von 1—2% Car-  
 bolsäure direct oder durch  
 Aufhängen von in Carbol-  
 säure getauchten Tüchern  
 um das Bettchen d. Kindes.

1545. Rp. *Thymoli* 10'0,  
*Spir. vin.* 250'0,  
*Aquae font.* 750'0.

*S. Nach Bericht (zu er-  
 hitzen und die Dämpfe  
 hievon einzuathmen).*

1546. Rp. *Chinini hydrochl.*  
 0'01 bis 0'015,  
*Natr. bicarb.* 0'015,

*Gumm. arab.* 0'25.  
*S. Zu Insufflationen.*

*Chin.*, sowie *Pulv. res. Benz.*  
 durch die Nase zu insperg.  
*Conium hydro-*  
*brom.* 0'001 p. dos.

1551. Rp. *Empl. Hydrarg.*,  
*Empl. sapon. aa.* 5'0,  
*Tend. supr. lint.*

*S. Pflaster.* (Täglich  
 frisch aufzulegen, bis die  
 erweichte Epidermis sich  
 abtragen lässt.)

1552. Rp. *Ac. salicyl.* 5'0,  
*Collodii* 50'0,  
*Extr. cann. Ind.* 1'0.  
*S. Mittels Pinsels aufzu-  
 tragen.*



**Typhus.** Bekämpfung der gefährlichen Symptome, besonders des Fiebers; Wärmeentziehung durch directe Abkühlung des Körpers, durch verschiedene medicamentöse und diätetische Verordnungen. Gute Ventilation des Krankenzimmers. Bei einer Temperatur von 39.5 Kaltwassereur (Bäder, Uebergießungen, Einwickelungen). Kalte Abwaschungen, Umschläge, kalte Essigwaschungen; Darreichen kalten Getränkes. Rücksicht auf die verschiedenen Complicationen (Meteorismus, Obstipation, Diarrhoe etc). Bei intensivem Fieber:

1553. Rp. Chinini sulf. 15-30,  
Sacch. alb. 10,  
M. f. Pulv. div. in dos. = 5.  
S. Alle 10 Minut. 1 Pulv.  
zu nehmen.

1554. Rp. Chinini sulfur. 10,  
Acidi sulf. dil. gttis 10,  
Aqua destill. 1500,  
Liq. Ammonii anis. 20.  
S. Stündlich 1 Esslöffel.

1555. Rp. Natr. salicyl. 50,  
Natr. carb. 10,  
Aqua destill. 2000,  
Syr. cort. aur. 200.  
S. 2stündlich 1 Esslöffel.

1556. Rp. Natr. salicyl. 4-60,  
Dic. in dos. = 3.  
S. In den Abendstunden  
rasch hinter einander zu  
nehmen.

1557. Rp. Antifebrin. 0.25 bis  
0.50,  
Sacch. alb. 0.50.  
M. f. Pulv. Dent. tals.  
dos. = 5.  
S. Tagsüber zu verbrauch.

1558. Rp. Acid. salicyl. 30,  
Ol. amygdal. 300,  
Gumm. arab. 150,  
Aqua dest. 1200,  
Syr. Menth. pip. 200.  
S. Stündlich 1-3 Essl.

1559. Rp. Antipyrin. mar. 50,  
Dic. in dos = 5,  
D. ad. capsul. amyl.  
S. Stündlich 1 Stück.

1560. Rp. Chinini sulf.,  
Tannini pur. aa. 0.50,  
Laudani pur 0.10,  
Sacch. alb. 20,  
M. f. Pulv. div. in dos. = 5.  
S. Jede 2. St. 1 Pulver.

1561. Rp. Chinini sulf. 0.50,  
Pulv. Doveri 10,  
Sacch. alb. 20,  
M. f. Pulv. div. in dos. = 5.  
S. Jede 2. St. 1 Pulver.

Bei vorwaltender Diarrhoe:

1562. Rp. Dect. r. Salep 2000,  
Tinct. Laud. simpl. gttis 5,  
Syr. rub. Idaci 200.  
S. Zum Getränk (event.  
stündlich 1 Esslöffel voll).

1563. Rp. Mixt. gumm. 2000,  
Extr. Laudan. aq. 0.10.  
S. Stündlich 1 Esslöffel.

1564. Rp. Dect. r. Salep 2000,  
Tinct. Laudan. spl. 20,  
S. Zum Clysm.

Bei blutigen Diarrhoen:  
1565. Rp. Alumin. crud. 0.50,  
Laudan. pur. 0.10,  
Camphor. ras. 0.30,  
Sacch. alb. 20,  
M. f. Pulv. div. in dos. = 5.  
S. Jede 2. St. 1 Pulver.

1566. Rp. Plumbi acet.,  
Laudani pur. aa. 0.30,  
Amyli pur. 50,  
M. f. P. div. in dos. = 10.  
S. Jede 2. St. 1 Pulver.

1567. Rp. Ferr. sesq. sol. 10,  
Aqua d. cinnam. 1500,  
Syrup. cinnamom. 200.  
S. Stündlich 1 Esslöffel.  
Bei zunehmender Schwäch



(Collapse) Aether subcut. inj.,  
Champagner, Wein esslöffel-  
weise, Fleischbrühe.

1568. Rp. *Camphorae tritaet* 0,  
*Muc. gumm. ar.* 20'0,  
*Aq. dest.* 200'0.  
S. Auf 3 Clystiere.

1569. Rp. *Liqu. corn. cerv.*  
succ. glts 10,  
*Muc. Gumm. arab.*,  
*Aquae destill. aa.* 100'0,  
*Syr. rub. Idaei* 20'0.  
S. 2stündlich 1 Esslöffel.

1570. Rp. *Inf. flor. Arnica*  
e 10'0 ad 200'0,  
*Syr. cort. aur.* 20'0,  
S. 2stündlich 1 Esslöffel.

1571. Rp. *Moschi* 0'50,  
*Sacch. alb.* 2'0,  
*M. f. P. div. in dos.* = 5.  
S. 3stündl. 1 Pulver.

Bei Kindern eignen sich zur  
Herabsetzung des Fieber-  
anfalles kalte Bäder 18 bis  
20° R., ferner Natr. salicyl.  
0'5—1'0, event. mit Chinin  
tann. combinirt.

### Ulcera, Geschwüre (*ulcera cruris*, Fussgeschwüre).

Bei starker Röthung und Schwellung Umschläge mit  
kaltem Wasser oder Bleiwasser, Application von Salben;  
Jodoformverband; bei stark granulirenden Geschwürs-  
flächen Canterisation mit Lapis oder Paquelin, Bepin-  
selung mit Kali caust. Auskratzen mit dem scharfen  
Löffel; bei reinen Geschwüren Einwickelung mit Heft-  
pflasterstreifen (nach Baynton) oder Flanellbinden  
oder Gummibinden des Tags, Nachts feuchtwarme Um-  
schläge. Transplantation von Hautstückchen.

1572. Rp. *Plumb. ac. b. sol.* 20'0,  
*Aquae dest. simpl.* 200'0.  
S. Zu Umschlägen.

1573. Rp. *Alum. crud. p.* 10'0,  
*Plumb. acet. bas. sol.* 20'0,  
*Aquae destill.* 200'0.  
S. Zu Umschlägen.

1574. Rp. *Cerae alb.*,  
*Ol. olivur. aa.* 20'0,  
*M. f. cerat.*  
S. Auf Leinwand zu  
streichen.

1575. Rp. *Oxyd. Zinci* 5'0,  
*Vaselini*,  
*Lanolini aa.* 15'0.  
S. Salbe.

1576. Rp. *Kal. caust.* 0'50,  
*Aquae destill.* 200'0.  
S. Verband.

1577. Rp. *Camph. subact.* 5'0,  
*Muc. Gumm. arab.*,  
*Aquae destill. aa.* 50'0.  
S. Verbandmittel.

1578. Rp. *M. praec. rubr.* 0'20,  
*Vaselini* 20'0.  
S. Salbe.

Bei gangränösen Geschwür-  
ren desinficirendes Wund-  
wasser u. Gypstheerpulver:

1579. Rp. *Calcar. chlor.* 5'0,  
*Aquae destill.* 200'0.  
S. Wundwasser.

1580. Rp. *Kal. hypermy.* 2'0,  
*Aquae destill.* 200'0.  
S. Wundwasser.

1581. Rp. *Acid. salicyl.* 5'0,  
*Natr. carb.* 1'0,  
*Aquae destill.* 200'0.  
S. Wundwasser.

1582. Rp. *Calcar. sulf.* 50'0,  
*Picis liquid.* 10'0,  
*M. exactiss. f. P.*  
S. Streupulver (Gyp-  
stheerpulver).

1583. Rp. *Magist. Bism. pulv.* 30°0.

*S. Streupulver.* (Nach Reinigung der Wunde zu appliciren und durch eine Binde zu befestigen.)

1584. Rp. *Acid. pyrolign.* 2°0.  
*Aquae destill.* 200°0.

*S. Wundwasser.*

Bei huetischen Geschwüren entsprechende locale Behandlung u. Jodkali innerl.

**Ulcera laryngis.** Berücksichtigung des ursächlichen Leidens, ob Syphilis, ob Tuberculose, und Behandlung dieser. Local: Inhalationen oder Inspersionen und Bepinselungen. Bei tuberculösen Geschwüren, allenfalls auch bei typhösen, Meidung jedweden energischen Aetzens. Hier hat man sich auf Einblasung oder Inhalation von Alaun, Tannin etc. zu beschränken. Inspersionen von Jodoformpulver 3—4mal täglich allein oder nach Inhalation von Carbollösung sollen sehr erfolgreich sein.

1585. Rp. *Kali chloric.* 10°0.  
*Aquae destill.* 200°0.

*S. Zur Inhalation.*

1586. Rp. *Alum. crud. p.* 20°0.  
*Aquae destill.* 200°0.

*S. Zur Inhalation.*

1587. Rp. *Tannini pur.*  
*Sacch. alb. aa.* 5°0.

*S. Zum Einblasen.*

1588. Rp. *Morf. mur.* 0°20.  
*Pulv. gummos.* 10°0.

*S. Zum Einblasen.*

1589. Rp. *Arg. nitr. cr.* 0°50.  
*Aquae destill.* 10°00.

*S. Zum Bepinseln.*

Bei constatirter Syphilis: Allgemeinbehandl. neben der energischsten Localbehandlung etc.

1590. Rp. *Kal. jodat.* 1°0.  
*Jodi pur.* 0°10.

*Glycerin.* 20°0.

*S. Zum Bepinseln.*

1591. Rp. *M. subl. corr.* 0°10.  
*Spir. vini conc.* 20°0.

*Aquae destill.* 200°0.

*S. Zur Inhalation (bei Syphilis).*

**Ulcus contagiosum, weicher Schanker.** Vorgängige Reinigung der Geschwüre und deren Umgebung mit einfachem Wasser, dem eventuell ein schwach desinficirend wirkendes Medicament beigegeben ist. Nach vorsichtig geübter Abtrocknung Bepinselung mit Kupfersolution oder Aetzung mit dem Lapisstifte. Bei vermehrter Entzündung in der Umgebung (Oedeme, Infiltration etc.) kalte Umschläge.

1592. Rp. *Cupri sulfur.* 1°0.  
*Aquae destill.* 10°0.

*S. Zum Bepinseln (2mal täglich).*

1593. Rp. *Jodol.* 3°0.  
*Spir. vin.* 35°0.

*Glycerini* 65°0.

*S. Zum Bepinseln.*

1594. Rp. *Jodol.* 5°0.  
*Sacch. alb.* 10°0.

*M. J. P. S. Streupulver.*

1595. Rp. *Tinct. Jodinae* 5.0.  
*Jodi pur.* 0.05.

*S. Zum Bepinseln.*

1596. Rp. *Jodoformi pur.* 5°0.  
*S. Zum Bestreuen.*

1597. Rp. *Acid. salicyl. p.* 5°0.  
*S. Streupulver.* (Auf das desinficirte Geschwür 1-

bis 2mal tägl. zu applic.)  
Bei rein eiternden Wund-  
flächen:

1598. Rp. Sulf. Cupri 0'50,  
Aqua destill. 50'0.  
S. Verbandwasser.

1599. Rp. Kali chloric. 1'0,  
Aqua destill. 100'0.  
S. Aeusserlich.

1600. Rp. Kal. jodat. 1'0,  
Jodi pur. 0'10,  
Aqua destill. 50'0.  
S. Aeusserlich.

1601. Rp. Acid. carbol. 1'0,  
Aqua destill. 100'0.  
S. Verbandwasser.

1602. Rp. Kali caust. 0'10,  
Aqua destill. 50'0.  
S. Aeusserlich.

1603. Rp. Camph. subact. 0'10,  
Muc. Gummi, arab.,  
Aqua destill. aa. 25'0.  
S. Aeusserlich.

Statt der Verbandwässer  
auch Salben verwendbar:

1604. Rp. Cupr. sulf. 0'50,  
Vaselini 20'0.  
S. Salbe.

1605. Rp. M. praec. rubr. 0'50,  
Ung. emoll. 20'0.  
S. Salbe.

1606. Rp. Acidi carbol. 1'0,  
Olei olivar. 10'0,  
Cretae alb. q. s.,  
u. f. pasta mollis.  
S. Pasta (auf Stauniole  
etc. aufgestrichen).

1607. Rp. Jodoformi pur. 2'0,  
Ol. Menthae pip. gtts 2.  
Ung. emoll. 10'0.  
S. Salbe.

1608. Rp. Emplastr. sapon.,  
Empl. cerussae aa. 10'0.  
S. Pflaster.

Bei gangränösen (phagedä-  
nischen) Geschwüren:

1609. Rp. Calcar. chlor. 2'0,  
Aqua destill. 200'0.  
S. Aeusserlich.

1610. Rp. Gypsi pur. 50'0,  
Picis liquidae 5'0.  
M. f. P. S. Streupulver.

### Ulcus corneae. Hornhautgeschwür, Hornhautabscess,

Ausspülen des Conjunctivalsackes mit Borsäure etc. Bestreuung mit Jodoform, Schutzverband, Cantherisation der infiltrirten Corneapartie mit Paquelin oder Galvano-caustik, eventuell bes. bei Hypopyon Spaltung der Cornea, Paracentesis. Bei starken Schmerzen od. torpiden Geschwüren feuchtwarme Umschläge mit Wasser oder Kamillentheee. Lineare Cantherisation der Uebergangsfalte mit Lapis.

611. Rp. Acid. boracici 3'0,  
Aqua dest. 100'0.  
S. Zur Ausspülung des  
Conjunctivalsackes.

1612. Rp. Acid. borac. 1'0,  
Acid. salicyl. 2'0,  
Aqua dest. 100'0.  
S. Wie vorher.

1613. Rp. Aqua chlori,  
Aqua dest. aa. 50'0.  
S. Wie vorher.

1614. Rp. Jodoform pulv. 5'0  
S. Streupulver.

1615. Rp. Atropin sulf. 0'05,  
Aqua dest. 10'0  
S. Augentropfen.

Bei peripher sitzenden,  
tiefen Geschwüren, ebenso  
bei ausgedehnten Ge-  
schwüren, bei Erweichung  
bei peripherem Prolapsus  
iris Meidung v. Atropin,  
dagegen:

1616. Rp. Eserini sulf. 0'05.  
Aqua dest. 10'0.  
S. Augentropfen.

**Ulcus ventriculi, rundes Magengeschwür.** Symptomatische Behandlung der Magenblutungen (vide: Haematemesis), dabei ist jedwede Nahrung zu verbieten. Nach Sistirung der Magenblutungen Milch in kleinen, häufig zu wiederholenden Quantitäten, welche successive zu steigern sind. Wird Milch nicht vertragen, verordne man Leube-Rosenthal's Fleisch-Solution oder frisches Fleischextract, eventuell Peptonclystiere. Narcotica gegen die cardialgischen Anfälle und gegen das hartnäckige Erbrechen; gegen letzteres auch Eispillen; gegen Flatulenz Carminativa; später leichte Kost, weiche Eier, gehacktes Fleisch; Karlsbad, Marienbad; zur Heilung des Geschwürs Bismuth od. Chloralhydrat zu empfehlen.

1617. Rp. Magist. Bism. 10'0,  
Laudan. pur. 0'10,  
Sacch. alb. 3'0,

M. f. P. div. in dos. = 10.

S. Früh, Mittags und Abends 1 Pulver.

1618. Rp. Magist. Bism. 1'0,  
Extr. Belladonn. 0'10,  
Elaeosacch. Anisi 3'0,

M. f. P. div. in dos. = 10.

S. Früh u. Abds. 1 Pulv.

1619. Rp. Natr. bicarb. 1'0,  
Extr. Hyosc. 0'30,  
Magist. Bismuthi,

Sacch. alb. aa. 2'0.

M. f. P. div. in dos. = 10.

S. Früh, Mittags und Abends 1 Pulver.

Sind gleichzeitig heftige Schmerzen zugegen: subcutane Morfium-Inj. oder:

1620. Rp. Morfii 0'10,  
Aquaе Lauracer. 10'0,  
S. 5—10 Tropfen.

Gegen heftige Diarrhoen:

1621. Rp. Tannini pur. 0'50,  
Opil pur. 0'15,  
Sacch. alb. 2'0,

M. f. Pulv. div. in dos. = 5.

S. Jede 2. St. 1 Pulver.

In neuerer Zeit wird Chloralhydrat allabendlich durch etwa 14 Tage zu nehmen empfohlen; des Tages Karlsbader Wasser.

1622. Rp. Chlorali hydr. 3'0,  
Aquaе destill.,

Muc. Gumm. ar. aa. 50'0.

S. Jeden Abend in 3 Portionen und 2ständlicher Pause zu nehmen.

**Uraemia, Harnvergiftung.** Steigerung der Diurese und Ableitungen gegen die Haut (v. Morb. Brightii), bei heftigem Fieber Inf. fol. Digitalis mit Kal. acet., äussere Diaphorese (heisse Bäder oder Einpackungen, subcutane Injection von Pilocarpin); bei ausbleibender Wirkung Laxantien (Calomel, fol. Sennae, Coloquinthen). Bei uraemischen Convulsionen, besonders bei kräftigen Erwachsenen Venaesection, bei weniger Kräftigen warmes Bad mit kaltem Uebergiessen des Kopfes.

**Urticaria, Nesselausschlag.** Berücksichtigung des Causalmomentes, Sodabäder, Alaunbäder, kalte Bäder und Douchen, zuweilen Amylum. Bei hartnäckigen Formen Atropin innerlich.



1623. Rp. *Acid. acetici* 5'0.*Spir. vini* 200'0.

S. Zu Waschungen.

1624. Rp. *Atropini sulf.* 0'01.*Aquae destill.**Glycerini aa.* 2'0.*Pulv. Tragacanth. q. s.*

u. f. pil. 15.

S. Tägl. 2 Pillen z. n.

Gegen das Jucken:

1625. Rp. *Spir. vin. Gall.* 100'0.

S. Zum Betupfen der juckenden Theile.

1626. Rp. *Empl. sap.* 10'0.*Emplastr. Hydrarg.* 5'0.*Tend. supr. lint.*

S. Pflaster (bei chronischer Urticaria).

**Vaginismus.** Beseitigung localer Erkrankungsformen (anatomische Anomalien oder pathologische Processe), methodische Erweiterung von Stenosen, Behandlung von Entzündungs- oder Geschwürsformen, lauwarme Sitzbäder. Eisen, Bromkali etc.

1627. Rp. *Cocaini mur.* 1'0.*Aquae dest.* 3'0.*Spir. vini rect.* 2'0.

S. Zum Bepinseln.

Zuweilen Bepinselung mit schwacher Lapislösung (1:50) oder Jodoforminspersion erfolgreich.

**Variola, Blattern.** Behandlung rein expectativ; strenge Diät; Ventilation, passende Therapie gegen das Fieber, kalte oder Eismumschläge, Regelung des Stuhles; rechtzeitige Behandlung der Complicationen; bei bedeutender Spannung der Haut Einreibung oder Bepinseln mit Oel oder Einhüllung mit in verdünntes Glycerin (1:2 Wasser) getauchten Leinwandlappen; bei Nachlass des Fiebers laue Vollbäder. Strenge Isolirung. Desinfection. Vaccination und Revaccination.

1628. Rp. *Succi Citri.**Syr. rub. id. aa.* 15'0.

S. Zusatz zum Getränk.

Bei Schlaflosigkeit:

1629. Rp. *Chloral. hydr.* 5'0.*Aquae destill.* 50'0.*Syr. simpl.* 20'0.

S. Die Hälfte auf einmal zu nehmen.

1630. Rp. *Hydr. bichl. corr.* 0'2.*Aquae destill.* 400'0.

S. Zu Umschlägen.

*Carbolamylumsalbe* bes. auf's Gesicht (Larve):

1631. Rp. *Acidi carbol.* 5'0.*Ol. olivar.**Anyli pur.* aa. 40'0.

M. f. Ung. — S. Salbe.

1532. Rp. *Ac. carbol.* 5'0.*Glycerini,**Aquae dest. aa.* 50'0.

S. 2mal täglich mittels Schwamm den Körper abzureiben.

1633. Rp. *Xyloli pur.* 3'0.*Aq. Menth. pip.**Aq. dest. aa.* 50'0.*Syr. cinnam.**Muc. gumm. ar. aa.* 10'0.

S. 2stündl. 1 Esslöffel.

Auch Waschungen mit Chlorwasser, Bepinselungen mit Jodtinctur, 10%iger Lapislösung etc. empfohlen.

**Verbrennung** vide: Combustio.

**Verrücktheit, Vesania hallucinatoria.** Berücksichtigung des Allgemeinzustandes, Sorge für regelmässigen Stuhlgang, bei grösserer Aufregung Bromkali, Morphin,



Paraldehyd (kein Cannabis und kein Hyosciamin!), bei Abstinenz auf wahnhafter Grundlage Ernährung mittels Schlundsonde (Jacques' Patent).

**Vitium cordis, Herzfehler.** Symptomatische Behandlung; Vermeidung übermässiger Bewegung und aller Aufregungen; keine Bäder; Regelung des Stuhlgangs. Präcise Vorschriften bezüglich der Diät; leicht verdauliche Kost; geistige Getränke in mässiger Menge, wenn sie keine Erregungszustände erzeugen. Trauben- und Molkencuren von vorübergehendem Nutzen. Leichte Diuretica. Digitalis.

1634. Rp. Inf. fol. Dig. purp.  
e 10 ad 150'0,

Syrup. rub. Idaei 15'0.

S. Jede 2. Stunde 1 Essl.

1635. Rp. Inf. fol. Dig. purp.  
e 10 ad 150'0,

Morfii muriat. 0'05,

Syrup. Juniper. 15'0.

S. Jede 2. Stunde 1 Essl.

1636. Rp. Tinct. Dig. pp. gtts 10,  
Aquae Laurocer. 10'0.

S. Tropfen (3mal täglich  
je 10 Tropfen).

Bei asthmatischen Zuständen oder aufgeregter Herzaction, jedoch blos bei kräftigem Pulse und nicht längere Zeit hindurch Digitalis zu verordnen.

Statt Digitalis:

1637. Rp. Coffeini citr. 1—2 0,  
Sacch. alb. 3'0,

Dio. in dos. = 5.

S. Tagsüber zu nehmen.

1638. Rp. Coffein. Natroben-  
zoic. 0'20,

Dentur tal. dos. = 10,

S. 4—8 Pulv. täglich.

1639. Rp. Inf. Convallar. maj.  
e 5. o ad. 150'0,

Syr. simpl. 20'0.

S. 2stündl. 1 Esslöffel.

Ebenso: Inf. Adonid. vernal.

1640. Rp. Tinct. Convallar. maj.  
10'0.

S. 10 Tropfen 4mal tgl.

1641. Rp. Sparteini sulf. 0'30,  
Aq. dest. 300'0.

Syr. cort. aur. 30'0.

S. 1 Essl. 3—4mal tägl.

Gegen nervös. Herzklopfen:

1642. Rp. Natr. nitros. 0'50,  
Aquae dest. 150'0.

S. 3—4 Esslöffel täglich.

Bei schwachem Pulse, beschleunigter Herzthätigkeit und Cyanose:

1643. Rp. Chinini sulf. 1'0,  
Sacch. alb. 3'0,

M. f. P. div. in dos. = 10.

S. Früh u. Abends 1 Pulv.

Tritt noch Bronchialcatarrh hinzu:

1644. Rp. Chinini sulf. 0'50,  
Sulf. aurat. Antim.,

Flor. Benzoës aa. 0'20,

Sacch. alb. 2'0,

M. f. Pulv. div. in dos. = 5.

S. Jede 2. St. 1 Pulver.

1645. Rp. Chinini sulf. 1'0,  
Morf. muriat. 0'05,

Sacch. alb. 2'0,

M. f. P. div. in dos. = 10.

S. Früh u. Abends 1 Pulv.

Gegen asthmatische Anfälle als Folge von Herzfehlern:

1646. Rp. Tct. Lobel. infl. 10'0.

S. Stündl. 10—15 Tropfen.

1647. Rp. Aq. Lauroc. 10'0,  
Tinct. Digitalis,

Tinct. Lobel. infl. aa. 5'0.

S. Stündl. 4—5 Tropfen.

Treten Erscheinungen von Lungenödem auf:

1648. Rp. Inf. flor. Arnicae  
e 10'0 ad 150'0,

Syr. rub. Idaei 15'0.

S. Stündl. 1 Esslöffel.

Vide: Ascites.

**Vulnus conquassatum, Quetschwunde.** Sorgfältige Reinigung der Wunde, am besten durch Irrigation. Passende Lagerung (bei Extremitäten Elevation) und entsprechender Verband. Auf die wunden Flächen Application von Baumwolle, Salicylwatte, Salicyljute, Jodoformgaze oder Charpie, trocken oder in ein Verbandmittel getaucht; kalte Umschläge. Auf die bloß gequetschten, nicht wunden Stellen einfache Umschläge.

Zur aseptischen Wundbehandlung erforderlichlich:

1)  $3\frac{1}{2}\%$ ige Carbolsäurelösung oder Sublimat 1 pro mille zum Waschen.  $2\frac{1}{2}\%$ ige Carbolsäurelösung zur Reinigung der Wundfläche, der Instrumente, Schwämme und Hände. 2) Für Unterbindungen Catgutfäden und antiseptische Seide (Carbolseide, Sublimatseide oder Jodoformseide). 3) Drainageröhren, antiseptische Gaze. 4) Jodoformpulver, Jodoformgaze oder Sublimatgaze.

Beim Jodoformverband wird gepulvertes Jodoform direct oder mittels Stäubbüchse, resp. Pulverbläser aufgestreut. Für Hohlgänge eignen sich die Jodoformstäbchen. Zu parenchymat. Inject. ätherische Solutionen. Auch Emulsionen und Salben verwendbar. Die Desodorirung des Jodoforms findet durch Tonicabohne oder Ol. Bergamotti, Menthae pip. etc. statt. Auch Carbolsäure 0·05 : 10·0 Jodoform wirkt desodorirend.

1649. Rp. Kal. chlorici 5·0,  
Aquae destill. 400·0.

S. Aeusserlich.

1650. Rp. Acid. carbol.,  
Spir. vin. conc. aa. 5·0,  
Aque destill. 200·0.

S. Aeusserlich.

1651. Rp. Calcar. chlor. 5·0,  
Aquae destill. 200·0.

S. Aeusserlich.

1652. Rp. Aquae Chlori,  
Aquae destill. aa. 100·0.

S. Aeusserlich.

1653. Rp. Acid. carbol. 5·0,  
Ol. olivar. 50·0.

S. Zum Verband.

1654. Rp. Acid. salicyl. 2·0,  
Ung. emoll. 30·0.

S. Salbe.

1655. Rp. Kal. caust. 0·50,  
Aquae destill. 200·0.

S. Aeusserlich.

1656. Rp. Acid. salicyl. 5·0,  
Aquae destill. cum pauz.  
Spir. vin. 200·0.

S. Zum Verband.

1657. Rp. Aq. Calcis 500·0,  
S. Zum Abspülen.

1658. Rp. Jodoformi pur.  
Faba Toncae desod. 50·0.  
S. Strenpulver.

1659. Rp. Jodoform. pur. 50·0.  
Ol. Bergamott. gtts 5.  
S. Strenpulver.

1660. Rp. Jodoform. 10·0.  
Butyr. Cacao 20·0.  
Ol. Amygdal. q. s.  
Fiant bacilli.  
S. Jodoformstäbchen.

1661. Rp. Jodoformi 10·0.  
Gelatina q. s.  
Fiant bacilli.

S. wie das Vorige.

1662. Rp. Jodoform. 5·0,  
Glycerini 40·0.  
Aq. dest. 10·0,  
Gumm. Tragacanth. 0·30.  
F. Emulsio.

S. Zum Verband.

1663. Rp. Jodoform 10.  
Vasellini 15·0.  
S. Salbe.

1664. Rp. Jodoformi. 10'0,  
Glycerini 80'0,  
Ol. Olivar. 40'0.  
S. Zu Inj. in Abscesshöhlen.

1665. Rp. Jodoform. 5'0.  
Aetheris sulf. 25'0,  
D. ad vitr. cerat.  
S. Zu parenchym. Inj.

# **Vulnus scissum et lacerum, Schnitt- und Risswunde.**

Reinigung der Wunde mit Carbol-, Thymol-, Sublimat- oder Chlorzinklösung; Vereinigung derselben. Antiseptischer Verband (Bruns'sche Watta, Billroth's Battist, Jodoformgaze). Bei kleinen Schnittwunden Heftpflasterverband).

1666. Rp. Acid. carbol. 5'0,  
Aquae destill. 200'0.  
S. 2½%ige Carbols. (zur  
Reinigung der Wunde).

1667. Rp. Thymol. 0'50,  
Aq. dest. fervidae 500'0.  
S. Aeusserlich. (½%)

1668. Rp. M. subl. corr. 0'50,  
Aquae dest. 500'0.  
S. Sublimatlösung (1 per  
mille).

1669. Rp. Acid. salicyl. 1'0,  
Aquae dest. 400'0.  
S. Salicylsäure (¼%ige).

1670. Rp. Bromoform. 0'50,  
Aquae dest. 500'0.  
S. Aeusserlich.

1671. Rp. Zinci chlorat. 5'0,  
Aquae destill. 500'0.  
S. Verband. (1%ige Chlor-  
zinklösung; kann bis 5%  
gesteigert werden.)

Bei granulirenden Wunden  
ein Verbandmittel:

1672. Rp. Glycerini 20'0,  
Aquae destill. 50'0.  
S. Aeusserlich.

1673. Rp. Kal. chlorici 5'0,  
Aquae destill. 200'0.  
S. Aeusserlich.

1674. Rp. Kal. hyperm. 0'5,  
Aquae destill. 200'0.  
S. Verbandwasser.

1675. Rp. Aq. Plumb. 300'0.  
S. Verbandwasser.

Bei granulirenden, leicht  
zerfallenden, allenfalls  
graulich belegten Wundfl.

1676. Rp. Alum. crud. 10'0,  
Plumb. ac. 20'0,  
Aquae destill. 200'0.

Filtr. S. Starke Lösung  
(d. essigsauren Thonerde).

1677. Rp. Alum. crud. 10'0,  
Plumb. acet. 20'0,  
Aquae destill. 400'0.

Filtr. S. Schwache Lösung  
(d. essigsauren Thonerde).

1678. Rp. Oxyd. Zinc. 5'0,  
Vasellini 50'0.  
S. Salbe.

1679. Rp. Argent. nitr. 0'10,  
Arung. Porc. 50'0.  
S. Salbe.

1680. Rp. Acid. borac. pulv.,  
Parafini,  
Cerae alb. aa. 3'0,  
Ol. amygdal. 20'0.  
S. Salbe. (Borsalbe.)

Bei unreinen, allenfalls  
gangränösen Wunden, zum  
Ausspritzen jauchender  
Höhlen, Chlorkalklös. od.:

1681. Rp. Aq. Chlori 50'0,  
Aq. destill. 500'0.  
S. Aeusserlich.

1682. Rp. Ac. carbol. 10'0,  
Aquae dest. 200'0.  
S. Carbollösung (5%).

**Wehenschwäche vide: Metracinesis.**

**Wuthkrankheit vide: Lyssa.**

**Zahnkrankheiten vide: Odontalgie.**

## 2. Anhang.

### a) Zu subcutanen Injectionen gebräuchliche M camente und ihre Dosirung.

Die Injectionsspritze muss 1 Gramm (richt  
1 Ccm.) Flüssigkeit enthalten und von 1 bis 10 grad  
sein, so dass jeder Theilstrich 1 Decigramm Flüssig  
entspricht. Die Injectionsflüssigkeiten sind womög  
in einem decimalen Verhältnisse (1:500, 1:100, 1:50  
zu verordnen, wodurch die Einzeldosirung wesent  
erleichtert wird. Es empfiehlt sich, das Recept  
der Signatur des Arzneigefässes vollständig  
schreiben zu lassen!

*Acidum carbolicum* 3:100 Aq. dest.  
pro dosi 0·5—1·0 (= 0·015—0·03) und darü  
besonders als örtliches Antiphlogisticum bei H  
entzündungen, Neuralgien.

*Acidum perosmicum*, Ueberosmiumsä  
1:100 Aq. dest. — pro dosi 0·5—1·0 (= 0·00  
0·01) als Antineuralgicum in loco. (Ad vitram fus  
zu verschreiben.)

*Acidum sclerotinicum* (Dragendorff; w  
samer Bestandtheil des Extr. secalis cornuti) 1  
Aq. dest. — pro dosi 0·5—1·0 (= 0·025—0·05

*Aconitinum* cryst., besser *Aconitin*  
*nitricum* cryst. (Duquesnel); das letztere  
Wasser löslich. 1:1000 Aq. dest. — pro dosi  
bis 0·3 = 0·0001—0·0003. — Amorphes Acon  
ist ganz zu verwerfen.

*Aether* (bei Collapszuständen) 0·5 und darü

*Aloinum* (als Purgans) 1:10 Aq. dest. c  
besser *Spir.* — pro dosi 1·0—2·0 (= 0·1—0  
unsicher.

*Antipyrinum* (als Antipyreticum) in gle  
Mengen heissen Wassers gelöst; pro dosi 1·0  
= 0·5—1·0); schmerzhaft, nicht zweckmäss



*Apomorphinum hydrochloricum* als Emeticum 1:100 Aq. dest. — pro dosi, bei Erwachsenen 0·5—1·0 (= 0·005—0·01); bei Kindern im ersten Lebensjahre 0·15 (= 0·0015), bei etwas älteren Kindern 0·3 (= 0·003).

*Atropinum sulfuricum* 1:500 Aq. dest. — pro dosi 0·2—0·5 (= 0·0004—0·001).

*Camphora* (als Excitans) am besten in Form des *Spiritus camphoratus* oder *Oleum camphoratum*; von beiden pro dosi 1·0—2·0 (= 0·1—0·2).

*Chininum bisulfuricum*, *hydrobromicum*, *hydrochloricum* (die zur subcutanen Injection empfehlenswerthesten Chininsalze; nicht *sulfuricum*!) 1:aa. 5 Glycerin und Wasser — pro dosi 1·0 (= 0·1) und darüber.

*Chloralum hydratum* (subcutane Injection nicht zweckmässig!) 1:2 Aq. dest. — pro dosi bei Erwachsenen 1·0—4·0 (= 0·33—1·3); bei Kindern im ersten Lebensjahre 0·6 (= 0·2), bei etwas älteren Kindern 1·0 (= 0·33). Auch Chloralhydrat mit *Morphium* (*Chlorali hydrati* 5·0, *Morph. hydrochlor.* 0·25, Aq. dest. 25·0); pro dosi 1·0 und darüber.

*Cocainum hydrochloricum* 1:20 Aq. dest. — pro dosi 0·2—1·0 (= 0·01—0·05) bei Neuralgien und Hyperästhesien.

*Coffeinum purum*, *citricum*, *hydrobromicum*; besser in Form von *Coffeino-Natrium benzoicum* und *salicylicum* 1:5 Aq. dest. pro dosi 0·5—1·0 (= 0·1—0·2) bei Migraine etc.

*Colchicinum* 1:1000 Aq. dest. — pro dosi 0·5—1·0 (= 0·0005—0·001), bei Neuralgien.

*Convallamarinum* (Merck) 1:100 Aq. dest. — pro dosi 0·5—1·0 (= 0·005—0·01). Unsicher.

*Curare* 1:aa. 50 Glycerin und Wasser — pro dosi 1·0—5·0 (= 0·01—0·05). Unsicher.

*Daturinum* = *Hyoscyaminum cryst.*

*Digitalinum amorphum* (höchst ungleich.



nicht zu empfehlen!) 1: aa. 50 Spir. und Wasser;  
pro dosi 0.1—0.3 (= 0.001—0.003).

Duboisinum sulfuricum 1:500 Aq. dest.  
— pro dosi 0.1—0.2 (= 0.0002—0.0004).

Ergotininum citricum solutum Gehe  
(= Ergotininum Tanret);  $\frac{1}{1000}$  Ergotinin enthaltende  
Lösung; von dieser 0.3—1.0 (= 0.0003—0.001).

Extractum Secalis cornuti (am besten  
nach Vorschrift der neuen Ph. germ. bereitet).  
1: aa. 5 Glycerin und Wasser — pro dosi 1.0—2.0  
(= 0.1—0.2).

Ferrum pyrophosphoricum cum Natrio  
citrico (bestes Eisenpräparat für subcutane In-  
jection!) 1:6 Aq. dest. — pro dosi 1.0 und dar-  
über. — Ebenso auch F. pyrophosph. cum  
Ammonio citrico.

Hydrargyrum bichloratum 1:100 Aq.  
dest. — pro dosi 0.5—1.0 (= 0.005—0.01). Ebenso  
v. Bamberger's Quecksilberpeptonat-  
lösung (1 Ccm. = 0.01 Sublimat) und Hydrar-  
gyrum cyanatum.

Hydrargyrum formamidatum solutum,  
Lösung im Verhältniss von 1:100; davon 1.0 pro  
dosi (= 0.01 Quecksilberoxyd).

Hyoscyaminum amorphum wie Atrop.  
sulfuricum (unsicher). — Hyoscyaminum cryst.  
Merck ebenso.

Hyoscinum hydrojodicum 1:500 Aq.  
dest. — pro dosi 0.2—0.5 (= 0.0004—0.001) bei  
Tremor, Paralysis agitans u. s. w.

Liquor Kalii arsenicosi 1:4 Aq. dest.  
— pro dosi 0.5—1.0 (= 0.1—0.2) bei Psoriasis, bei  
Chorea, Tremor und anderen Neurosen.

Liquor hydrargyri albuminati Drees,  
Lösung im Verhältniss von 1:100; davon 0.5—1.0  
pro dosi. Empfehlenswerthes Präparat.

Morphinum hydrochloricum 1:20 (1 in  
10 reinem Glycerin unter Erwärmen gelöst, de

fertigen Lösung 10 Aq. dest. zugesetzt) — pro dosi 0·1—0·6 (= 0·005—0·03). In den ersten Lebensjahren höchstens 0·1 (= 0·005). Vorzuziehen sind sterilisierte Lösungen von 1:50 Aq. dest.; pro dosi 0·5—1·5 = 0·01—0·03; oder frisch bereitete Auflösung der Hypodermic disks mit 0·01 Morphinum. — Auch mit Atrop. sulf. zusammen (0·01 Morph. hydrochl. auf 0·001 Atrop. sulf.).

Morphinum sulfuricum 1:20—50 Aq. dest. — Dosis wie bei dem vorigen.

Natrium chloratum (zur „Hypodermoklyse“ bei Cholera); nach Samuel 6·0 Natr. chlor., 1·0 Natr. carb. zu 1 Liter Wasser; nach Cantani 4·0 Natr. chlor., 3·0 Natr. carb. zu 1 Liter Wasser.

Physostigminum salicylicum 1:500 Aq. dest. — pro dosi 0·2—0·5 (= 0·0004—0·001). — Ebenso P. hydrochloricum (statt Eserinum hydrochloricum).

Pilocarpinum hydrochloricum 1:50 Aq. dest. — pro dosi 1·0—2·0 (= 0·02—0·04).

Sparteinum sulfuricum (Digitalis-ähnlich); 1:50 Aq. dest. — pro dosi 0·5—1·0 (= 0·01 bis 0·02) und darüber.

Spiritus aethereus — wie Aether.

Strychninum nitricum 1:100 Aq. dest. — pro dosi 0·3—1·0 (= 0·003—0·01). — Ebenso S. sulfuricum.

Tinctura Cannabis indicae (rein), pro dosi 0·2—0·5.

Veratrinum 1:100 Spir. dil. — pro dos. 0·2—0·5 (= 0·002—0·005) unzweckmässig.

A. Eulenburg.

## b) Zu Inhalationen gebräuchliche Medicamente und ihre Dosirung.

Zu Inhalationen sind Zerstäubungsapparate mit Dampfbildung nach dem Systeme Siegle od. solche ohne Dampf mit Doppelgläse nach Schnitzler zumeist gebräuchlich.

lich. Die nachfolgende Dosirung ist mit Rücksicht auf den Schnitzler'schen Apparat berechnet, bei d. Siegle'schen Apparat muss die Dosis doppelt so stark genommen werden.

- Acid. benzoicum 0·5—1·0 : 10. Spir. vin.  
 Acid. carbol. 0·5—1 : 100 Aq. dest.  
 Acid. lacticum 1—2 : 100.  
 Acid. tannicum 1—2 : 100 Aq. d. Glycerin.  
 Amylnitrit 2—5 Tropfen auf ein Taschentuch.  
 Alumen crud. 2—3 : 100.  
 Ammonium dep. 0·3—1·0 : 100 Aq.  
 Aqua Calcis und Aq. destill. aa. p. aeq.  
 Aqua Creosoti 1—5 : 100 Aq.  
 Aqua Picis 1—20 : 100 Aq.  
 Aqua Chlori und Aq. destill. aa. p. aeq.  
 Aqua Laurocer. 3—5 : 100.  
 Argent. nitr. 0·1—0·2 : 100.  
 Borax venet. 3—5 : 100.  
 Bromum mit Kali bromat. aa. 0·2 : 100.  
 Chininum sulf. 0·5 : 100·0.  
 Chininum tannicum 0·02—0·1 : 100.  
 Cocainum mur. 0·50 : 250.  
 Emuls. amygdal. oder oleos. etc. 5 : 100.  
 Extr. Belladonnae 0·01—0·05 : 100 Aq.  
 Extr. conii. 0·04—0·15 : 100.  
 Extr. Hyoscyami 0·05—0·20 : 100.  
 Extr. Opii aq. 0·1—0·2 : 100.  
 Ferr. sesquichl. sol. 0·5—1·0 : 100.  
 Glycerini pur. 10 : 100 oder unverdünnt.  
 Hydr. bichl. corr. 0·05—0·10 : 100.  
 Kalii carbon. dep. 0·20—3·0 : 100 Aq.  
 Kali bromat. 3·0 : 100.  
 Kal. chlor. 3—5 : 100.  
 Kal. hypermang. 0·1—0·2 : 100.  
 Kal. jodat. 1—2 : 100.  
 Kal. jodati 1—2 und Jodi pur. 0·02 : 100.  
 Kal. bromat. 0·20—1·0 : 100 Aq.  
 Kreosot. gtts. 2 : 1.  
 Lithium carb. 0·2—2·0 : 100.  
 Morphii mur. 0·1 : 100.

Natr. benzoicum 1·0—2·0 : 100.

Natr. bicarb. 3—5 : 100.

Natr. carb. dep. 0·20—2·0 : 100 Aq.

Natr. chlorat. 0·30—3·0 : 100 Aq.

Natrium hydrochl. 0·2—2·0 : 100.

Plumb. ac. bas. s. 3—5 : 100.

Tannini pur. 1—2·0 : 100.

Tinct. cannabis Ind. 0·5—1·0 : 100.

Tinct. Jodi 0·10 und Spir. vini 10·0 : 100.

Tinct. opii simpl. 0·2—0·5 : 100

Andere Inhalationsmittel:

Bromum jod. Nr. 76,

Aether sulf. Nr. 90,

Jodüräthyl Nr. 129,

Chloroform Nr. 618,

Ol. Eucalypti Nr. 926, ferner

Inf. Phellandr. aq. Nr. 1520.

Ferner eignen sich zur Inhalationstherapie verschiedene Mineralwasser, weiters Infuse oder Decocte der Spec. emoll.: Althea, Glycyrrhiz. oder Flor. Malvae 1·0 : 100, sodann Inf. fol. Hyosc. e 0·5 bis 0·1 ad 100·0, Stramonii e 0·2—0·5 ad 100·0, Belladonn. e 0·1—0·2 ad 100·0, Inf. flor. Sambucc. oder Tiliae e 5·0 bis 25·0 : 500.

Die bei Wärme sich leicht verflüchtigenden Medicamente, wie Ol. Pini, Ol. Terebinth. etc., eignen sich besser für den Siegle'schen Apparat; können übrigens auch ohne jeden Apparat eingeathmet werden, wenn man von diesem Medicament 10—20 Tropfen in einen beliebigen Behälter in heisses Wasser gibt.

Aq. Picis. 50·0. S. Tropfen zur Inhalation. Ol. Pini ebenso; ferner Ol. Eucalypti und Terebinth. allein oder mit Ol. Juniperi aa. part. aeq. oder 0·5—2·0 : 100 Aq.

### 3. Antidota,

zusammengestellt von Dr. Th. Schlosser.

#### Allgemeine Bemerkung.

Das Brechmittel entfällt, wenn der Vergiftete bereits erbrochen hat.

**Aconitin.**

Rp. Cupri sulfur. 1·0

Aq. destill. 40·0.

S. Brechmittel. Die Hälfte zu geben, wenn nöthig nach 5 Minuten den Rest.

**Dann:**

Rp. Acid. tannic. 4·0

Aq. destill. 200·0

Syr. simpl. 50·0.

S. Alle 5 Minuten 1 Esslöffel voll.

**Aether-Narkose.**

- Rp. *Ammon. pur. liq. gutt. 15*  
*Aq. destill. 20°0.*  
*S. Auf einmal einzuschlürfen.*
- Rp. *Ammon. pur. liq. 30°0.*  
*S. Zum Riechen.*  
 (Kalte Begiessungen. — Züfächeln frischer Luft.)

**Aetzkalken und kohlen-saure Alkalien.**

- Rp. *Acid. tartaric. 10°0*  
*Aq. fontis 1000°0.*  
*S. Ein Trinkglas voll auf einmal zu trinken, dann alle 5 Minuten einen Kaffeelöffel voll Mandelöl mit 5 Esslöffel voll Weinsäurelösung. (Reicht hin für 100 Grm. 5<sup>0</sup>/<sub>10</sub>ige Laugen-essenz.)*

**Aetzkalk und Kalksalze.**

- Rp. *Magnes. sulf. 20°0*  
*Aq. destill. 100°0*  
*Syr. simpl. 40°0.*  
*S. Auf einmal zu nehmen.*  
 Dann:

- Rp. *Ol. amygd. dulc. 20°0*  
*P. Gummi arab. 10.0*  
*terendo cum*  
*Aq. destill. 15°0*  
*subigantur adde*  
*Syr. simpl. 100°0.*  
*D. S. Jede 1/4 Stunde*  
*2 Kaffeelöffel voll.*

**Alkoholnarkose.**  
(Rausch.)

- Rp. *Pepsin. german. 2°0*  
*Aq. destill. 200°0*  
*Acid. muriat. 1°0.*  
*M. D. S. Alle 5 Minuten 1 Esslöffel voll.*  
 oder:  
*Ammon. pur. liq. gutt. 10*  
*Aq. destill. 150°0*  
*Syr. simpl. 20°0.*  
*S. Auf einmal.*

**Ammoniakgas.**

- Rp. *Acid. acet. radie. 10°0.*  
*S. Zum Riechen.*
- Rp. *Acet. crud. 20°0*  
*Aq. destill. 200°0*  
*Syr. simpl. 20°0.*  
*S. Esslöffelweise alle 5 Minuten.*
- Rp. *Acet. crud. 50°0*  
*Aq. destill. 200°0.*  
*S. Warm zu inhaliren.*  
 (Kalte Waschungen.)

**Anilinpräparate.**

- Rp. *Cupr. sulf. 1°0*  
*Aq. destill. 40°0.*  
*S. Brechmittel, die Hälfte auf einmal zu geben, wenn nöthig, nach 5 Minuten den Rest.*
- Rp. *Magnes. ust. in Aq. 200°0,*  
*D. S. Jede halbe Stunde*  
*1 Esslöffel voll.*

**Antimonpräparate und Brechweinstein.**

- Rp. *Acid. tannic. 3°0*  
*Aq. destill. 140°0*  
*Syr. althaeae 60°0.*  
*M. S. Alle 5 Minuten*  
*1 Esslöffel voll.*

**Arsenikpräparate.**

- Rp. *Magnes. ust. in Aq. 200°0.*  
*M. D. S. Ein Drittel davon auf einmal zu nehmen, dann alle 5 Minuten 1 Esslöffel voll.*

**Atropin.**

- Rp. *Fol. Jaborandi 10°0.*  
*Fiat infus. ad collat. 200°0.*  
*S. Auf einmal zu nehmen; dann jede halbe Stunde 1. Esslöffel voll mit 1 Esslöffel voll Wein.*
- Rp. *Pilocarpin. muriat. 0°05,*  
*Aq. destill. 200.*  
*S. Zur subcutanen injection.*



**Baryt.**

Wie bei Bleisalzen.

**Belladonna.**

Siehe Atropin.

**Biss von Hunden und Katzen.****Rp. Kalii hydroxyd. 1°0***Aq. destill. 500°0.**S. Die Wunde auszuwaschen und mit darcin getauchter Leinwand offen zu halten bis zur ärztl. Hilfe.***Biss von Schlangen.**

Siehe Biss von Hunden.

**Rp. Ammon. pur. liq. gutt. 30***Aq. destill. 150°0**Syr. simpl. 30°00.**M. S. Alle 5 Min. 1 Essl.***Bleisalze.****Rp. Aq. laxat. 50°0.***Magn. sulfur. 30°0**Aq. fere. 300°0.**S. Auf 2mal innerhalb 10 Minuten.***Brom.****Rp. Magn. ust. in Aq. 200°0.***S. in Drittel davon auf einmal zu nehmen, dann jede 1/4 Stunde 1 Essl. voll.***Brucin.**

Wie bei Strychnin.

**Brunnengas.**

Siehe Kohlensäure.

**Cannabis indica.**

Wie bei Morphin.

**Cantharidin.****Rp. Cupri sulfur. 1°0***Aq. destill. 40°0.**S. Brechmittel, die Hälfte zu geben, wenn nöthig nach 5 Minuten den Rest.*

Dann:

**Rp. Camphor. ras. 3°0***c. mucilag. G. arabic. bene subact. misce cum Mixt. gummos. 300°0**Tinct. opii s. gutt. decem.**S. Alle 5 bis 10 Minuten 1 Esslöffel voll.***Carbolsäure.**

Siehe Anilin-Brechmittel

Dann:

**Rp. Magnes. ust. in Aq. 200°0.***S. Die Hälfte davon auf einmal zu nehmen, dann jede 1/4 Stunde 1 Esslöffel voll abwechselnd mit Mixt. oleos. 200°0.**S. Jede 1/4 Stunde 1 Esslöffel voll.***Chloralhydrat.****Rp. Atropin. sulf. Milligrm. duo.***Aq. destill. 35°0.**S. Auf zweimal in einer halben Stunde zu nehmen (Anstatt Atropin s. kann ebenso gegeben werden Tinct. belladonnae 2°0.)***Chloroform.****Rp. Ammon. pur. liquid. 50°0.***S. Zum Riechen.*

(Kalt douchen und Eis auf den Kopf.)

**Rp. Pulv. Seidlitzens. Nr. duo.***S. Eines zu geben.*

Im äussersten Falle:

**Rp. Cupr. sulf. 1°0***Aq. destill. 40°0.**S. Brechmittel, die Hälfte zu geben, wenn nöthig nach 5 Minuten den Rest.***Chlordämpfe.****Rp. Aq. laurocer. 10°0***Aetheris**Alkohol. 90% aa. 30°0.**S. Zum Riechen und Einathmen.***Rp. Spirit. nitr. dulc. 20°0***Syr. althaeae**Aq. destill. aa. 40°0.**M. S. Jede 5 bis 10 Minuten 1 Esslöffel voll.*

### Chromsäure und chromsaure Salze.

Rp. *Puls. ferr.* 5'0  
*Tinct. oleos.*,  
*Syr. simpl. aa.* 50'0.  
*M. S.* Wohl aufgeschüttelt jede 5 Minuten 1 Kaffeelöffel voll, dann 2 Esslöffel voll Wasser.

### Cloakenluft.

(Schwefelwasserstoff.)

Rp. *Spirit. aetheris* (Liq. Hoffmann.) 30'0.

*S.* Alle 3 Minuten 10 Tropfen mit 1 Kaffeel. voll Wasser einzufliessen.

Rp. *Spirit. aether. nitr.* 50'0.

*S.* Auf ein Tuch gegossen zum Riechen.

Rp. *Calc. hypochloros.* 40'0.

*S.* Zum Riechen.

(Frische Luft, Waschen mit Essig.)

### Codeïn.

(Siehe Morphin.)

### Colchicin.

(Siehe Aconitin.)

### Conlin.

Rp. *Strychnin. nitr.* 0'01

*Aq. destill.* 100'0

*Tinct. opii s. gutt.* 30.

*S.* Jede  $\frac{1}{4}$  Stunde zwei Kaffeelöffel, bis  $\frac{1}{3}$  verbraucht ist, dann jede halbe Stunde bis zum Verbrauch des zweiten Drittels; dann jede Stunde.

### Curare.

(Pfeilgift)

Rp. *Strychnin. nitr.* 0'05

*Aq. destill.* 5'0.

*S.* Zur Injection.

### Cyankalium und Blausäure.

Rp. *Cupri sulf.* 2'0

*Aq. destill.* 28'0

*S.* Brechmittel; 1 Esslöffel voll zu geben, nach 5 Minuten den Rest.

(Gleichzeitig kalte Begiessungen.)

### Digitalis.

Wie bei Morphin.

### Fliegenschwamm-Gift =

### Muscarin

(siehe Chloralhydrat);

oder:

*Atropin sulf.* 0'01

*Aq. destill.* 5'0.

*S.* Zur Injection.

### Gratiola.

Wie bei Aconitin.

### Helleborus.

Siehe Aconitin.

### Hyoascamus.

Siehe Morphin.

### Insectenstiche.

Rp. *Ammon. pur. liquid.* 20'0.

*S.* Aeusserlich zum Betupfen.

### Jod.

Rp. *Amyl.* 5'0. *M. terend. c.*

*pauzillo Aquae et infunde cum Aq. feruida* 100'0.

*Misce cum Magnes. ust. in Aq.* 100'0.

*S.* Alle 5 Minuten 1 Esslöffel voll.

### Kalk.

Siehe Aetzkalk.

### Kleesäure u. kleesaure Salze.

Rp. *Calcii carbon. pur.* 50'0

*Aq. destill.* 200'0.

*M. D. S.* Die Hälfte auf einmal zu nehmen, dann alle 10 Minuten 1 Essl. voll.

Nach einer halben Stunde zu nehmen:

Rp. *Aq. laxat. vienn.* 50'0

*Natr. sulf. cryst.* 10'0.

*Solve*

*S.* Auf einmal zu nehmen.

### Kohlenoxyd und Kohlensäure.

Rp. *Ammon. pur. l.* 40'0.

*S.* Zum Riechen.

(Kalte Begiessungen.)

**Rp. Extr. secal. cornut. 0'30**  
*Aq. destill. 50'0.*  
*S. Jede 1/4 Stunde 1 Kaffee-*  
*löffel voll.*

#### Kreosot.

**Rp. Pulv. gummi arab. 10'0**  
*Ol. amygd. dulc. 20'0*  
*Fiat leg. art. emulsio et*  
*adde:*  
*Aq. destill. 280'0.*  
*D. S. Ein Viertel davon*  
*auf einmal zu nehmen, dann*  
*jede 10 Minuten eine halbe*  
*Kaffeetasse voll.*

#### Kupfersalze.

**Rp. Pulv. ferri 14'0**  
*Flor. sulf. lot. 8'0*  
*M. intim. et adde:*  
*Syr. simpl. 60'0.*

*M. D. S. Wohl aufge-*  
*schüttelt alle 5 Minuten*  
*einen Kaffeelöffel voll, ab-*  
*wechselnd mit:*

**Rp. Magn. ust. in Aq. 200'0**  
*M. c. albo ovor. Nr. 4*  
*Aq. destill. 200'0*  
*Syr. simpl. 80'0.*  
*S. Alle 5 Minuten eine*  
*halbe Kaffeetasse voll.*

#### Kupfergeld, verschlucktes.

Bei Kindern:

**Rp. Hydrom. infant. 20'0.**  
*D. S. Auf einmal zu geben.*

Bei Erwachsenen:

**Rp. Aq. lax. vienn. 50'0**  
*Natr. sulf. cryst. 10'0.*  
*D. S. Auf einmal zu nehmen.*

#### Lactucarium.

Wie bei Morphin.

#### Mineralsäuren.

**Rp. Magn. ustae in Aq. 200'0.**  
*D. S. Die Hälfte auf ein-*  
*mal zu nehmen, dann alle*  
*5 Minuten 1 Esslöffel voll.*  
*abwechselnd mit 2 Esslöffel*  
*voll von*

**Rp. Ol. amygd. dulc. 20'0**  
*P. gumm. arab. 10'0*  
*Fiat emulsio*  
*c. Aq. destill. 200'0*  
*Syr. simpl. 100'0.*  
*S. Alle 10 Min. 2 Essl.*

#### Morphin.

**Rp. Cupri sulf. 1'0**  
*Aq. destill. 40'0.*  
*M. D. S. Brechmittel,*  
*die Hälfte zu geben, wenn*  
*nöthig nach 5 Min. den Rest.*

Ferner:

**Rp. Coffeae tostae 50'0**  
*f. infus. ad collat. 200'0*  
*Acid. tannic. 4'0*  
*Syr. simpl. 50'0.*  
*S. Alle 5 Min. 1 Essl.*

#### Nicotin.

(Uebelkeiten in Folge von  
 Tabakrauch.)

**Rp. Acet. crud. 50'0**  
*Aq. destill. 200'0*  
*Syr. simpl. 50'0.*  
*S. Die Hälfte auf ein-*  
*mal zu nehmen, dann alle*  
*5 Minuten 1 Esslöffel.*

Bei Vergiftungsfällen:  
 Siehe Morphin.

**Rp. Acid. tannic. 4'0**  
*Aq. destill. 200'0*  
*Syr. simpl. 50'0.*  
*M. D. S. Alle 5 Minu-*  
*ten 1 Esslöffel voll.*

#### Opium.

Wie bei Morphin.

Paris quadrifolia.

Wie bei Morphin.

#### Petroleum od. ätherische Oele.

**Rp. Mixt. oleos. 1000'0.**  
*S. Fort u. fort zu trinken.*

#### Phosphor.

**Rp. Cupri sulfur. 1'0**  
*Aq. destill. 40'0.*  
*D. S. Brechmittel; die*  
*Hälfte zu geben, wenn nöthig*  
*nach 5 Minuten den Rest.*  
 Dann:

Rp. *Ol. terebinth. vetusti* 30°0  
(je älter, desto besser)

*Subag. c. vit. ovor. Nr. 2*

*Aq. menth. pip.* 250°0

*Syr. simpl.* 50°0

*S.* Stark umgeschüttelt,  
alle halbe Stunden 1 Ess-  
löffel voll, bis ein Viertel  
der Mixtur verbraucht ist;  
dann alle Stunden 1 Ess-  
löffel voll.

Zweifelhaft:

Rp. *Magnes. ust. in Aq.* 20°0

*Aq. chlori* 120°0.

*S.* Wie das vorige.

Phosphorbrandwunden.

Rp. *Argent. nitr. fus.* 2°0

*Aq. destill.* 20°0.

*S.* Zum Auspinseln und  
Auswaschen der Wunde.

*Pulsatilla.*

Wie bei Aconitin.

Quecksilbersalze.

Siehe Kupfersalze.

*Sabina.*

Siehe Morphin.

*Santonin.*

Rp. *Cupri sulfur.* 1°0

*Aq. destill.* 40°0.

*S.* Brechmittel; die Hälfte  
zu geben, wenn nöthig nach  
5 Minuten den Rest.

*Schwämme.*

Wie bei Morphin.

*Secale cornutum.*

Wie bei Wurstgift.

Silberpräparate.

Rp. *Sal. culinar.* 20°0

(*Natr. chlorat.*)

*Aq. communis* 300°0.

*S.* Die Hälfte auf einmal  
zu nehmen, dann jede halbe  
Stunde 1 Esslöffel voll.

Dazwischen zu nehmen:

Rp. *Mixt. oleos.*

*Mixt. gummos. aa.* 150°0.

*M. S.* Jede halbe Stunde  
2 Esslöffel voll.

*Stramonium.*

Wie bei Opium.

Dann:

Rp. *Morph. muriat.* 0°10

*Aq. destill.* 10°0.

*S.* Zur subcut. Inj.

*Strychnin.*

Rp. *Acid. tannic.* 3°0

*Aq. destill.* 140°0

*Syr. althaeae* 60°0.

*S.* Alle 5 Min. 1 Essl.

Rp. *Chloralhydrat.* 4°00

*Aq. destill.* 100°0.

*S.* Jede  $\frac{1}{2}$  Stunde 1 Essl.

*Veratrin.*

Siehe Morphin.

Wurstgift oder verdorbenes  
Fleisch.

Rp. *Cupri sulf.* 1°0

*Aq. destill.* 40°0.

*S.* Brechmittel; die Hälfte  
auf einmal zu geben, wenn  
nöthig nach 5 Min. den Rest.

Hierauf wird gegeben:

Rp. *Aether. depur.* 2°0

*Aq. destill.* 150°0

*Tinct. opii spl. gutt.* 10

*Syr. capill. vener.* 20°0.

*S.* Jede  $\frac{1}{2}$  Stunde 1 Essl.

*Zinksalze.*

Rp. *Acid. tannic.* 4°0

*Aq. destill.* 140°0

*Syr. althaeae* 60°0.

*D. S.* Alle 5 Min. 1 Essl.

*Zinnsalze.*

Rp. *Pule. rad. Ipecac.* 2°0

*Aq. destill.* 100°0

*Syr. simpl.* 20°0.

*M. D. S.* Brechmittel, auf  
zweimal innerhalb einer  
Viertelstunde zu nehmen.

Dann:

Rp. *Magn. ustae in Aq.* 200°0.

*S.*  $\frac{1}{3}$  auf einmal, dann

alle 5 Minuten 1 Esslöffel  
voll; ferner reichlich Milch.

(Zeitschr. d. allg. österr.  
Apoth.-Ver. 1880.)

## 4. Cosmetica (Schönheitsmittel).

Sowohl aus curativen wie aus hygienischen Rücksichten ist die Kenntniss der Cosmetica für den Arzt von Wichtigkeit und eine Ueberwachung ihres Gebrauchs umsomehr geboten, als sich dieser in bemerkenswerther Weise verallgemeinert, und der Absatz solcher Producte, durch die Presse unterstützt, von Tag zu Tag an Umfang gewinnt.

### I. Duftmittel (Odoramenta, Parfüme).

Sie bezwecken die Verbreitung feiner Wohlgerüche, um sie den Wohnräumen, unserem Körper, Kleidungsstücken und anderen Gegenständen des Haushaltes mitzutheilen.

#### 1. Parfümflüssigkeiten; Spreng- und Toilettewässer (*Spiritus odoratiorum*).

Moschusessenz:

*Tinct. Moschi* part. 4,

*Tinct. Ambrae* 2,

*Spir. Rosar.* 1.

Patchouliessenz:

*Ol. Patchoul.* part. 8,

*Ol. Rosar.* 2,

*Alkohol* 500.

Lavendelessenz:

*Ol. Lavand. angl.* p. 2,

*Aq. Rosar.* 20,

*Alkoh.* 100.

Veilchenwurzel-

essenz:

*Rhiz. Ireos* p. 4,

*Spir. vin. conc.* 10,

*Aq. Rosar.* 1,

*Mac. p.* 8 d. dest. et filtr.

Künstliche Nelken-  
essenz:

*Essent. Rosar. p.* 56,

*Essent. flor. Aurant.*,

*Essent. Acaciae ana* 28,

*Tinct. Vanill.* 11,

*Ol. Caryophyll.* 1.

Veilchenessenz:

*Essent. Acac. p.* 2,

*Essent. Rosar.*,

*Essent. Tuberos.*

*Tinct. Irid. ana* 1,

*Ol. Amygd. amar. aeth.* 0'001,

Zu den zusammengesetzten Parfümerieflüssigkeiten gehört das Kölnische Wasser (*Aqua s. Spiritus Coloniensis, Eau de Cologne*).

2. Riechessige; Toilettessige, aromatische Essige (*Acetum cosmeticum s. aromaticum*). Neben *Acetum aromaticum* ist noch *Acidum aceticum aromaticum offic.* (Ph. Germ.).

*Acetum Britannicum*:

*Acid. acet. glac. part.* 600,

*Camph.* 60,

*Ol. Caryophyll.*, 2,

*Ol. Cinnam.* 1,

*Ol. Lavand.* 0'5.

Gesundheitsessig:

*Ol. Caryophyll.*,

*Ol. Lavand. ana p.* 4,

*Ol. Majoran.* 2,

*Ol. Benzoes* 50,

*Spir. Vini* 500.

*Acet. conc.* 1000; dig. et filtr.



**Toilettessig:**

*Bals. Peruv.* p. 2,  
*Bals. vit. Hoffmann* 30,  
*Tct. Benz.* 10,  
*Aq. Colon.* 25,  
*Alkoh.* 100,

*Acid. acet.* 20,  
*Aqua destill.* 40.

3. **Riechsalze** (*Sal volatile odoratum*), Riechfläschchen, Riechbüchsen.

**Parfümirtes R.**

*Ammon. chlor.* p. 20,  
*Kali carb. pur.* 10,  
*Irrorient, mixt, ex*  
*Olei Bergam.*  
*Ol. Citri ana* 7,  
*Ol. Cadini* 5,

*Aqua Luciae* wird in Riechfläschchen verkauft, deren Baumwolle mit Aetzammoniakflüssigkeit, Ambra, Benzoë- und Tolubalsamtinctur getränkt ist.

4. **Riechpulver** (*Puleis odoratus*), Riech- od. Duftsäckchen.

**Vetiverriechpulver:**

*Pule. rad. Vetiver.* p. 500,  
*Lign. Sant. alb.* 250,  
*Ol. Thymi,*  
*Ol. Rosae ana* 0.5.

**Irisriechpulver:**

*Rhiz. Ireos,*  
*Flor Acac. in pulv. rudi*  
*aa. p. aeq.*

5. **Aromatische Räucherpulver** (*Puleis fumalis odoratus*), *Puleis fumalis nobilis* und *Puleis fumalis ordinarius* der früheren Pharm.; ferner *Puleis fumalis* Dr. Engel.

6. **Aromatische Räucherkerzchen** (*Candelae fumales odoriferae*), besonders die der franz. Pharm.

7. **Aromatische Räucherpapiere** (*Chartae fumales odoriferae*), die theils verbrennen, theils ohne zu verbrennen, ihren Duft abgeben.

8. **Räucheressenzen** (Räucherbalsame, *Essentia fumalis*) und **Räucheressige** (*Acetum fumale*).

## II. Mittel zur Erhaltung und Wiederherstellung körperlicher Schönheit. (Cosmetica im engeren Sinne des Wortes.)

A) **Mittel zur Verschönerung des Teints** (Cosmetik der Haut).

1. **Fetto**: Mandel- und Olivenöl, Vaselineöl (*Paraffinum solidum*), Vaseline, Cacaobutter, Lanolin, dann das officinelle *vasentum emolliens*, bekannter als *Crème céleste*, Cold-Cream

**Bully's Toilettessig:**

*Tct. Benz.* p. 1,  
*Acid. acet.* 4,  
*Aq. Colon.* 100.

**Rosenessig:**

*Ol. Rosar.* p. 1,  
*Acid. acet. conc.* 15.

*Ol. Aurant. flor.* 5,  
*Tinct. Moschi* 0.1.

**Olfactorium anti-catarrhoicum:**

*Acid. carbol.* p. 100,  
*Ol. Terebinth.* 5.0,  
*Liq. Ammon. caust.* 12,  
*Spir. Vin.* 20

**Lavendelriechpulver:**

*Pule. flor. Lavand.* p. 75,  
*Benzoës* 20,  
*Ol. Lavand.* 1.

**Patchouli-Riechpulver:**

*Pule. herb. Patch.* p. 50,  
*Ol. Patch.* 1.

**Cacao-Crème:**

*Ol. Cacao liq.* p. 5,  
*Ol. Ricini* 30,  
*Ol. Bergam.* 1,  
*Aq. Colon.* 20.

**Glycerin-Crème:**

*Cetacei g.* 6·5,  
*Paraffini* 5·0,  
*Ol. Amygd.* 25·0,  
*Aq. Ros.*,  
*Glycer.* ana 10·0,  
*Ol. Ros.* 0·02.

2. **Glycerin (Honig)** (*Glycer.* 1000, *Aq. flor. aurant.* 120,

*Ol. Nerol.*, - *Amygd. amar.* ana 1); zu Waschung. und Einreib.

3. **Spirituöse Mittel.** Waschungen mit Franzbranntwein, pur oder verdünnt. Bestandtheile der Schönheitswässer, wie Blüthenthau, Circassiwasser, Hausbalsam u. s. w.

4. **Harze und Balsame** (Theerpräparate), Pernbalsam, flüssiger Storax, Benzoë und verharzter Tolubalsam.

***Lac virginicum:***

*Tinct. balsam. Tolut.* p. 7,  
*Aq. Rosar.* 565. ( $\frac{1}{2}$  bis 1  
 Theel. auf 1 Glas Wasser  
 zum Waschen.)

**5. Alkalische Mittel.**

a) Seifen (Saponin führende Pflanzentheile). Toilette-seifen, ferner Saponis Saponis kalinus, saponinhaltige Pflanzentheile, wie die Quillayarinde (*Cortex Quillayae*) und die Seifenwurzel, namentlich die levantische (*Radix Saponariae levanticae*). Zur Parfümierung der Seifen dienen die oben erörterten Duftmittel und zur Färbung verschiedene Stoffe (Zinnober, Ultramarin etc.).

**Waschpulver:**

*Sapon. in pulv. g.* 25·0,  
*Natri carbon. sicc.* 2·5,  
*Amyl. Oryzae* 10·0,  
*Pulv. rhiz. Ireos* 5·0,  
*Mixt. odorif.* 4·0.

**Seifenessenzen:**

*Sapon. albi* p. 1,  
*Alkoh.* 4,  
*Aq. Ros.*,  
*Aq. Naph.* ana 1.

Waschmittel für zarthängige Theile (*Tct. Quillayae* mit etwas Bergamottenöl und der 5fachen Wassermenge verdünnt) verwendet, bildet den wirksamen Bestandtheil des

**Mandelpulver:**

*Amygd. dulc.* p. 100,  
*Amygd. amar.* 20,  
*Amyl. Oryzae* 120,  
*Borac.*,  
*Rhiz. Ireos put.* ana 5,  
*Ol. Bergam.*,  
*Ol. Citri* ana 0·5.

**Crème de beauté.**

*Amygdalar. dulc.* p. 15  
*Aq. flor. Aurant.*,  
*Aq. Rosar.* ana 60,  
*Borac.* 1,

*Tct. Benz.* 2; 1—2 Theile mit  
 Wasser gem. z. Waschen.

*Amygdalar. dulc.* p. 15

*Aq. flor. Aurant.*,  
*Aq. Rosar.* ana 60,  
*Borac.* 1,

*Tct. Benz.* 2; 1—2 Theile mit  
 Wasser gem. z. Waschen.

*Amygdalar. dulc.* p. 15

*Aq. flor. Aurant.*,  
*Aq. Rosar.* ana 60,  
*Borac.* 1,

*Tct. Benz.* 2; 1—2 Theile mit  
 Wasser gem. z. Waschen.

*Amygdalar. dulc.* p. 15

*Aq. flor. Aurant.*,  
*Aq. Rosar.* ana 60,  
*Borac.* 1,

*Tct. Benz.* 2; 1—2 Theile mit  
 Wasser gem. z. Waschen.

*Amygdalar. dulc.* p. 15

*Aq. flor. Aurant.*,  
*Aq. Rosar.* ana 60,  
*Borac.* 1,

*Tct. Benz.* 2; 1—2 Theile mit  
 Wasser gem. z. Waschen.

*Amygdalar. dulc.* p. 15

*Aq. flor. Aurant.*,  
*Aq. Rosar.* ana 60,  
*Borac.* 1,

*Tct. Benz.* 2; 1—2 Theile mit  
 Wasser gem. z. Waschen.

*Amygdalar. dulc.* p. 15

*Aq. flor. Aurant.*,  
*Aq. Rosar.* ana 60,  
*Borac.* 1,

*Tct. Benz.* 2; 1—2 Theile mit  
 Wasser gem. z. Waschen.

*Amygdalar. dulc.* p. 15

*Aq. flor. Aurant.*,  
*Aq. Rosar.* ana 60,  
*Borac.* 1,

*Tct. Benz.* 2; 1—2 Theile mit  
 Wasser gem. z. Waschen.

*Amygdalar. dulc.* p. 15

*Aq. flor. Aurant.*,  
*Aq. Rosar.* ana 60,  
*Borac.* 1,

*Tct. Benz.* 2; 1—2 Theile mit  
 Wasser gem. z. Waschen.

*Amygdalar. dulc.* p. 15

*Aq. flor. Aurant.*,  
*Aq. Rosar.* ana 60,  
*Borac.* 1,

*Tct. Benz.* 2; 1—2 Theile mit  
 Wasser gem. z. Waschen.

*Amygdalar. dulc.* p. 15

*Aq. flor. Aurant.*,  
*Aq. Rosar.* ana 60,  
*Borac.* 1,

*Tct. Benz.* 2; 1—2 Theile mit  
 Wasser gem. z. Waschen.

*Amygdalar. dulc.* p. 15

*Aq. flor. Aurant.*,  
*Aq. Rosar.* ana 60,  
*Borac.* 1,

*Tct. Benz.* 2; 1—2 Theile mit  
 Wasser gem. z. Waschen.

*Amygdalar. dulc.* p. 15

*Aq. flor. Aurant.*,  
*Aq. Rosar.* ana 60,  
*Borac.* 1,

*Tct. Benz.* 2; 1—2 Theile mit  
 Wasser gem. z. Waschen.

*Amygdalar. dulc.* p. 15

*Aq. flor. Aurant.*,  
*Aq. Rosar.* ana 60,  
*Borac.* 1,

*Tct. Benz.* 2; 1—2 Theile mit  
 Wasser gem. z. Waschen.

*Amygdalar. dulc.* p. 15

*Aq. flor. Aurant.*,  
*Aq. Rosar.* ana 60,  
*Borac.* 1,

*Tct. Benz.* 2; 1—2 Theile mit  
 Wasser gem. z. Waschen.

*Eau Athénienne:*  
Tct. Quillajae p. 5'0,  
Glycer. 30'0,  
Rals. cit. Hoffm.,

*Aq. Colon.,*  
Tct. Ireos ana 40'0,  
Essent. Mosch. c. Ambr. 0'2.

b) Borax besitzt eine ausgesprochene antiseptische Wirksamkeit.

*Lotio cosmetica:*  
Natr. borac. g. 2'0—4'0,  
Aq. Ros. 100'0,  
Tct. Benz. 1'0.

*Lilionèse:*  
Borac. g. 10'0,  
Kali carbon. 5'0,  
Aq. Rosar.,  
Aq. Rub. Id. ana 80'0,  
Aq. Colon. 40'0.

Startin's  
Schönheitswasser.  
Borac. g. 10'0,  
Kali chlor. 5'0,  
Glycer. 50'0,  
Aq. Rosar. 250'0,  
Alkoh. 20'0,  
Ol. Ros. gtt. 1.

c) Kohlensäure und ätzende Alkalien.

Schönheitswasser:  
Kali carbon. g. 2'0,  
Tct. Benz. 10'0,  
Aq. Ros. 200'0; 1 Essl. dem  
Waschwasser beizumi-  
schen.

Ebenso:  
Natri carbon. g. 1'0,  
Borac. 5'0,  
Aq. dest. 100'0,  
Aq. Rosar. 200'0.

6. Schwefel bei Acne, Sycosis etc.

Kummerfeld's Wasch-  
wasser:  
Sulfur. praec. p. 12,  
Camph. 1,  
Muc. gm. arab. 6,  
subige et adm. Aq. Calcis,  
Aq. Ros. ana 100.

Schwefel, mit Zusatz  
von Essigsäure, auch gegen

Sommersprossen:  
Sulfur. praec. g. 25'0,  
Acid. acet. arom. q. s., f. pasta,  
Alkal. Schwefel-  
mittel:

Natr. hypoxulf.,  
Alum. ana g. 1'0,  
Aq. Rosar. 50'0,  
Aq. Colon. 5'0.

7. Säuren. Essig- und Citronensäure gegen Pigment- und andere Hautflecken; ferner Salicylsäure. Zur Beseitigung stinkender Fusschweisse Weinsäure (Anosmin-Fusspulver) und Weinstein rein oder mit Amylum. Wirk-samer Salicylsäurepulver. 1:9 Talcum ven.

*Pulv. salicylicus:*  
Ac. salicyl. p. 3,  
Amyl. Tritic. 10,  
Talc. venet. praep. 87.

Hühneraugen-  
Collodium:  
Ac. salicyl. p. 5,  
Tereb. ven. 3,  
Collodii 30.

8. Jodpräparate werden vorzugsweise zur Heilung von Frostbeulen, Ueberbeinen und auch zur Tilgung von

Pigmentflecken verwerthet (Jodtinctur, Jodglycerin, Jodcollodium).

9. Thonerdesalze. Alann in Lösung\* (1:20—50 Aq.) und essigsäure Thonerde (2—5:100 Aq.) gegen Frostschäden, übelriechende Localschweisse, Röthe und Follikularanschwellungen im Gesichte. Z. B.:

*Alumin.*,  
*Borac. ana g. 2'0*,  
*Aq. Ros. 150'0*,  
*Tct. Benz. 5'0*.

Ausserdem zeitweiliges Waschen mit Spir. camph., essigs. Thonerde oder fein geschlammtem Thon etc.

10. Bleipräparate. Bei Hyperidrose, chron. Eczemen als Deck- und Schminkmittel.

11. Zink- und Wismuthpräparate. Zinkoxyd, sowie basisch-salpetersaures Wismuth dienen als Heil- und Deckmittel gegen rothe Gesichtsflecke und nässende Ausschläge. Neuestens kam auch sulfocarbolsaures Zink gegen Sommersprossen und Hautflecke in Aufnahme.

Waschmittel:

*Zinci sulfocarb. p. 2*,  
*Glycer. 20*,  
*Aq. Ros. 30*,  
*Aq. Colon. 5*.

*Collodium antiephelidicum*:

*Zinci sulfocarb. 1'0*,  
*Alkohol. 5'0*,  
*Collod. dupl. 75'0*,  
*Ol. Citri 5'0*.

12. Quecksilberpräparate. Wirksame, aber leicht gefährliche Mittel, besonders gegen Sommersprossen und andere durch Pigment bedingte Hautflecke.

*Liquor Gowlandi*:

*Emuls. Amygd. amar. p. 190*,  
*Hydrarg. bichl. corr. 0'1*,  
*Ammon. chlor. 0'2*,  
*Spir. Vin.*,  
*Aq. Laurocer. ana 5'0*.  
Sommerspross.-Salbe:  
*Hydrarg. bichlor. ammon. 2*,  
*Ung. emoll. 50*.

*Hydrarg. praecip. albi*,  
*Bismuth. subnit. ana p. 1*,  
*Ung. simpl. 10*.

Auf Leinwand gestrichen.  
*Aqua oriental. Hebrae*:  
*Hydrarg. bichlor. corr. 0'05*,  
*Emuls. Amygd. amar. 300'0*,  
*Tct. Benz. 1'5*.

Mittelst Läppchen aufzulegen.

Oder:

13. Deck- und Färbemittel (Schminken). Zu weissen Schminken werden feine Stärkemehlsorten, venetianischer Talk etc. verwendet. Rothe Schminken werden durch inniges Mischen der Deckmittel mit Carmin, Saflorroth, Krapplack bereitet. Zum Bemalen der Gesichts- und anderer Hautadern werden wohl auch blaue Schminken (aus Berliner- oder Indigoblau in beliebigen Verhältnissen mit vanet. Talk gemischt) in Anspruch genommen.

B) Mittel zur Verschönerung des behaarten Theiles d. Kopfes. (Cosmetik der Haare.)

1. Mittel gegen trockene u. spröde Haare. (Haaröle u. Haarpomaden): *Ol. Amygd.*, *Ol. Olivar. provinc.*, *Ol. Acellanac.*, *Ol. Sesami* mit den oben geschilderten Duftmitteln. Weiters Rosenpomade (*Unguentum rosatum s. pomadinum*) der Pharm., Vanillen-, Jasmin- und andere Pomaden, welche mit duftenden Fettextracten versetzt werden.

*Crème neige:*

*Cer. alb. g. 4'0,*  
*Cetac. 8'0.*  
*Liquef. misce c. Ol. Amygd. 240,*  
*semirefrig. agit. c. Aq. Rosar.,*  
*Glycer. ana 2'0,*  
*Ol. Ros. gtt. 2.*

Haaröl (Essbouquet-Oel):

*Ol. Amygd. g. 25'0,*  
*Ol. Resed. 10'0,*  
*Ol. Violar. 20'0,*  
*Ol. Ros. aeth. gtt. 1.*

2. Mittel, die Haare zu fixiren und zu formen (Bandoline, Brillantine), bestehen aus dünnen, parfümirten Gummi- oder Traganthlösungen.

*Borac. g. 6'0,*  
*Gummi arab. 1'0,*  
*Aq. odor. 100'0,*  
*Spir. camph. 3'0.*

*Brillantine liquide:*

*Glycerini,*  
*Olei Ricini,*  
*Alkohol. ana p. aeq.,*  
*Olei odor. q. s.*

Oder:

*Gummi arab.,*  
*Sacchar. 15,*  
*Aq. Rosar. 100'0,*  
*Aq. Colon. 10'0.*

*Bandoline:*

*Tragacant. p. 1,*  
*Aq. Rosar. 20'0,*  
*F. mucil., adde:*  
*Carminii q. s.*

3. Mittel, fette Haare trocken zu machen. Waschen mit Seifenwasser oder Einpudern am Abend und Auskämmen des Morgens.

4. Mittel zur Entfernung von Kopfschuppen. (Vide *Seborrhoea capillitii*.) Borax und Soda (orientalische Kopfschuppen-Kräuteressenz), kohlen-saures Kali mit Wein-geist (Eau Athénienne), Ricinnsöl und Spiritus (Haaröl der Cleopatra). Hebra lässt bei Seborrhoe Waschungen mit Schwämmchen, welche in *Spiritus Aetheris benzoatus* (*Spirit. aether. 30'0, Tct. Benzoës 2'5—5'0*) getaucht sind, vornehmen.

5. Mittel zur Verhütung des Ausfallens der Haare und Förderung ihres Wachstums (Haarwuchsmittel).

1. Tonisch und adstringirend wirkende Arzneistoffe.

*Extr. Chin. g. 5'0,*  
*Tct. Canthar. 0'5,*  
*Ung. rosat. 50'0.*

Oder:

*Extr. Chin. p. 3,*  
*Tct. Catechu 5,*  
*Bals. Peru. 1,*  
*Spir. Vini 2,*  
*Ung. pomad. 100.*

Tanno-Chininpomade.

*Chinini puri p. 1,*  
*Acid tannic. 2,*  
*Tct. arom. ammon. 20,*  
*Ol. Olivar. 50,*  
*Cacao 100. — (Steege.)*



2. Weingeistige, ätherisch-ölige und balsamische Mittel: *Eau de Cologne*, Rosmaringeist, Franzbranntwein etc.

Hebra's Hauspomade:

*Bals. Peruv.* 2,  
*Ung. simpl.* 80.

Pincus' Salbe:

*Ol. Rusci*,  
*Spir. Vini conc. ana* 40,  
*Ol. Sabin. gtt.* 15,  
*Tct. Ambr. mosch.* 20.

3. Scharfstoffige Mittel:

*Tinct. Canthar.* 50,  
*Ol. Rosmar.*,  
*Ol. Lavand. ana gtt.* 10,  
*Aq. Colonn.* 500.

Ferner:

*Ol. Sabinæ* 1,  
*Spir. vin.* 25—30.

Zum Einreiben. (Pincus.)

4. Indifferenten Stoffe. Hieher gehören: Die Klettenwurzel (*Infus.*, *Extr.* und *Decoct.*), ferner das Kammfett aus *Ol. Ricini und Olivæ*.

6. Mittel gegen das Spalten der Haare, Abschneiden der Haarspitzen, Anwendung von Pomaden;

*Chinin. sulfur.* 1,  
*Acid. acet.*,  
*Acid. carbol. ana* 0.5,  
*Mixt. oleos. bals.* 200.

*Glycer.* 300,  
*Ol. Ricini* 1000 — *Liquor trichopathicus*.

7. Entfernung von Haaren an naturgemäss unbehaarten Stellen. Mechanisch durch Ausreissen derselben mittelst einer Cilienpincette oder stark klebender Pechpflaster (*Terebinth.* 4, *resin. Pini* 5). Chemisch wirkende Zerstörungsmittel sind: Aetzkalk und die Alkalien in ihren Verbindungen mit Schwefel, namentlich als Sulfhydrate, auch Operment (gelbes Schwefelarsen), doch nur in Mischung mit Aetzkalk wirksam, indem sich Schwefelcalcium bildet.

8. Haarfärbemittel. Zur Verhütung des Ergrauens haben schon ältere Autoren das Eieröl empfohlen, ebenso Ochsenklauenfett. Vegetabil. Haarfärbemittel: Grüne Walnusschalen, sowie unreife Wallnüsse färben alterbleiches Haar anfangs gelblich, nach einiger Zeit nussbraun und haltbar. Durch 10tägige Maceration des Presssaftes mit verdünntem Alkohol erhält man eine Wallnusstinetur zum Braunfärben nach vorheriger Waschung des Haares mit Sodalösung.

Mineralische Haarfärbemittel.

1. Salpetersaures Silber, meist in ammoniakalischer Lösung, mit oder ohne Kupfervitriol, um Haare dunkelbraun oder schwarz dauernd zu färben.

2. Wismuthpräparate färben, mit alkalischen und Schwefelmitteln (*Natrium sulfuratum*, *Natrum subsulfurosum*) in Verbindung gebracht, die Haare hell- bis dunkelbraun. Haarverjüngungsmittel: *Bismuth. subchlorat.* 17, *Natr. subsulfur.* 100, *Glycer.* 200, *Aq.* 700.

3. Kupfervitriol-, nach diesem Ferrocyankalium oder Calciumsulfhydrat-Lösung behufs Braunfärbung der Haare.

4. Uebermangansaure Kalilösung ertheilt dem Haare eine natürliche braune, nicht haltbare Färbung.

5. Essigsäures Eisen (*Liq. Ferri acet. 5%*). Das Chroma- come von Lohse besteht aus Nr. 1 einer Galläpfeltinctur und Nr. 2 einer Lösung von essigsäurem Eisen mit et- was Höllenstein und färbt die Haare braun bis schwarz.

6. Bleipräparate. So gesundheitsschädlich ihre An- wendung, sie finden trotzdem ihre Verehrer in dem Um- stande, dass sie bei ergrautem Haare die weissge- wordenen, je nach Beschaffenheit der Präparate und der Dauer ihrer Einwirkung in allen Schattirungen von Braun nachdunkeln, während das übrige dunkle Haar in seiner Farbe kaum alterirt wird.

7. Wasserstoffhyperoxyd. Die Anwendung desselben zur Blondfärbung des Haares ist ein unbedenkliches Mittel, welches in der Regel nur von Personen mit rothen Haaren in Anspruch genommen wird, um diese röthlichgelb oder hellblond zu färben. Solche Präparate sind das Golden Hair-Wash, Auricomus und Eau fontaine de jeunesse.

C) Mittel zur Pflege u. Erhaltung der Schönheit der Mundgebilde.

1. Lippen. Ein lebhafteres Roth ertheilt man den Lippen mit Hilfe rother Schminkwässer (*Alloxan. Pur purissimum*). Trockene aufgesprungene Lippen werden mit *Crème céleste*, Honigsalben, od. eigens bereiteten Lippenpomaden (*Unquen- tum labiale s. de uvis*), rothen Lippensalben etc. bestrichen.

2. Zähne und Zahnfleisch.

a) Zahnreinigungsmittel. Zu den milderer mechanisch wirkenden gehören: präparirte Holzkohle, am besten Lin- denkohle, kohlensäure und phosphorsaure Kalkpräparate. Stärkere: präparirte Austernschalen, Sepienbein, selbst Schachtelhalm und Bimsstein (chinesisches Zahnpulver). Um Zähne ohne Nachtheil chemisch zu reinigen, sind milde alkal. Mittel, wie Seife, Borax od. Soda anzuwenden.

1. Zahnpulver. Das einfachste und zweckmässigste Zahnpulver:

*Pulvis dentifr. simpl.:*

*Cretae praep. 40°0.*

*Pulv. Sapon. 5°0.*

*Ol. Ment. p. gtt. 4.*

*Pulvis dentifricius*

*albus:*

*Cretae praep. 40°0.*

*Magnes. carb.,*

*Rad. Ireos flor. pulc. ana 5°0.*

*Ol. Ment. pip. gtt. 4; Ph.*

*Austr.*

*Pulvis dentifricius*

*niger:*

*Pulc. Carb. lign. dep.,*

*Pulc. cort. Chin., Calis.,*

*Pulc. sol. Sale, ana p. aeq.;*

*(Ph. Austr.)*

*Pulvis dentifricius*  
*acidus:*

*Pulv. Tartar dep.,*

*Sacch. Lact. ana p. 200,*

*Lacc. Carmin. 20,*

*Ol. Ment. pip. 1; (Cod. fr.)*

*Pulvis dentifricius*

*Dr. Heider:*

*Oss. Sep. praep. 25°0.*

*Pulc. rhiz. Ireos.,*

*Mag. carb. ana 3°0.*

*Ol. Ment. pip. gtt. 3.*

*Pulc. dentifr. alka-*

*linus:*

*Natri bicarb. 10°0.*

*Talc. ven. praep. 40°0.*

*Carmin. 0°1.*

*Ol. Ment. pip. 0°2.*

2. Zahnpasten *Pasta dentifricia mollis und dura.**O dentine:*

*Pulv. Conch. mar. p. 100,*  
*Pulv. lap. Pumic. 5,*  
*Pulv. rhiz. Ireos. 15,*  
*Sapon. ven. 25,*  
*Lacc. in glob. 10,*  
*Sacch. 10,*  
*Glycer. 50,*  
*Ol. Menth. 2,*  
*Alcoh. 25,*  
*Aq. Ros. q. s. f. pasta.*

## Zahnpasta ohne Seife:

*Conch. praep. g. 50,*  
*Cret. praep.,*  
*Lacc. in glob. ana 100,*  
*Ol. Menth. pip. 0'5,*  
*Mucil. Tragac. q. s.,*  
*F. Pasta.*

3. Zahnseifen. Sie stellen im Wesentlichen aromatisirte Seifen oder Zahnpasten mit vorherrschendem Seifenzusatz dar.

*Talc. ven. praep. 150'0,*  
*Pulv. Sapon.,*  
*Sacch. ana 7'5,*  
*Gumm. arab.,*  
*Rubri Berol. ana 7'4,*  
*Ol. Menth. pip. 2'5,*  
*Glycer. 100'0,*  
*Aq. dest. q. s.*

Flüssige Zahnseifen sind Lösungen von Seife in spirituös-aromatisch. Vehikeln:

*Spir. sapon. p. 8,*  
*Glycer. 6,*  
*Ol. Menth. pip. 0'2.*

## 4. Zahntincturen. Zahntropfen.

*Spiritus ad dentes:*

*Acid. tannici p. 2,*  
*Alkoh. 30,*  
*Tct. Benz. 1,*  
*Ol. Menth. pip. 0'5.*

*Tct. Chinae dentalis:*

*Tct. Chinae p. 20,*  
*Tct. Kino.,*  
*Tct. Myrrh. ana 5,*  
*Spir. Cochlear. 10.*

*Elixirium dentifricium Heideri:*

*Ol. Menth. pip. p. 1,*  
*Aether. acet. 2,*  
*Spir. Vini 80,*  
*Glycerin 20.*

*Antiodontalgicum:*

*Spir. Cochleariae,*  
*Spir. Sinapis,*  
*Tinct. Spilanthes comp.,*  
*Tct. Pyrethri aa. p. acq.*

*Antisepticum:*

*Acid. salicyl. p. 4,*  
*Spir. Menth. 50;*  
 10–20 Tropfen in  $\frac{1}{2}$  Glas Wasser.

## Ferner:

*Creosot. p. 1,*  
*Spir. Menth. 50–100.*

## Oder:

*Acid. carbol. liq.,*  
*Ol. Menth. pip. ana gtt. 6,*  
*Tct. Myrrh. 30,*  
*Sacchar. q. solvitur.*

## Oder:

*Acid. carbol. p. 1,*  
*Tct. Quillajae 5,*  
*Aq. dest. 10.*

Einige Tropfen auf die angefeuchtete Zahnbürste zu träufeln.

δ) Zahnkitt gehört dem Gebiete der Zahntechnik an

Für temporäre Ausfüllung: Zahnwachs (*Ceratum dentale*) aus Wachs, Mastix u. a. Harzen, dann Gutta-percha mit Tannin, welche, durch Erwärmen erweicht, in die Zahnhöhle gepresst werden.

c) Zahnfleischmittel: Essigsäure Thonerde. Spirituöse Mittel (Kornbranntwein, Franzbranntwein, Rum oder gewöhnlicher verdünnter Weingeist).

1. Zahnfleischlatwergen (*Electuarium gingivale*).

Extr. Chin.,  
Extr. Ratanh. ana p. 5,  
Pulv. cort. Chin. fusc. 10,  
Aq. Cinnam. spir. q. s.;  
F. elect. spiss.

Oder:  
Pulv. Alum. p. 5,  
Pulv. Myrrh.,  
Pulv. rhiz. Ireos. ana 3,  
Mel. rosat. q. s.

2. Zahnfleischtincturen (*Tincturae gingivales*).

Tct. Myrrh.,  
Tinct. Chin. ana g. 2'0,  
Ol. Menth. pip. gtt. 6,  
Spir. Meliss. 100'0. — Oder:

Acid. carbol. g. 1'0,  
Ol. Menth. 0'2,  
Ol. Citri 0'1,  
Spir. Frumenti 150.

3. Mundhöhle. Mittel, den übelriechenden Athem zu verbessern. Chlorkalk, in Form von Pastillen (*Calcar. chlorat.* 2'0, Sacch. in pulv. 50'0, Amyli 5'0, Carmia. 0'1; mixt. adm. Mucil. Tragac. q. s.; form. trochisci pond. 0'2, mehrmals tägl. 1 Stück im Munde zergehen lassen), oder in Lösung (*Liquor Calcar. chlor.*), statt dessen auch *Liquor Natri chlorati*, als Mundwasser zu  $\frac{1}{2}$  Esslöffel in einem halb gefüllten Glase Wasser mit Zusatz von Weingeist (*Liq. Calcar. chlor.* 100, Alkoh. 10). Auch *Kali hypermangan* 1, Aq. dest. 40, zu 1 Theelöffel auf 1 Tasse Wasser und Boraxsäure in Wasser mit Zusatz von Weingeist und Glycerin, desgleichen essigsäure Thonerde.

Von Kaumitteln sind es die Nelken und der Kalmus, deren man sich zu diesem Zwecke bedient, im Orient die Terpentingallen (*Carobe di Giudea*). Zur Beseitigung üblen Athemgeruches vom Rauchen werden unter den Namen *Cachou de Bologne* (*Cachundé*), Pastillen (*Pastilles pour les fumeurs*) und Pillen (*Cachous aromatisés*) verkauft.

[Nach Bernatzik in Eulenburg's Real-Encyclopädie.]



## 5. Die Thermometrie am Krankenbette.

Die Constatirung der Eigenwärme mit Hilfe des Thermometers zu klinischen Zwecken ist von eminenter Bedeutung und bildet eine physikalisch-diagnostische Untersuchungsmethode, sowie die Auscultation oder Percussion. Die für den Praktiker höchst wichtige Methode der Thermometrie zeichnet sich eben durch grosse Exactheit und Einfachheit sowohl bezüglich der Technik als auch bezüglich der Resultate aus. Die Höhe der Körperwärme kann nämlich selbst bei ausserordentlicher Uebung durch Auflegen der Hand etc. auch nicht annähernd genau geschätzt werden, während der mit Ziffern bestimmte Stand der Körpertemperatur für Diagnose und Prognose, ja auch für therapeutische Eingriffe sehr verlässliche Anhaltspunkte bietet. Die kurze Zeit, die der Arzt den thermometrischen Messungen widmet, wird reichlich aufgewogen durch den Gewinn höchst werthvoller Anhaltspunkte. Ueberdies ist das zu Temperaturmessungen dienende Instrument, der Thermometer, so einfach und klein, dass mit dem ausgiebigen Gebrauch der in Rede stehenden Methode keine weiteren Unbequemlichkeiten für den Arzt verbunden sind.

Was vorerst den zu Körpermessungen am Krankenbette dienenden Thermometer betrifft, so soll dieser mit Quecksilber gefüllt und von mässiger Grösse, etwa 15—18 Ctm. lang sein. An den gebräuchlichen Thermometern sind blos die Temperaturgrade 30 bis 45 Celsius in der Weise verzeichnet, dass auch je  $\frac{1}{10}$  Grad noch deutlich ablesbar ist. Die Ablesung des Temperaturgrades hat stattzufinden während das Quecksilber-Reservoir des Thermometers an der betreffenden Körperstelle verharret, da in dem Momente der Entfernung die Quecksilbersäule fällt. Bei dem sog. Maximalthermometer jedoch kann die Temperatur noch lange Zeit nach Entfernung vom Körper abgelesen werden. Eine kleine Luftsäule, durch welche die Continuität der Quecksilbersäule unterbrochen ist, bewirkt, dass dieselbe bei Erwärmung steigt, wie bei jedem Thermometer; bei der Abkühlung jedoch bleibt die obere kleine Quecksilbersäule an der einmal erreichten Stelle, so dass noch nach längerer Zeit das Ablesen der Temperatur möglich ist. Erst ein leichter Stoss bewirkt ein Sinken der kleinen oberen Quecksilbersäule, resp. das Annähern an die mittlerweile zusammengezogene untere Quecksilberpartie. Dieser Thermometer ist selbstverständlich äusserst praktisch, aber auch etwas theurer.

An welcher Körperstelle soll die Temperaturmessung vorgenommen werden? Am bequemsten ist die



Temperaturbestimmung in der Achselhöhle. Nachdem diese zuvor wohl abgetrocknet wurde, hat man das Quecksilberreservoir in den Grund der Achselhöhle zu bringen und dann den Arm an den Thorax fest andrücken zu lassen. Der Thermometer muss hier 10–15 Minuten ruhig liegen bleiben. Verlässlicher und schneller erhält man das Resultat bei Einführung des Thermometers in das Rectum, resp. in die Vagina. Das Instrument soll wohl beölt, mit gehöriger Vorsicht, etwa 5 Ctm. weit eingeführt werden. In etwa 5 Minuten ist die höchste Temperatur am Thermometer bereits abzulesen. Es ist klar, dass die Temperaturmessung an letztgenannter Stelle minder bequem und decent ist, weshalb man in der Privatpraxis hier öfters auf Widerstand stossen dürfte. Empfehlenswerth ist daher dem Kranken, beziehungsweise den Angehörigen oder Wartpersonen die Einführung des Maximalthermometers zu überlassen, so dass der später ankommende Arzt, zumal bei verlässlichen Personen, am Thermometer selbst die Temperatur bloß ablesen, daher ganz genau erfahren kann. Die Temperatur im Rectum ist immer um  $0.5^{\circ}$  höher als in der Achselhöhle.

Die Messungen der Temperatur sollen täglich einmal, in zweifelhaften oder erheblichen Fällen jedoch zweimal vorgenommen werden. Selbstverständlich wird die Anzahl der Temperaturbestimmungen vermehrt werden müssen, wenn, sei es in diagnostischer Beziehung, sei es behufs therapeutischer Massnahmen, die Kenntniss des Temperaturverlaufes zu verschiedenen Stunden des Tages es erfordert. Am zweckmässigsten wird die Messung des Morgens zwischen 8–9 und Abends zwischen 5–7 Uhr vorgenommen.

Die Eigenwärme des gesunden Menschen ist im Allgemeinen eine constante; sie schwankt zwischen  $36^{\circ}$  und  $37.5^{\circ}$  Celsius in der Achselhöhle und zwischen  $36.5^{\circ}$  und  $38^{\circ}$  im Rectum. Diese Grade werden bei gesunden Menschen durch äussere und innere Einflüsse (Temperatur der Umgebung, Anstrengung, Nahrung etc.) weder überschritten noch erniedrigt. Die Ueberschreitung jener Grenze deutet auf Krankheit, ebenso wie die Beständigkeit der Temperatur ein Zeichen der Gesundheit ist. Man nimmt die normale physiologische Temperatur im gesunden Menschen zu  $37^{\circ}$  C. an. Die Körperwärme ist im Kindes- und Greisenalter im Allgemeinen höher, als in den mittleren Jahren. Bei ein und demselben Individuum ist die Temperatur gegen Abend am höchsten, am frühen Morgen am niedrigsten.

Die Eigenwärme des kranken Menschen variiert gewöhnlich zwischen  $35^{\circ}$  und  $43^{\circ}$  C. Das hier angegebene Maximum wurde nur selten und dann auch nur  $1^{\circ}$  oder  $1\frac{1}{2}^{\circ}$  überschritten. Dagegen beobachtete ma

schon öfter Fälle unter dem Minimum (Atonie), ja Temperaturen von  $30^{\circ}$  und darunter.

Die Zunahme der Eigenwärme tritt im Vereine mit anderen fieberhaften Symptomen auf, so dass man die Temperaturerhöhung als den Ausdruck des Fiebers annehmen kann; dagegen bezeichnet man die Abnahme der Temperatur, mit welcher Schwäche, kleiner Puls etc. verbunden ist, als Collaps. Die Thermometrie lehrt den typischen Temperaturverlauf bei gewissen Krankheiten (Typhus, Pneumonie, Malaria etc.), sowie die Exacerbationen und Remissionen, ferner febris continua, remittens, intermittens etc. Aber auch die Stadien der Krankheiten lassen sich aus der Temperatur ableiten, also: Stadium incrementi, acmes, decrementi.

Abnahme der Eigenwärme, also unter  $37^{\circ}$  C. tritt bei Cachectischen, Geisteskranken, mit organischen Herzfehlern Behafteten etc. auf. Bei derlei Individuen wird die Steigerung der Temperatur bis zu dem als normal angegebenen Grade schon als Fieber anzusehen sein.

Die Collapstemperaturen (unter  $36^{\circ}$  C.) sind:

- a) unter  $33.5^{\circ}$  als letaler algider Collaps,
- b) zwischen  $33$  und  $36^{\circ}$  als algider Collaps, wo noch Möglichkeit zur Erhaltung des Lebens vorhanden ist,
- c)  $35-36^{\circ}$  mässiger Collaps ohne besondere Gefahr.

Die Normaltemperaturen sind:

- a)  $36-36.5^{\circ}$  subnormale Temperatur,
- b)  $36.7-37.4^{\circ}$  gesichert normale Temperatur,
- c)  $37.5-38^{\circ}$  subfebrile Temperatur.

Febrile Temperaturen:

- a)  $38-38.4^{\circ}$  leichte Fiebersbewegung,
- b)  $38.5-39^{\circ}$  Abends bis  $39.5^{\circ}$  mässiges Fieber,
- c)  $39.5-40.5^{\circ}$  beträchtliche Fieber,
- d)  $40.6^{\circ}$  und darüber hochfebrile Temperatur.

Temperaturen, welche ein letales Ende mit Wahrscheinlichkeit anzeigen, über  $41.75^{\circ}$  C.

## 6. Qualitative Harnprüfung.

Für die gewöhnlichen Fälle der Harnprüfung zum Zwecke der Diagnose ist folgende einfache qualitative Prüfung genügend und bei richtiger Ausführung zuverlässig.

**Reaction.** Man ermittelt diese durch Prüfung mit Lackmuspapier.

**Sediment.** Falls der Harn ein solches hat, oder wenn er trübe ist, lässt man in einer nach unten zugespitzten Glasmensur absetzen und giesst den klaren Harn vom Absatz ab; ist dieser braun und verschwindet beim Erwärmen mit etwas verdünntem Aqua Ammoniac,

besteht der Absatz aus *Harnsäure*; verschwindet derselbe beim Erhitzen mit Wasser allein, so besteht er aus *harnsauren Salzen*.

Weitere Gemengtheile des Sedimentes sind mikroskopisch zu ermitteln.

**Specificisches Gewicht.** Hierauf ermittelt man in bekannter Weise das specificische Gewicht des klaren oder nöthigenfalls filtrirten Harns.

**Eiweiss.** Man erhitzt etwa 10 Gramm des klaren Harnes in einem Probirglase zum Kochen; hat der Harn keine saure Reaction, so setzt man vor dem Erhitzen 1 Tropfen *Acid. acetic. dilut.* hinzu. Entsteht dabei eine Trübung oder ein Niederschlag, so setzt man 3–4 Tropfen Salpetersäure hinzu; verschwindet die zuvor entstandene Trübung nicht, so ist Eiweiss vorhanden, da Erdphosphate, welche sich beim Kochen ausscheiden und die Trübung verursachen, sich beim Zusatz der Salpetersäure lösen. Als Supplement-Prüfung giesst man in ein enges Reagensglas etwa 5 Gramm Salpetersäure und schichtet darauf vorsichtig mittelst einer Pipette von dem klaren zu untersuchenden Harn. Eine an der Grenzschicht beider Flüssigkeitsschichten entstehende weisse Trübung bestätigt die Anwesenheit von Eiweiss.

**Zucker.** Bei eiweisshaltigem Harn ist dieses zuvor auszufallen; dazu werden etwa 100 Gramm Harn zum Kochen erhitzt und dabei Essigsäure tropfenweise bis zum Aufhören der Bildung eines weissen Niederschlages zugesetzt. Alsdann wird filtrirt.

Von diesem Filtrate oder von dem zu prüfenden eiweissfreien Harn werden in drei Reagensgläser, in jedes etwa 10 Gramm Harn gegeben; dann setzt man zu dem einen 5, zu dem zweiten 10 und zum dritten 20 Tropfen Kupfersulfatlösung (1:10), schüttelt jedes, und fügt dann soviel Natronlauge zu jedem, dass die etwa entstehende Trübung völlig verschwindet. Geben alle drei Proben hierbei klare hellblaue Lösungen, so erhitzt man alle drei zum Kochen; verblieb indessen in einer der Proben mit mehr Kupfer ein grünlicher Niederschlag, so lässt man diese unberücksichtigt und erhitzt nur die klargebliebenen Proben. Eine ziegelrothfarbige Trübung von Kupferoxydul beim Erhitzen erweist das Vorhandensein von Zucker.\*)

Ergibt diese Prüfung kein oder ein zweifelhaftes Resultat, so kann man folgende weitere Probe machen:

\*) Die Methode, soviel Kupfersalz zuzufügen, als der Harn zu lösen vermag, ist weit besser als das Prüfen mit Fehling'scher Lösung. Die Abscheidung des Kupferoxyduls tritt nur dann schön ein, wenn gerade die nöthige Menge Kupfersalz zugesetzt worden ist. Ein normaler Harn vermag, nach dem Zusatz von Natronlauge, nicht viel Kupfer in Lösung zu halten, ein zuckerhaltiger löst dagegen eine grössere, seinem Zuckergehalt entsprechende Menge.

10 Gramm alkalische Cyanquecksilberlösung\*) und 30 Gramm Harn werden kalt gemischt und bis zum Kochen erhitzt. Nach dem Absetzenlassen oder Filtriren wird eine kleine Probe der Flüssigkeit mit Schwefelwasserstoffwasser geprüft; tritt dabei braunschwarze Färbung ein, so ist noch Quecksilbersalz im Harn gelöst. Daraus ergibt sich, dass der Harn entweder zuckerfrei ist oder weniger als  $\frac{1}{10}$  Procent enthält — eine Menge, welche pathologisch kaum von Bedeutung ist. Bleibt die Probe aber klar, und ist somit alles Quecksilber reducirt worden, so ist damit das Vorhandensein von mehr als Spuren von Zucker erwiesen.

Ist der zur Untersuchung vorliegende Harn von ungewöhnlicher Farbe, roth, braun oder dunkelbraun, so ist als Ursache dafür auf folgende Stoffe zu prüfen:

**Blutfarbstoffe.** Man versetzt den Harn mit Natronlauge und erhitzt. Die sich ausscheidenden Erdphosphate reissen den Blutfarbstoff mit nieder und erscheinen roth, braunroth, in's Grüne spielend. (Von ausgeschiedener Harnsäure rother Harn wird durch Zusatz von Natronlauge farblos.)

**Gallenfarbstoffe.** Man schichtet vorsichtig Harn und Salpetersäure, der einige Tropfen rauchende Salpetersäure zugesetzt worden sind, über einander. Sind Gallenfarbstoffe vorhanden, so färben sich an der Berührungsstelle die Flüssigkeiten erst grün, dann blau, violett, roth und endlich gelb. Auf die grüne Färbung ist besonders zu achten, sie ist beweisend. Man kann auch auf einem Streifen Fliesspapier, den man mit dem Harn gut durchtränkt hat, und auf dem man dann einen Tropfen Salpetersäure aufsetzt, die eintretenden Färbungen gut beobachten.

**Gallensäuren.** Ein Streifen Fliesspapier wird in den mit etwas Rohrzucker versetzten Harn gebracht, dann getrocknet und mit einem Tropfen Schwefelsäure betupft. Es entsteht, sind Gallensäuren zugegen, eine schön violette Färbung. Man kann auch den Harn mit etwas Zucker in einer Porzellanschale eintrocknen und dann einen Tropfen Schwefelsäure darin umherschwenken.

[Nach dem Pharm. Kalender für 1887.]

## 7. Antiseptischer Wundverband des praktischen Arztes.

Die wichtigsten Verband-Utensilien, welche jeder praktische Arzt, zumal auf dem Lande, stets in Bereitschaft halten soll, sind:

1. Alles, was zur gründlichen Reinigung der Haut

\*) 10 Gramm Cyanquecksilber in Wasser gelöst und unter Hinzufügen von 100 Ccm. Natronlauge von 1 145 sp. Gew. zum Liter gebracht.



nöthig ist: Seife, Nagelbürste, Rasirmesser (letzteres kann durch ein scharfes Scalpell ersetzt werden); bei Leuten aus dem Arbeiterstande muss man zum Reinigen der Hände oder Füsse (bei Verletzungen) gewöhnlich noch Aether sulf. zu Hilfe nehmen.

2. Eine wohl verschlossene Flasche mit etwa 1000 Gramm starker (5%iger) Carbollösung: zur Desinfection der Hände des Operateurs, der Instrumente, der Haut und verunreinigter Wunden.

3. Eine Flasche mit 2–3000 Gramm schwacher ( $2\frac{1}{2}\%$ iger) Carbollösung zum Abspülen frischer, nicht verunreinigter Wunden; zum Durchtränken der Wattebäuschchen.

Carbollösungen kann sich der Arzt leicht selbst bereiten. Die krystallinische Carbolsäure ist in grösseren und kleineren Flaschen bei Droguisten und bei vielen Materialwaarenhändlern käuflich. Durch Zusatz einer geringen Menge (ungefähr des zehnten Theiles) Glycerin löst sich die kryst. linische Carbolsäure (bei gelindem Erwärmen) leichter. Dazu kommt reines Brunnenwasser, welches am besten vorher gekocht und dann etwas abgekühlt wurde.

Sublimat 1 : 1000 statt Carbollösung zu verwenden.

4. Jodoform in Pulver- und Stäbchenform je in einer wohlverschlossenen Flasche.

5. Ein Irrigator (nicht durch eine Wundspritze zu ersetzen). Man kann denselben improvisiren, indem man eine Flasche mit durchschlagendem Boden umkehrt und den Hals durch Vermittlung eines durchbohrten Korkpfropfes und einer kurzen Glasröhre in einen Gummischlauch (Drainrohr) münden lässt.

6. Ein Eiterbecken und mehrere flache Gefässe (am besten Waschschüsseln) zum Einlegen von Instrumenten, Schwämmen, Wattebauschen u. a.

7. Antiseptische Schwämme; 4–5 kleinere und ein grösserer werden gewöhnlich genügen. Sollten nicht ganz verlässlich desinficirte Schwämme zur Hand sein, so kann man sich anstatt deren kleiner Ballen aus Salicylwatte oder auch aus einfacher Bruns'scher Watte bedienen; diese Ballen werden in Carbollösung gelegt und vor ihrer Anwendung ausgedrückt.

8. Antiseptische Seide durch einstündiges Kochen in 5%iger Carbollösung hergestellt; in verschiedener Stärke auf Spulen aufgewickelt (Nr. 4 oder 5 zur Naht, Nr. 3 oder 4 zur Gefässunterbindung). Im Nothfall kann man ungebleichten Zwirn, Hanffäden oder ähnliches Material antiseptisch zubereiten.

9. Drainröhren (aus Kautschuk); verschiedene (4–6) Sorten mit der Lichtung von 2 bis 8 Mm.; von jeder Sorte ein  $\frac{1}{4}$ –1 Meter langes Stück. Die meisten der Drainröhren sind bereits im Vorhinein mit seitlichen Löchern zu versehen und liegen continuirlich in 5%iger Carbollösung.



10. **Jodoformgaze.** Diese bereitet man in einfacher Weise, indem man schüttern, nicht appretirten Calicot anregelmässig (taschentuchartig) zusammenfaltet und sodann mit Jodoformpulver reichlich bestreut. Den mit den desinficirten Händen gründlich verriebenen Stoff schüttelt man schliesslich behufs Beseitigung des überschüssigen Pulvers aus und bewahrt denselben im geschlossenen Gefässe (vgl. Mikulicz, Wr. Klinik 1882, 1).

11. **Bruns'sche Watte** (entfettete Baumwolle).

12. **Guttaperchapapier.** Als Ersatzmittel für Makintosh kann man auch Pergamentpapier nehmen.

13. **Organtinbinden.** (Nach Mikulicz.)

## 8. Rettungsversuche bei Ohnmacht und Scheintod.

Der Scheintod tritt ein: *a*) bei Vergiftungen (bes. Opium u. Alkohol, dann Kohlenoxydgas, Leuchtgas etc.), *b*) bei starken Verletzungen (Gehirnerschütterung), *c*) in Folge von Blitzschlag, *d*) in Folge von Störungen der Athmung (Erhängen, Ertrinken, Erfrieren, Erwürgen, Eindringen von fremden Körpern in die Luftwege etc.), *e*) durch grosse Blutverluste.

Vor Allem untersuche man die Herzthätigkeit. So lange das Herz schlägt, sind Rettungsversuche vorzunehmen. Kann innerhalb 5–10 Minuten kein Herzton gehört werden, so wird wohl jeder Rettungsversuch überflüssig sein. Vorgeschlagen wurde auch die Akidopeirastik (Middeldorpf), d. i. die Untersuchung, ob eine in der Gegend der Herzspitze  $\frac{1}{2}$  Zoll tief eingestochene lange Acupuncturnadel Bewegungen des Nadelkopfes nachweisen lässt. Ferner werden bei noch vorhandener Circulation durch das feste Anlegen einer Binde um eine Extremität die Venen an peripheren Theile derselben anschwellen und sichtbar werden. Ein mit einem Faden umschnürter Finger wird, so lange das Individuum noch lebt, bläulich roth gefärbt und schwillt an. Endlich wird das Auftröpfeln von brennendem Siegelack auf die Brust etc. eine reactive Röthe hervorrufen. Sicherheit erlangt man durch Reizung der Muskeln mittels des elektrischen Stromes und ferner durch Temperaturmessung. (Bei 37° C. ist der Tod zu constatiren.)

**I. Bei Behandlung des Scheintodes** wird vor Allem die Ursache desselben in's Auge gefasst und mit möglicher Raschheit beseitigt werden müssen. In zweiter Linie ist künstliche Respiration einzuleiten. Die Beschaffenheit des vorliegenden Falles wird übrigens den rasch sich orientirenden Arzt lehren, ob sein erstes Eingreifen der einen oder der andern Aufgabe zu gelten hat. D.

sofortige Fortschaffung aus der schädlichen Atmosphäre, beziehungsweise die Zufuhr frischer Luft ist besonders dringend, wenn das Individuum durch Einathmen abnormer Gasarten bewusstlos etc. wurde. Bei Ohnmacht (*Syncope*), hervorgerufen durch Schreck oder Aufregung, durch beengende Kleider oder Aufenthalt in heißen Localitäten: frische Luft, Lüftung der Kleider, kalte Bespritzungen, abwechselnd mit flüchtigem Abtrocknen, Waschung mit Essig etc.

Bei Vergiftungen ist die speciell (vide Seite 130) angeführte Therapie anzuwenden.

Bei Gehirnaffectionen (Traumen etc.), Lüftung der Kleider, Eisumschläge auf den Kopf, Hautreize (Sinapismen, heiße Tücher), Eisclystiere, starke Abführmittel, bei gesteigerter Gesichtsröthe Aderlass.

Beim Blitzschlag, Entkleidung, Frottirung der Haut, energische Bespritzung mit kaltem Wasser, Aderlass, Reizung der Geruchsorgane, spirituöse Einreibungen, scharfe Clystiere etc.

Beim Sonnenstich (*Insolation*), Kälte in Form von Umschlägen, Clystieren etc. Hautreize; bei starker Congestion Venaesection. Innerlich Analeptica.

Bei Erhängten nebst vorsichtiger Ablösung Hautreize, allenfalls Venaesection im Falle bedeutender Röthung des Gesichtes.

Bei Ertrunkenen, Beseitigung von Schlamm oder Sand aus Nase und Mund; Einhüllung in heiße trockene Tücher; Einleitung künstlicher Respiration durch längere Zeit.

Bei Erfrierungen vorerst die Transportirung in ein kühles Local. Vorsicht, damit die erstarrten Extremitäten nicht brechen; sodann vorsichtiges Frottiren mit Schnee oder nasskalten Tüchern, erst nach eintretender Körperwärme Beförderung in ein wärmeres Zimmer; künstl. Respiration, trockene Wärme, namentlich Frottiren der Haut mit heißen Tüchern, warme Clystiere etc., warmer Wein.

Fremde Körper sollen aus den Luftwegen beseitigt werden, sei es durch Aspiration mittelst eines in den Kehlkopf eingeführten Katheters oder durch Lagerung auf die Seite mit etwas abwärts geneigtem Kopfe. Schlundzange, Schlundsonde, Tracheotomie.

Blutungen werden zu stillen sein in einer dem betreffenden Organe entsprechenden Weise.

Bei Neugeborenen ist der Scheintod nach bekannten Regeln zu behandeln.

**II. Künstliche Respiration** muss in den meisten Fällen von Ohnmacht und Scheintod eingeleitet werden. Die Wiederbelebung kann bewerkstelligt werden:

a) *Durch Anregung zum Athemholen*, indem man die Nasenlöcher mittels einer Feder, eines Strohhalmes etc. reizt. Hierauf wird Gesicht und Brust des Verunglückten mit einem energischen Wasserstrahl

wiederholt bespritzt und jedesmal sofort mit einem Tuche flüchtig getrocknet.

- b) Durch directe Lufteinblasungen, entweder direct von Mund zu Mund (bei geschlossener Nase) oder besser mittels eines Katheters. Das Einblasen der Luft entspricht der Inspiration, während die Exspiration (Austreiben der Luft aus dem Luftwege) durch seitliche Compression des Thorax anzuregen ist.
- c) Nach der Methode von Marshall-Hall wird der Körper derart gelegt, dass das Gesicht dem Boden zugekehrt sei, wobei die Stirne leicht zu unterstützen ist. Nachdem nun die Seitentheile des Thorax und der Rücken mit den flachen Händen gleichmässig comprimirt wurden, dreht man den Scheintodten gegen die eine Seite und legt ihn bald darauf wieder auf's Gesicht. Die Compression soll die Exspiration, die Umdrehung die Inspiration ermöglichen. Diese Procedur möge etwa 15mal in der Minute wiederholt werden. Zugleich Hautreize an den Extremitäten.
- d) Nach Silvester setzt oder besser legt man den zu Belebenden mit erhöhter Brust und allenfalls gestütztem Kopfe in der Weise nieder, dass der vor dessen Kopfe stehende Arzt die beiden Arme heben und über dem Kopfe rasch einander nähern kann. Hierauf werden die Arme langsam gesenkt und an die Seitenfläche der Brust angedrückt, wobei gleichzeitig eine mässige Compression des Thorax stattzufinden hat. Die Hebung der Arme geschieht im Interesse der Inspiration, die Senkung derselben behufs Exspiration je 15mal in der Minute.
- e) Nach Max Schüler: Während der Pat. in horizontaler Rückenlage mit nicht erhöhtem Kopfe auf dem Bette liegt, greift der Arzt von oben her mit seinen beiden Händen unter den rechten und linken Hüftbogen, zieht dieselben kraftvoll in die Höhe und presst sie sodann wieder nach abwärts gegen die Bauchhöhle. Diese aufeinanderfolgenden Bewegungen haben in einem Tempo zu geschehen, welches dem natürlichen Rhythmus der Athembewegungen entspricht. Damit die Bauchdecke dauernd schlaff bleibe, ist ständige Hüft-Kniebengung erforderlich. Die Zunge muss dauernd aus dem Munde hervorgezogen werden.
- f) Nach Flashar: Um den Brustkasten wird von rechts nach links und von links nach rechts je ein Handtuch, das der Länge nach in mehr als Handbreite zusammengelegt ist, in der Höhe der Brustwarze so herumgelegt, dass jedenfalls die grössere Breite des Handtuches mehr unter als über den Brustwarzen zu liegen kommt. Während die Hand

tücher beiderseits sich eventuell krenzend, den Brustkorb umfassen, liegen die freien Enden desselben jederseits über dem Brustkorb hinaus, so dass zwei seitlich stehende oder knieende Personen die zwei Enden je eines Handtuches mit den Händen fassen können. Die Handtücher werden nun beiderseits gleichzeitig angezogen (Compression des Thorax) und nach zwei Secunden gelockert (Eintritt neuer Luft). Auch kann im Nothfalle die zweite Person dadurch ersetzt werden, dass die Handtuchenden an einem festen Gegenstand fixirt werden. Statt der Handtücher auch Gurten verwendbar.

## 9. Uebersicht

der officinellen, sowie der wichtigeren nicht officinellen Arzneimitteln, ihre Dosirung, Anwendung und Taxe.\*)

NB. Die nicht officinellen Mittel sind mit \* bezeichnet. Die mit † bezeichneten Mittel sind in der Tabelle für Maximal-Dosen.

\**Abrus precatorius* Sem. (Jequirity) 1; 50 Inf. Augenkrankheit

*Absinthii herba*. 10·0—15·0 ad 100—200·0; *sciss.* 50 = 5 kr., *pulv.* 10 = 5 kr. = 10 Pf. Extr. 1·5 p. die. 1 = 25 Pf.; *Ol. aeth.* 1—4 Tpf. p. dos.; *Tct. comp.* 15—20 Tpf. 3mal. tgl. 10 = 3 kr. = 15 Pf.

\**Acetalum*. (Dimethylacetal). Hypnoticum p. die 8—12·0 mit Gumm. ar. u. Aq. naphae.

\**Acetonum*, Spir. pyroacet. 5—10 Tpf. 3—4mal tägl. Reiz- u. Ableitungsmittel, Inhal. 1:100 10 = 15 Pf. *Acetum arom.* als Riechmitt., zu Mundw. 50 = 6 kr.; 100 = 80 Pf. *A. crudum* als Getränk 5·0 bis 30·0 auf 500 Aq. \**A. phenylatum*,

antisept. zu Räucherung., Waschung. *A. pyroign. rectif.*, äusserl. 5—10·0 auf 100·0 Aq. 50 = 6 kr.; 100 = 20 Pf. *A. Scillae* v. *Scilla*.

*Acidum acet. conc. purum*, Aetzm., Riechm. 10 = 4 kr. = 10 Pf., verdünnt in u. äusserl. *A. acet. dilutum*, verdünnt als Getränk, Mundw., Clysmata etc. 50 = 5 kr.; 10 = 5 Pf. \**A. acet. trichlorat.* als Aetzm. in 2—5·0; 100 Mixt.

† *A. arsenicosum* (Arsenicum album). Innerl. 0·05 auf 500·0 Wasser.  $\frac{1}{2}$ —1 Essl. 2—3mal tägl. Aeusserl. als Ungt. 0·15—0·30 a. 20·0 Fett, zu Zahnp. 0·01 = 1 kr.; 10 = 10 Pf.

† *Solutio arsenicalls Fowleri* in 90 Th. 1 Th. Ars.; 90 Tpf. enth. 0·08 Arsenik;

\*) Die Preise in Kreuzern = kr. beziehen sich auf die Pharmac. austriaca, die in Pfennigen = Pf. auf die Pharmac. germanica.



- p. die 0·4 od. 7 Tpf. höchst.  
1·2 p. die 1 = 1 kr.; 10 = 15 Pf. \*Sol. arsen. Bietti (Ammonii ars. 1 Th. auf 400 Th. Aq.) in 5mal grösserer Dose als Sol. Fowleri. — \*Solutio Donovanii zu 0·5 bis 2·0 p. die. — Solutio Pearsoni 6fache Dos. im Vgl. zu Sol. Fowleri. Inn. zu 40 Tropfen. — \*Pilulae asiaticae 1 Pille enthält ca. 0·02 Ars.
- A. benzoicum** v. Benzoe.
- \***A. boricum**. Inn. 0·25—1·0 in Pill., Pulv., Sol. Aeuss. als Antisepticum 2—4 $\frac{1}{10}$ . — Borlint, Borsalbe. 10 = 10 Pf.
- \***A. boro-salicylicum** äuss. wie Salicylsäure 1:100 Glycer.
- † **A. carbolicum**. Aetzm. u. Antiseptic. Aeusserl. 1·0 auf 10·0 bis 400 Glycerin, Alcohol, Aq., Salbe od. Oel; int. 0·01—0·05; auch zu subcut. Inject., Inhal. 0·10 : 10·0. 10 = 4 kr. = 10 Pf.
- \***A. chlo-ontrosom** (Aq. regia) zu Bädern, Waschungen; Aetzmittel.
- A. chromicum** als Aetzm. pur oder 1:20 Aq. 1 = 3 kr. = 5 Pf.
- \***A. chrysophanicum** (Chrysarobin) in Salben 1:5—15 1 = 15 Pf.
- A. citricum**, inn., zu Limonade u. Brausepulver, äusserl. zu Pinselung bei Diphth. 10 = 7 kr. = 30 Pf.
- A. cubebicum** 0·3—0·5—0·75. mehrm. tgl. in Pill. od. Bol.
- A. formicicum** pur als Aetzm.; verdünnt zu Waschungen. 10 = 10 Pf.
- \***A. gallicum**. (Adstring.) In Pulv., Pill., Sol. 0·1 bis 0·5 p. dos. äuss. 2—5; 100 Aq. 10 = 25 Pf.
- A. Halleri** s. Ac. sulf.
- \***A. hydrobromicum** b. Krampfhusten, Vomitus gravidar. in starker Verdünnung 0·5—1·0—2·0. Aeusserl. Aetzmittel. 10 = 15 Pf.
- † **A. hydrocyanicum** innerl. zu 0·01—0·05. 2—3 mal tgl. 1 = 5 Pf.
- † **A. hydrocyanic.**  $\frac{1}{2}$ —1 Tpf. p. dosi; p. die. 0·20. Aeusserl. 1:10 Salbe. 1 = 5 Pf.
- A. hyperosmicum** in Sol. 1% subcut; gegen Neuralgie in Pillen 0·001—0·015. 0·01 = 15 Pf.
- A. kreosotinicum** wie Salicyls. 5—8·0 zur Herabsetz. der Temp.
- \***A. lacticum**, 5·0—10·0 tgl. mit Wasser, Zucker etc., äusserl. geg. Pseudomembranen (Croup), Lupus. Zu Inj., Inhal. 15 Tropfen auf 30 Th. Aq. 10 = 40 Pf.
- A. muriaticum conc. p.** Aetzm. mit'els Glasstabes; äuss. zu Waschungen; inn. 0·25 bis 1·0 in Pillen Mixt. 10 = 3 kr. = 5 Pf. **A. mur. crudum.** (Spir. Salis fumans). **A. muriat. dilutum p.** 5·0—10·0 auf 800·0 Flüssigkeit p. die. Aeuss. zu Mundw. 2·0 bis 4·0 auf 150·0 Aq. 50 = 9 kr.; 10 = 5 Pf.
- A. nitric. conc. purum**, Aetzm. 10 = 2 kr.; 10 = 5 Pf. **A. nitr. crudum** 100 = 9 kr. = 30 Pf. \***A. nitric. fumans** noch einm. so stark. zum Aetzen 10 = 10 Pf. **A. nitr. dil. purum** 5—15 Tpf. p. d. verdünnt als Getrk. so = 8 kr.; **A. chloronitr. Aq. regia** (A. nitr. 1 Th. A. mur. Th.) äusserl. zu Bädern Waschungen 5:100. 1 = 5 Pf.



**A. phosphoricum.** Aetzm. Inn. in Mixtur 10–30 Tpf. 3 bis 6mal im Tage, 10 = 10 kr. = 5 Pf.

\***A. picronitricum** 0·10–0·30 p. dos.; p. die 1·5 ! in Pill. Aetzmittel. 10 = 40 Pf.

\***A. pyrogallicum** i. Salbenform 1 : 10 : 20, in wäss. Lösung 1 : 40, auch als Aetzmittel. 1 = 10 Pf.

**Acid. salicylicum**, innerlich 0·5–1·0 p. d. in Oblaten; Gargarysma 1% in Aq.; äusserl. auf Wunden, Geschwüre in Lösung wie 2 : 100 zu Inj.; Streupulver 1 : 5 Amyl. 1 = 3 kr. = 5 Pf. **Natrum salicyl.** 3·0 bis 5·0 p. d. 10 = 45 Pf.

\***A. sclerotinicum** (v. Secale corn.) 0·05–0·10 subcut.

\***A. succinicum** inn. 0·15–0·7 in Plv. od. Sol. 1 = 5 Pf.

**A. sulfuricum conc. purum.** Inn. in Säften. Mxt. 2–6 Tpf. p. dos., 3–6mal tgl. Aeuss. als Aetzm. 10 = 2 kr. = 5 Pf. **A. sulfuricum dilut.** Inn. in Mixt. 2·5–5·0 auf 500·0 als Getrk. Zu Gurgelwasser 2·0–5·0 auf 200·0. 50 = 5 kr.; 10 = 5 Pf. **A. Halleri** (Elix. acid. Halleri). 5–20 Tropfen 4–6mal tgl. Elixir. Vitrioli Mynsichtii 0 bis 50 Tpf. tägl. 4–6mal.

**A. tannicum** (Tanninum). In Pulv., Pillen, Sol. 0·01 bis 0·10, 4–6mal tägl. Zu Einspritz. 1 : 20·0–100·0 zu Bepinselungen mit Glycerin. Inhal. Salbe. 5 = 16 kr.; 10 = 15 Pf.

**A. tartaricum.** In Pulv., Saft, Sol. 0·2–0·5 alle 2–3 Stunden. 10 = 5 kr. = 15 Pf.

**A. valerianicum** 0·5–1·0 in Mixt. 1 = 10 Pf.

**A. thymolicum** v. Thymol.

†**Aconitum.** Tub. Das Extract in Pulv., Pill. 0·006 p. dos., zu Einreib. 1 : 20 Salb. Spir. Glyc. 1 = 7 kr. = 15 Pf. †**Tinct. A.** 15 Tpf. 3mal tgl. auch zu Einr. 5 = 3 kr.; 10 = 15 Pf. †**Aconitum** inn. zu 0·001–0·004 in Pill. u. subcut. 0·01 = 3 kr.; = 5 Pf.

**Acorus** v. Calamus.

†**Adonidinum**, Glykosid aus Adonis vernalis. Diureticum.

**Aether aceticus**, äusserl. inn. 5–20 Tropfen 2–3mal tgl. 10 = 17 kr. = 10 Pf. **Ae. sulfuric.** (Analepticum.) In Mixt. oder mit Zucker als Tropfgeist 5–20 Tpf., 2 bis 6mal tgl. Riechm. zu Inhal. zu localer Anaesthesia. 10 = 17 kr. \***A. amylo-nitrosus** Salpetrigs. Amylaether = Amylnitrit 1–2 Tropfen zu Inhal. gegen Migräne 10 = 55 Pf. **Ae. camph.** (Tr. aeth. camph.) Aeuss. zu Einreib. als Antispasmodicum, auch als Odontalgicum. \***Ae. chloratus** 15–30 Tpf. äuss. als Anaestheticum. **Ae. depuratus** inn. 5–15 Tropf. auf Zucker. mit Ae. Petrolei vermischt zur Local-Anaesthesia. 10 = 5 kr. **Ae. iodatus** 1 = 10 Pf. \***Ae. nitricus** alcool. 10–30 Trpf. zu diuret. Mixt. \***Ae. ozonatus** (Analept.) wie Aeth. acet. \***Ae. hydrojodicus** (= Aethyle jodata) zu Einathmungen. \***Ae. Petrolei** inn. 5–15 Trpf. äusserlich zu Einreib. Salbe. Anaestheticum. 10 = 5 Pf.

\***Aethylum bromatum** 10 bis 20 Trpf. in Aq. Hypnoticum. **Ae.** (Elaeum) chloratum s. Liq. hollandic. als locales Anaestheticum 10

bis 3'0 zu Einreibung. 5 bis 20 Tröpf. zu Inhal.  $\frac{1}{2}$  = 10 Pf.  
**Ae. jodatum** 5—10 Tropfen zu Inhal., Salbe 1:5-10 Fett. 1 = 9 kr.

**Agaricus Chirurgorum**, Blutstillungsm. 50 = 15 kr.

**\*Agaricinum** in Pulv., Pill. auch subcut. 0'50 auf 100 Pill. 1—2 St. Abends gegen Nachtschweisse der Phthisiker. 0'01 = 1 kr., 0'1 = 5 Pf.

**Aloë lucida**, Purgans. In Pulv. oder Pill., 0'02—0'10, tägl. 2—3mal. Als Clyisma 0'5—1'0, Salben 1:5. 50 = 8 kr.; 100 = 50 Pf., pulv. 10 = 3 kr. = 10 Pf. **Extr. A. aquos.** 5 = 6 kr.; 1 = 5 Pf., ebenso **Tot. A. simpl.** und **comp.** selten inn. zu 8—20 Tröpf., rein oder in Mixt. 10 = 10 Pf. **\*Aloinum** subcut. inn. 0'15—0'2 in Pillen.

**Althaea**, Rad. v. Hba. 5'0 bis 10'0 auf 200'0 hba., 50 = 8 kr.; rad. scias., 50 = 8 kr.; 10 = 5 Pf., rad. pulv. 10 = 6 kr. = 10 Pf. **Species A.** zu Bähungen 50 = 8 kr. **Spec. pectorales** 50 = 9 kr. **Syr. Alth.** 10 = 3 kr. = 5 Pf.

**Alumen**. In Pulver 0'15—0'75, alle 2 Stunden. Zu Einspritz. 5'0—10'0 auf 500'0; Augenw. 0'06—0'12 auf 30'0. Streupulv. allein oder mit Amylum 50 = 4 kr.; 100 = 20 Pf., pulv. 10 = 2 kr. = 6 Pf. **Alumen ustum**. Bloss äuss. als stypt. Streup., 50 = 6 kr., pulv. 10 = 3 kr. = 5 Pf.

**Alumina hydrica** 0'15—0'5 p. dos. Aeuss. Streupulver. 10 = 29 kr. = 50 Pf. **A. sulf.** 10 = 20 Pf.

**\*A. acetica** u. **sulfur.** 1'0 bis 2'0 in schleim. Vehikel.

**\*Ambra grisea** 0'15—0'8. 0'1 = 90 Pf. Tinct. 10—20 Tröpf.

**Ammonia.** (A. pura liquida.) Inn. 5—10 Tröpf., in schleim. Vehikel. 1'5—2'0 auf 200'0. Aeuss., Riechm. 50 = 7 kr.; 10 = 10 Pf. **Spir. salis amm. anis.** 2—5. o. p. d. in Mixt.

**Ammoniacum (gummi) depur.** In Pillen, Emuls. mit Eiertotter, Latw. 0'5—1'0, 3mal tägl. 50 = 11 kr.; 10 = 20 Pf. subt. pulv. 10 = 5 kr.

**Ammonium aceticum sol. dll.** (Spir. Mindereri.) Inn. in Tröpf. Mixt., schleim. Tränken 10'0—15'0 p. die, 10 = 5 kr. **\*A. arsenicosum** 0'0, auf 30'0 Aq. davon 10 bis 20 Tropfen. **\*A. benzoicum** 0'05—0'8 p. dos. in Mixt. 1 = 5 Pf. **\*A. bromatum** bei Epilepsie 5'0 p. die, bei Tussis conv. 0'1 bis 0'2 mehrmals täglich. 10 = 20 Pf. **Amm. carbon.** Inn. 0'1—0'5 in Pulver, Pillen 2'0—5'0 p. die in Sol. Aeuss. als Riechm. zu Liniment. 50 = 9 kr.; 10 = 15 Pf. Das Liniment. saponatocamphor., Opodeldoc, als Einreibung 2'0—5'0 für einmal. 50 = 14 kr. — **Amm. chloratum dep.** s. Sal. amm. depur. wie kohlens. **Amm.** 10 = 3 kr. = 5 Pf. — **\*Amm. citricum.** Wie A. acet. — **\*Amm. jodatum.** 0'10—0'30 p. d. 3—4mal tägl. n. zu Einreib. 1:20. 1 = 16 Pf. — **\*Amm. phosphor.** 1'5 bis 3'0 als Antarthrit., sodorific., ferner gegen Lithiasis. 10 = 20 Pf. — **\*A. sulfuratum** 2—4 Tröpf. mehrm. tägl. **\*Amm. valerianicum** in Sol. 0'15 auf 100'0 auf

Antineuralgicum. 10 = 100 Pf.

*Amygd. amarae.* (Sedat.) 3 bis 12 St. Zus. zu Emuls. 1: 10 bis 25. 50 = 12 kr.; 10 = 10 Pf.

— *Aq. amygd. am. conc.* 10 bis 50 Tpf. dil. theelöffelw. conc. 5 = 2 kr.; 10 = 15 Pf., dil. 10 = 1 kr.; 100 = 15 Pf.

*Amygd. dulces* zu Emuls. 10'0 auf 100'0. 50 = 10 kr.; 10 = 10 Pf. Emulsio am. z. Ge tränk. — *Ol. A. dulc.* 50 = 30 kr.; 10 = 15 Pf. Syr. am. Corrigenens. — \**Amygdalinum* 0'06 einer Mandel-Emulsion zugesetzt, entspricht 30'0 Aq. Laurocerasi. 1 = 30 Pf.

\**Amylnitrit* v. Aether amylo-nitr.

\**Amylum jodatum.* (1 Jod 60 Amylum) in Pulv. 0'50—2'50 p. dos. mehrm. tgl. gegen Syphilis.

*Amylum nitrosum* = Amylnitrit.

\**Amylum Marantae* (Arrow-root) 5'0—15'0 auf 400'0 Flüssigkeit. 50 = 16 kr. 10 = 5 Pf. Am. tritici zu Streuplv., Clystieren. 50 = 8 kr.; 100 = 30 Pf.

\**Anacahultae lignum.* (Adstringens.) In Dec. 15'0—30'0 auf 500'0 Aq.

\**Anda assu* Oleum Abführm. 5 Tropfen inn.

*Andira inermis*, Wurmmittel in Pulv. Dec. od. Extr. fl.

\**Angelicae Rad.* Inf. 10'0 bis 20'0 auf 300'0, scias. 50 = 9 kr.; 100 = 45 Pf., subtpulo. 10 = 8 kr. = 10 Pf.

*Anisum stellatum*, Samen-Pulv. 1'0—3'0 p. dos. Inf.

5'0—10'0 fruct. 50 = 20 kr.; 10 = 10 Pf. rud. t. 50 = 25 kr.;

subtpulo. 10 = 8 kr. = 15 Pf. *Ol. A.* 1 = 4 kr. Spir.

t. 50 = 2 kr.

*Antidotum Arsen.* = Liq. ferr. sulf. oxyd. 60'0 Aq. 120'0, mixtis adde Magnes. ust. 7'0, Aq. comm. 120'0.

*Anthracokali simpl.* 0'1—0'3 öfter tgl. bei Scrophulose.

Aeuss. 1: 25 Salbe. 10 = 50 Pf. *A. sulfuratum* ebenso.

\**Antihydropinum* Pulv. von Blatta or. inn. Inf. 5: 100

p dos. 0'01 gegen Hydrops. *Antimonum* v. *Stibium*.

\**Antipyrinum* vorzügl. Antipyreticum inn. 1—2'0 3mal tägl.; auch subcut.

†*Apomorphinum hydrochl.* 0'001 bis 0'005 p. d. als Expectorans; 0'10—0'20 als Emeticum zu subc. Inj. 0'01 = 4 kr.; 0'10 = 25 Pf.

†*Aqua amygdal. amar.* 10—40

Tropfen in Sol. mehrmals tägl. p. dos. 2'0 p. die 8!

Aeuss. zu Clyst., Inhal. 5 = 2 kr.; 10 = 15 Pf. Aq.

am. dil. 1 Theel. mehrmals tägl. 10 = 1 kr.; 100 = 15 Pf.

Aq. aromat. zu Einreib. Waschung. 50 = 6 kr. 10 =

5 Pf. Aq. Calcis, inn. als Antacidum 50'0 mit Milch,

äuss. zu Mundw. bei Verbrennungen mit Ol. Lini

100 = 2 kr. = 5 Pf. Aq. carminativa, Windwasser,

Gegen Blähungen. Dosis: Kaffeelöffelw. auf Zucker,

50 = 6 kr., ebenso Aq. camellitarum. Aq. chloroformiata als Antispasmod.

u. Sedat. in 100 Th. etwa 1 Th. Chlorof. Aq. Chlori

äuss. Desinficiens; inn. 5—15 p. d. in Mixt. \*Aq.

foetida antihysterica. 5'0 bis 10'0 in Mixt. od. allein.

10 = 10 Pf. Aq. Goulardi zu Umschlägen. 100 = 6 kr.

1 = 5 Pf. †*A. Laurocerasi* wie

aq. amygd. am. 10 = 8 kr. = 15 Pf. *A. laxat.* v. v. Senna

- \*Aq. phagadaenica lutea** (Hydr. mur. corr., Pulv. 0'1, Aq. calcar. ust. 30'0) u. **Aq. phagadaenica nigra** (Calomel. 2'0, Opii pulv. 2'5, Aq. calcar. 100'0). Aeuss. gegen syph. Geschwüre. 100 = 30 Pf. **Aq. picis** (Pix l. 1 Aq. ferv. 10). 100 = 20 Pf. **Aq. purgativa**. (Eau purgat. gazeuse.) Besteht aus Natr. phosph. cryst. 40'0, Natri bicarb. 5'0, Aq. destill. 625'0, Acid. citr. 10'0. **Aq. rosarum** 50 = 5 kr. **\*Aq. vulner.** Thedeni aus Acet. crud. 30'0. Spir. v. rectif. 18'0, Acid. sulf. dil. 6'0, Mell. dep. 12'0. äuss. auf wunde Stell. 100 = 35 Pf.
- Araroba** v. *Ac. chrysophan.*
- Arbutinum** v. *Uva ursi* in Pulv. Inf. 3—4'0 p. die. 0'1 = 3 kr. = 10 Pf.
- Arcanum dupl.**, s. *Kali sulf.*
- † **Argentum nitricum fusum et crystallis.** Innerl. sehr selten in Sol. od. Pill. zu 0'01 bis 0'05 2—3mal. Aeusserl. als Aetzm. in Subst., als Sol. zu Einspritz. etc. 0'05 bis 0'15 auf 20'0; als Ungt., als Augenw. *cryst.* 1 = 13 kr. = 25 Pf., *fus.* 1 = 17 kr. = 25 Pf. **Arg. nitric. cum Kali nitr.** (Lapis mitig.) 1:2 milder wirkt Aetzm. 1 = 8 kr. = 10 Pf. **Arg. acet.** bei Tabes subcut. 1<sup>o</sup>/<sub>100</sub>.
- Argilla, Bolus alba.** Pillenmasse, zu Streup., Zahnp., zweckm. für Arg. nitr. 100 = 40 Pf.
- Arnica.** Flor. Inf. 5'0 auf 100'0 p. die. 50 = 6 kr.; 10 = 10 Pf. Fol A. 50 = 6 kr. Rad. A. in doppelt so grosser Dose. 50 = 8 kr.; 10 = 10 Pf. Tot. A. als Mundw. od. Einreib. 10 = 3 kr. = 15 Pf.
- Extr.** 0'3—0'5 p. dos.; **Oleum** 1—4 Tpf. mehrm. tägl.
- Arrow-root** s. *Amyl. Marantae.*
- Arsenicum** v. *Acid. arsen.*
- \*Arsen. jodat.** zu 0'2—0'4 2mal tägl. geg. Carcinom in Salbe 0'5:10 — **\*Arsj.** sulf. als Ungt. mit Aetz- kalk 0'3—0'6 auf 30'0 Fett. — **Pulv. ars. cosm.** vide Nr. 199, pag. 14. Aeuss. als Pasta oder Streup.
- \*Artemisia vulg.** Rad. fibrillar. 5'0 inn. gg. Epilepsie vor d. Anfall, *pulv.* 10 = 10 Pf. Extr. A. 0'2—0'5 p. dos.; Herb. A. wie Absinth.
- Asa foetida.** (Gummi resina dep.) in Pulv. 0'3—1'0 p. dos. 2—3mal tägl.; od. 2'0 bis 5'0 auf 20'0 Spir. Mind. und 200'0 Aq. arom.; zu Clyst. 50 = 14 kr.; 10 = 16 Pf. Tot. 20—30 Tpf. p. dos. mehrm. tägl. u. in Clyst. 10 = 15 Pf. **Aq. anti-hyst. foet.** Innerl. kaffee-löffelw. od. als Riechmittel 10 = 10 Pf.
- \*Asarum canadense** (Aromaticum Tonicum.) Pulv. 2'0 bis 5'0 Tinct. 3'0—12'0.
- Aseptolum** wie *Salicyls.* fäulnisswidrig in Sol. 1:300 z. Desinfection.
- \*Asparagus, Syrup. turionum** 1 Essl. 2—6mal tägl. Extr. rad. 1'5—8'0 tägl. in Pillen.
- \*Asparaginum** 0'3—0'6 p. dos.
- \*Aspidospermum.** Alcaloid v. *Quebracho.*
- † **Atropinum sulf.** 1/2—2 Mgrm. p. dos. u. 6 Mgrm. p. die! in Sol., Pulv. od. Pillen. 0'05 auf 5'0 Aq. zur Pupillenerweiter., zu subc. Inj.; Salben u. Linimenten 1:200. 0'01 = 2 kr. = 5 Pf. **A. valerianum**, ebenso 0'01 = 5 Pf.



**Aurantium.** (Flor. Naphae.)

In If. von 5'0—10'0 auf 2 bis 3 Tassen W. tägl. 10 = 20 Pf. Folia A. ebenso 50 = 12 kr., s. pulv. 10 = 15 Pf. In If. 10'0—20'0 auf 200'0 esslöffelw. 10 = 10 Pf. Cort. od. Flav. A. In Pulv. 0'3—1'0 2—3mal. Inf. 5'0 b. 10'0 auf 200; esslw. Cort. sciss. 50 = 8 kr.; 10 = 25 Pf., flav. sciss. 50 = 36 kr. s. pul. 10 = 11 kr. = 30 Pf. Ol. a. cort. 1 = 6 kr. Ol. aur. flor. 1 = 70 kr. = 80 Pf. Syrup. A.  $\frac{1}{2}$ —1 Essl. 2 bis 3mal oder als Corrigens 20'0—40'0 auf 150'0 Col. 10 = 3 kr. = 15 Pf. Tot. A. 10 = 4 kr. = 25 Pf. Aqua Naphae Corrig. 50 = 21 kr.; 100 = 30 Pf.

**Auro-Natrium chloratum**, inn. 0'003—0'006. 1—2mal tägl. Pulv., Pill. Sol.; äuss. zu Einar., Salbe. 0'1 = 5 Pf.

**\*Aurum chloratum** 0'06 auf 200'0 Aq. dest. — **\*A. cyanatum** inn. 0'005—0'01 p. dos. — **\*A. jodatum** 0'005 bis 0'1. Aëuss. 3'0—6'0 auf 30'0 Fett. — **\*Liquor aurimuriat.-natronat.** als Aetzmitt. — **\*A. oxydatum** 0'01 bis 0'06 p. dos.

**\*Ballota lanata** Fol. Inf. u. Det. 20—40 : 300.

**Balsamum Copaiv.**, s. Copaiv.

— **\*Bals. Gurjun** wie Copaiv. 0'5—1'0. 10 = 6 kr. = 20 Pf.

— **Bals. Peruvian.** 0'3—1'0 in Pill., Bolus, Emuls.; äuss. zu Einar. pur oder in Salben. Spir.-Lösung 10 = 15 kr. = 35 Pf. — **Bals.**

**Tolu** inn. Corrig. Excit. 10 = 15 Pf. — **B. vitae Hofmann.** 5—10 Tropf. p. dos. ; äuss. als Riechm. zu cosmet. Waschungen. Einreib. etc. 10 = 7 kr.

**\*Bebeerinum sulf.**, statt Chin., inn. 0'03—0'25 mehrm. tägl. Pulv., Pill. 0'10 = 6 kr., 1 = 50 Pf.

**†Belladonna.** Rad. 0'01—0'04 p. dos. in Pulv., Pill. Inf. 1'0—3'0 auf 200'0. sciss. 10 = 2 kr. = 10 Pf.; pulv. 10 = 5 kr. = 15 Pf. **†Extr. rad. B.** 0'01 bis 0'12 p. dos. ad 0'2 p. die! in Pulv., Pill. 1 = 8 kr. = 20 Pf. Lös. **†Folia B.** nur halb so wirks. als rad.; äuss. in Inf. 1 : 25 zu Inj., Mundw. Klyst.; sciss. 10 = 2 kr. = 10 Pf., pulv. 10 = 4 kr. = 15 Pf. **†Extr. fol. B.** 0'01 bis 0'10 p. dos. 1 = 8 kr. **†Tinct. B.** 2—5 Tropf. ad 0'5 p. dos. u. ad 3'0 p. die 5 = 3 kr.; 10 = 20 Pf.

**\*Benzinum.** Inn. 0'20—1'0. 2 bis 3mal tägl. Aëuss. geg. Juck. 1 Th. auf 4 Th. Fett. 10 = 35 Pf. **Benzol** ebenso.

**Benzoë.** Resina selten inn. in Pill. o. Emuls. 0'3—1'0 50 = 28 kr.; 10 = 25 Pf. — **Flores B. (Acid. benz.)** 0'2—0'5 in Pulv., Pillen, Sol. mehrm. tägl., äuss. als Antisept. 1 = 9 kr. = 20 Pf. — **Tinct. B.** zu Wasch., Umschl. etc. 10 = 4 kr. = 30 Pf.

**Bismuthum subnitricum.** (Magist. Bism.) Inn. in Pulv., Pill. zu 0'2—1'0 tägl. 2—3m. äuss. in Salben 1 : 20, Pulv. Inject. 1 : 100; 1 = 7 kr. = 5 Pf. — **\*B. carbonicum** 0'5—2'0, Kindern 0'2—0'5 in Plv. — **\*B. tannicum** in Plv. 0'1—0'2 p. d. 1 = 5 Pf. **\*B. valerianicum** 0'025—0'15 p. dosi mehrm. tägl. 10 = 55 Pf.

**\*Blatta orientalis.** Diuretici., geg. Hydrops zu 0'10—0'3,



in Pulv., Inf. Tinct. 3–5m.  
 $1 = 12 \text{ kr.} = 15 \text{ Pf.}$  \*Antihy-  
 dropin gleichfalls gegen  
 Hydrops

**Boldo Fol.** Inf. gegen Leber-  
 krankheiten.

**Borax dep. s. veneta**, Borax  
 sodae inn. 0'2–1'0, mehrm.  
 tägl. in Pulv., Pill.; für  
 Kinder 2'0–5'0 auf 50'0  
 mel rosarum kaffeeöffelw.  
 $10 = 3 \text{ kr.} = 10 \text{ Pf.}$  — \*Acid.  
 boracicum. (Sal sed. Hom-  
 bergi) 5'0–15'0 tägl. in  
 Pulv., Sol.

\***Boroglyceridum** aus 92 Glyc.  
 u. 62 Borsäure z. Wund-  
 behandlung.

**Brayerae** (Kousson) flores,  
 Det. 30'0–50'0 mit 500'0  
 Aq. auf die Hälfte einge-  
 kocht, des Morgens nüch-  
 tern auf einmal zu trin-  
 ken, gegen Bandwurm.

\***Bromalum hydrat.** Sedat. u.  
 Antispasm. bei Epilepsie,  
 Chorea, 0'05–0'3! Pill.  
 Sol.  $1 = 60 \text{ Pf.}$

\***Bromalum hydratum**, inn. 0'05  
 bis 0'5, in Pill., Kaps.,  
 mehrm. tägl. 0'10 = 6 kr.  
 = 6 Pf.

**Bromoformium.** Anaesth. zu  
 Narcose 0'10 = 3 kr.

\***Bromum**  $\frac{1}{2}$ –2 Tropf. ad. 0'10  
 p. die in Spir. oder Aq.  
 äuss.  $1 = 5 \text{ Pf.}$  Aq. Brom. =  
 1:30 Wass. äuss. als Ver-  
 bandw. und Umschl.; zu  
 Inject. 1:200–400; Inhal.  
 1:500. \*Brom. chloratum, als  
 Aetzm.

\***Brucinum purum, nitricum, sul-**  
 fur. Inn. 0'008–0'02–0'06  
 mehrm. tägl. in Pillen  
 oder Trpf. 0'1 = 10 Pf.

\***Bryonia.** Rad. 15'0 auf 200 Inf.  
 Snecus expr. 0'5–1'0 p. die.

\***Butyli-chloralum**, Anaesth.  
 Hypnot. 3'0–5'0 in Glyc.

u. Aq. innerl.  $1 = 30 \text{ kr.} =$   
 $20 \text{ Pf.}$

\***Cadini Ol.** 50 = 8 kr.

\***Cadmium sulf.** Aeuss. In  
 Ungt. 0'05–0'15 auf 5'0  
 Fett. In Sol. 0'05–0'15  
 auf 100'0.  $1 = 6 \text{ kr.} = 5 \text{ Pf.}$

**Caffeinum Natrium benzoicum**  
 (15%) **Cinnamyllicum** (62%)  
 u. **Salicylicum** (62%) bei  
 Herzkrankh. 0'20 p. dos.  
 0'8–1'8 p. die auch subcut.

**Calabar v. Eserin.**

**Calamus aromat.** (Tonicum.)  
 Rad. in If. 5'0–10'0:100. in  
 Pillen, Pulv., Latw. 0'05  
 –1'5. *scios.* 50 = 7 kr.  
*pulv.* 10 = 5 kr. Extr. 0'3  
 bis 1'5. = 20 Pf.

**Calcium carbonic. pur.** (calca-  
 ria carb.) Inn. 0'5–2'0 p.  
 dos. Aeuss. Streup. zur  
 Lister-Pasta. 10 = 22 kr.

= 5 Pf. — **C. chloratum**  
 0'20–0'6 mehrmals tägl.  
 50 = 29 kr. **Calcium hypo-**

**chloros.** (Calcar. chlor.)  
 Selt. inn. 0'1–0'3; äuss.  
 1–2'0 auf 200'0 Aq., als

Waschg. etc. 50 = 4 kr.;  
 100 = 20 Pf. — \***Calcaria**  
**hypophosphorosa.** Dos. 0'15

bis 0'30 in nicht säueren  
 Flüssigkeit. geg. Phthise.  
 10 = 40 Pf. — \***Calcar.**

**lactica** innerlich gegen  
 Phthise 0'5–0'30. — **C.**  
**oxydat.** (Calc. caustica.)

Nur äusserl. 100 = 4 kr.  
*pulv.* 50 = 4 kr. Mit Kal.  
 caust. aa. p. aeq. und

Alcohol erhält man die  
 Wiener Aetzpasta.  
 — **C. oxysulfuratum sol.** vel

Sol. Vlemmingkx zu Wa-  
 schungen 50 = 23 kr. —  
**Calcium phosphoricum.** Inn.

0'3 bis 1'0 p. d. 6 = 24 kr.;  
 10 = 20 Pf. — **C. sulfuratum**  
 zu Bädern, Waschungen.  
 100 = 2 Pf. **C. sulfuricum**

- ustum (Gyps) zu Gypstheer, Verbänden 100 = 20 Pf. — Aqua calcis. Inn. 30'0–100'0 mit Milch, Fleischbrühe, schleimig. Doct., tgl. 2–3mal. Aeuss. zu Einspritz., Waschung. 100 = 2 kr. = 5 Pf.
- Calendula.** Extr. inn. 0'1–0'2 3–4mal tägl.
- Calumbae rad.** sciss. 50 = 13 kr. pulv. 10 = 6 kr.
- Camphora.** In Pulv., Pill., Emuls., geistige Sol., Mixt. zu 0'05–0'3 3–4mal tgl. Aeuss. als Pulv., Ugt., Mundw., Pinselsaft, Empl. 50 = 13 kr.; 10 = 15 Pf.
- C. monobromata** inn. 0'1 bis 0'3 mehrm. tgl. in Oblaten. Sedativum subcut. 0'10 in 10 Öl. 1 = 5 kr. = 5 Pf.
- Acetum camph.** äusserl. zu Waschungen u. Blähung. — **Spir. camph.** Blos äuss. als Waschm. 50 = 9 kr.; 100 = 50 Pf. — **Liniment sap. camph.**, siehe Ammonium. Öl. c. 10 = 5 kr.
- \*Cannabinum tannicum** Hypnoticum 0'02–0'50 Abends. 0'10 = 6 kr.; 1 = 40 Pf.
- \*Cannabis indica.** sciss. 10 = 3 kr. = 10 Pf. †Extr. 0'05–0'2 mehrm. tägl. 1 = 8 kr. = 65 Pf. — **Tinct. C.** 2–10 Tpf. mehrm. tägl. 1 = 5 Pf.
- Cann. sativae Semina** zu Emuls. 10'0–30'0 auf 400'0.
- †**Cantharides.** Inn. Pillen, Emuls. zu 0'01–0'05 p. dosi 10 = 19 kr. = 50 Pf.; sublt. pulv. = 24 kr. = 55 Pf. **Acetum C.** äuss. als schnelles Vesicans. †**Tinct. C.** 5–20 Trpf. 2–3mal Aeuss. zu Einreib. 5'0 auf 30'0 Empl., Ugt. etc. 5 = 6 kr.; 10 = 20 Pf.
- Empl. Canth. ord.** od. **vesicator.** (Canth. 1 : 3 Const.) 10 = 11 kr. **Empl. Canth. ord.** oder **vesicator.** (Canth. 1 : 3 Const.) 10 = 11 kr. **Empl. perpet.** Euphorb. 1. Canth. 2. ad 8 Const. 10 = 19 kr. **Cantharidinum** statt der Canth. zu Pfl., Salben etc.
- Capilli ven.** Hb. sc. 50 = 10 kr.
- Capsicum annum.** Fruct. In Pil., Pulv. 0'05–0'2 3mal tägl. Inf. 0'2–0'5 auf 50'0 esslöffelw. **Tinct. C.** zu 10 bis 15 Trpf. in einem schleim. Vehikel 2–3mal tägl., auch zu Mundw., Einreib. etc. 10 = 15 Pf.
- Carbo animalis** 0'5–2'0 Pulv. 1 = 5 Pf. **C. vegetabilis** zu Streup. 50 = 8 kr.
- \*Carbonium jodat.** 0'05–0'2 p. d. in Pil. Aeusserl. 2'0 auf 25'0 — **\*C. sulfur.** (Alcohol sulfuris). 3–8 Tpf. p. d. in Mixt. Aeuss. für sich oder m. Alcohol od. Oel 2'0–4'0 auf 30'0–50'0. — **\*C. trichloratum** in Pulv. 0'3 bis 0'4 alle halbe St. bei asphyct, Cholera.
- Carbo ligni dep.** Desinf. inn. 0'50–2'5 in Pulv. äuss. Streupulver. Zahnpasta. 50 = 8 kr. — **\*C. ossium** inn. 0'5–2'0. — **\*C. Spongiae** innerl. 0'5–2'0 in Pulver gegen Kropf. 10 = 15 Pf.
- \*Carboneum sulf.** 3–8 Tropf. u. die Mixt. Aeuss. in Alcohol u. Oel 2–4; 30–60'0. 10 = 5 Pf.
- Cardamomum.** Semina 0'3–0'5 p. d. in Pulv. 10 = 48 kr.
- Carica Papaya.** Succus in Tpf. und zu Bepinselungen bei Diphtheritis. **Syr. Papain** bei Dyspepsien v. Kindern.
- Caragheen** Det. 5'0 : 200'0 Col. 50 = 18 kr.; 100 = 55 Pf.
- Gelatina C.** kaffeelöffelw. 10 = 24 kr.

**Carvum, Semina.** Inn. als Zusatz zu Abführm. 0·5 bis 1·5, 2—3mal tägl. Als Thee 3·0—6·0 auf 2 Tass. Wasser. 50 = 7 kr., pulv. 10 = 5 kr. **Oleum aether.** Zu Einreib. 4—5 Tpf. 2—3mal. 1 = 3 kr. = 5 Pf. **Spir. C.** zu Einreibungen 50 = 9 kr.

**Caryophylli aromat.** Gewöhnlich das ätherische Oel auf Zucker oder im Aether, Weingeist gelöst 1—3 Tpf. 2—3mal 50 = 17 kr.; 10 = 15 Pf., pulv. 10 = 7 kr. = 25 Pf. **Ol. c.** 1 = 2 kr. = 5 Pf. — **Tinct. C.** 15—30 Tropf. 10 = 20 Pf.

\***Cascara amarga Cort.** in Decoct gegen Syphilis \***C. sagrada Cort.** zu Extr. Theelöffelw. Abführmittel.

**Cascarill, cort.** (Adstringens.) In Pulv., zu 0·3—1·5 2—3 mal tägl. Inf. aq. v. vinos. 10·0 auf 200·0 alle 2—3 Stunden 1 Essl. 50 = 12 kr., pulv. 10 = 6 kr. = 10 Pf. **Extr. C.** in Pil., Sol. zu 0·5—1·0, 3—4mal, 1 = 10 Pf. **Tinct. C.** 10—20 Tropfen. 10 = 6 kr. = 15 Pf.

**Cassia cinnamomea.** Innerl. die Rinde, in Inf. aq. v. vin. 5·0—10·0 auf 200·0, cort. 50 = 9 kr.; 10 = 10 Pf. pulv. 10 = 4 kr. = 15 Pf. **Tinct. C.** 10—30 Tpf. m. W. 2—6mal. 10 = 3 kr. = 20 Pf. **Syrup.** 20·0—30·0. 10 = 5 kr. = 10 Pf. **Ol. aeth.**  $\frac{1}{2}$ —2 Tropf. 2—3mal. Aeuss. als Zahnm. 1 = 4 kr. = 5 Pf. **Aq. C.** simpl. 50 = 5 kr.; 100 = 15 Pf., spir. 50 = 11 kr.; 00 = 30 Pf. **Cassia fist** zu Decoct. **Pulpa C.** 2—4·0 in Mixt. 50 = 6 kr.

\***Castanea vesca.** Extr. der Blätter inn. 3stündlich 1

Kinderlöffel bei Keuchhusten.

**Castoreum (canad.)** 0·1—0·3 in Pulver, Pill. u. Pasta. 0·10 = 2 kr., pulv. 0·10 = 3 kr. = 5 Pf., sublt. pulv. 0·10 = 4 kr. \***Tct. cast. canad.** 10 = 62 kr. = 40 Pf. **Aq. cast.** 10 = 30 Pf.

\***Catechu** 0·2—1·0 in Pulv., Pill., in Wein od. Spir. gelöst 5·0 ad 100 Col.; äusserl. als Streup. 10 = 10 Pf. **Tinct. C.** 10—30 Tpf. 10 = 15 Pf.

**Centaureum minus.** Hba. Inf. aq. v. vinos. 5·0—15 auf 100·0. 50 = 13 kr.; 10 = 10 Pf. **Extr.** 5·0 p. die in Pill. oder Mixt. 5 = 12 kr.; 1 = 20 Pf.

**Ceratum cetacei** (Empl. sperm. Ceti) Deckmittel. 10 = 8 kr. **C. fuscum.** 10 = 5 kr. — **C. plumb. compos.** (Goulard. cerat.) Ung. plumb. 25·0. **Camphorae** 0·01.

\***Cerium oxalicum,** geg. chron. Erbrechen u. Diarrhoe 0·05—0·1 mehrm. tgl. 1 = 5 Pf.

**Cerussa s. Plumb. carb.** **Cetaceum** (Sperma Ceti) zu Salben und Ceraten 50 = 22 kr.

**Chamomillae vulgaris flor.** In Inf. zu 5·0:200. 50 = 14 kr.; 10 = 10 Pf. **Aq. Ch.** 50 = 5 kr.; 100 = 15 Pf. **Extr. Ch.** in Pill. 0·5—0·6, 1—4m. 1 = 25 Pf. **Ol. Ch. aeth.** als Oelzucker oder äther. Sol. 1—3 Tropf. p. die. 0·10 = 15 Pf. **Tct. Ch.** 10—20 Tropf. 3—4mal tägl. 10 = 3 kr. **Chamomilla romana.** Form. Gabe dieselbe 50 = 13

\***Chaulmoograe Ol.** 5—15 T inn. geg. Scrophulose 12

phillis; ext. 1:20 Gel od. Vaseline.

\***Chelidonium, Herba.** Innerl. der frisch gepresste Saft 0'5—5'0 tägl. mit Milch oder Schleim. **Extr. Ch.** 0'3.—1'0, mehrm. tägl. 5 = 33 kr.; 1 = 20 Pf.

**China.** (Cortex Chinae regius, fuscus und ruber.) In Plv. Latw., Pil., 1'5—3'0, 2 bis 3mal; in Det., If. aq. v. vinos, 5'0—15'0 auf 200'0, cort. 50 = 75, 45 resp. 148 kr., subt. pulv. 10 = 22, 15 u. 41 kr., cort. 10 = 40, 30 u. 35 Pf.; subt. pulv. 1 = 5 Pf. **Extr. Ch. fusc.** in Sol., Pil. 0'3—1'5, 3—4mal 5 = 42 kr.; 1 = 55, 45, 40 oder 25 Pf. **Tet.** 30—80 Trpf., 3—4mal. — \***Tet. Ch. comp.** (Elix. rob. Whyttii). Inn. allein oder auf Zucker, in. Mxt. 30 bis 80 Trpf., 2—3mal. 10 = 5 kr. = 20 Pf.

**Chinidinum boricum** und **salicylicum** billiger als Chininpräp. — **Ch. sulf.** 1 = 8 kr. = 10 Pf. **Tet.** 30—60 Trpf. einigemal tägl. 0'1 = 3 kr.

**Chininum.** In Pulv., Pil., Sol. 0'02—0'3—5'0, 1—4mal 0'1 = 3 kr. = 5 Pf. **Ch. aethylosulfuricum** subcut. 0'20—0'50. — **Ch. arsenicosum** inn 0'01—0'02 p. 1.2—3mal. tgl. **Ch. bimuriaticum** subcut. 1:2 Aq. Chin. b'sulf. 0'1 = 3 kr. = 10 Pf., — \***Ch. ferrocitr.** 1 = 15 Pf., **muriat.** 0'1 = 4 kr. = 15 Pf., **salicylicum** 0'10—0'50 b. Typhus. — **sulf.** 0'5 = 10 kr. 0'10 = 10 Pf. In Plv., Pil., Sol., Saft zu 0'05—0'5—1'5, in 24 Stund.; enderm. 0'2—0'5, in Clyst. 0'3—1'0, 1—2mal. — \***Ch. phosph.** 0'2—1'0 p. die. —

\***Ch. salicyl.** 1 = 10 Pf. — **Ch. tannicum** 0'05—0'3 in

Pill. 0'10 = 2 kr.; 1'0 = 30 Pf. — \***Ch. tartaricum** 0'05—0'2—1'5. — **Ch. valerianicum** 0'1—0'5 in Gummischleim gelöst. 0'10 = 15 Pf.

**Chinoidinum** in 2mal so grossen Dosen als Chin. **muriat.** = 5 Pf. — **Ch. citricum.** Dos. wie Chinin aber billiger. **Chinoid. hydrochl.** subcut.

\***Chinolinum purum** Antisept. zu Mundw. Zahnp. 1:500 Aq.; **Ch. tartaricum** inn. Pulver 0'5—1'0 p. dos. \***Cinchoninum.** Wie Chin. 1 = 15 Pf. — **C. sulf.** Inn. Pulv. 0'15—0'60 p. die 1 = 10 Pf.

**Chlori aqua, chlorina liquida.** Inn. in Mixt., Saft oder Aq. 4'0—15'0 p. die. 10 = 3 kr.; 100 = 35 Pf.

†**Chloralum hydratum.** 0'5 bis 3'0 (!) in geth. Gaben in wässr. Lös. mit schleim. Zusätzen; äuss. in Clyst. (2'0—5'0 mit Eigelb oder Gummischleim), subcut. **Inject.** (1:25 nur in äussersten Fällen). 10 = 17 kr. = 30 Pf.

**Chloroformium.** Inn. 5—10 Trpf. bei Del. tremens, Cholera, Pneumonie und Eclampsie. — Rein oder mit Aether gemischt zu Inhal. 10 = 7 kr. = 15 Pf. \***Chrysarobin** s. **Acidum chrysophanicum.**

**Cina (Santoninum) Semina.** (Vermifugum.) Inn. Latw., Mixt. zu 1'0—5'0, als Clyst. 2'0—4'0. 50 = 8 kr. 100 = 45 Pf. **subt. pulv.** 10 = 6 kr. = 10 Pf. — **Extr. C.** Pill. 0'2—0'3, 2—3mal. **Pill.** Latwerg flor. 50 = 8 kr.; 1 = 35 Pf. — **Cinnum (Santoninum).** Inn. Pulv. 0'2—0'3



p. dos. Trochisci Sant. enthalten je 0·05 Santonin.  
Cinnamomum, s. Cassia Cinn.

Citrus Medica. Inn. der Saft zu Limonaden. Mixt. cort. 50 = 7 kr., flav. 50 = 33 kr., pulv. 10 = 11 kr., cort. fruct. 10 = 10 Pf. Syr. C. Corrigen. Ol. C. zu Salben zu Bals. vit. Hoffm. 1 = 2 kr.

\*Coca. (Analepticum.) Folia. In Pulv. 0·3—0·5 p. d. Inf. 5·0—10·0 auf 100·0—200·0. 10 = 25 Pf. \*Cocainum mur. inn. Stimulans. Aphrodis.; ext. auf Schleimhäute bes. Conj. Antalgicum u. Narcot. 0·10 auf 2—3 Aq. zu bepins. mit Morph. bes. bei Kehlkopfleiden. 0·01 = 5 Pf.; 1·0 = 3 Pf.

\*Cochlearia. Succus expr. 5·0—10·0 tägl. mit Fleischbrühe, Molken, Conserven 10·0—15·0. Spir. C.  $\frac{1}{2}$ —1 Theelöffel p. d. äusserl. zu Zahntinct., Mund- und Gurgelw. 50 = 12 kr.

\*Codeinum s. Opium.

†Coffeinum purum u. citricum. 0·03—0·10 mehrm. tägl. 0·10 = 4 kr. = 5 M.

Colchicum autumnale. Bulbus. In Pulv., Pill. 0·05—0·6 sem. 10 = 2 kr. †Tet. C. 20—40 Tpf. 5 = 3 kr.; 10 = 15 Pf. — †Vin. c. 1—2 Theel. 10 = 10 kr. = 20 Pf. — Acetum C. 1·0—2·0. 4 bis 5mal täglich. 10 = 10 Pf. — Oxymel. ebenso, 2 bis 3mal. 10 = 20 Pf. — †Colchicinum. Innerl. zu 0·001—0·002—0·003, 1—3m. tägl. gg. Rheuma u. Arthritis. 0·01 = 2 kr. = 5 Pf.

Collodium als Klebe- und Deckungsm. 10 = 5 kr. = 10 Pf.

Collyrium. adstring. luteum. Zu Augenw. enthält Salmiak, schwefels. Zink, Campher, Safran, Alkohol u. Wasser 50 = 18 kr.

†Colocynthis. Fruct. o. pulp. (Drasticum.) Inn. 0·02—0·12 in Pulv., Pill.; 5·0—15·0 auf 300·0 in Det. sciss. 10 = 16 kr., pulv. 10 = 25 kr. †Extr. C. 0·3—0·6; 1 = 16 kr. = 40 Pf. †Tet. C. 10—20 Trpf. 3—4mal. 10 = 20 Pf.

\*Colombo radix (Adstring.) In Det. 10·0—15·0 auf 200·0 tägl., Pulv. 0·5—1·0, conv. 10 = 10 Pf., pulv. 10 = 15 Pf. Extr. C. 0·3—0·6, 2—3mal. 1 = 45 Pf.

Conchae praep. z. Zahnp. 10 = 5 Pf.

\*Condurango, Cortex, Macerationsdecoct 15·0 : 400 Aq. auf 200 Col. gegen Krebs 10 = 15 Pf. Extr. C. 0·2 bis 0·5 p. d.

†Con. maculat. (Cicutae) herba. Meist äusserl. zu Fomenten. herb. 10 = 1 kr. = 5 Pf. pulv. 10 = 4 kr. †Extr. Con. 0·02—0·1 p. d. 2—3mal 1 = 6 kr. = 15 Pf. Empl. Con. 10 = 4 kr. \*Tet. C. 10—20 Tropfen p. dos.

†Conium 1 Tpf. auf 100·0 Aqua menthae, 1 Essl., mehrm. tägl. 1 Tpf. = 5 Pf.

\*Convallaria majalis Inf. bei Herzf. Tinct. C. 10—15 Trpf. 4mal tägl.

Copaiva. Balsamum 20—40 Tropfen p. dos. in Pillen, Kapseln. Aeusserlich zu Inject., Clyst. 10 = 6 kr. = 15 Pf. — \*Ol. copaivae aeth. 10—20 Tpf. p. dos., auch zu Inj. in d. Urethra. Resina C. 1—4·01 p. die in Pillen, Bissen.



**Coriandr. sem.** 50 = 4 kr.;  
10 = 22 Pf.

\***Coto, cortex, Antidiarrh.**  
0'5–0'8 p. die in Pulv.  
Mixt. 10 = 50 Pf. — \***Cotoin**  
0'05–0'1 p. d. subcut. 1:4  
Aether. 0'10 = 20 Pf. —  
**Tet. C.** mit Opium tinct.  
5–10 Tropfen alle 2 Stun-  
den. \***Paracotoin** in doppelt  
so starker Dose.

\***Cotyledon, umbilicus. Extr.**  
Fol. zu 0'3, 2–3mal tägl.

†**Creosotum** 2–4 Tpf. p. dos.  
in Pill. Aeuss. m. Aq.  
verd. od. als Ungt. 5–20  
Tpf. auf 15'0–30'0. 5 =  
10 kr.; 10 = 30 Pf. — **Aqua**  
**creosoti** 20 Tpf. auf 150'0  
Aq. 50 = 5 kr.; 100 = 15 Pf.

**Crocus austr.** Inn. in Pulv.  
0'2–0'5 p. dos. Inf. e 2'5  
–5'0. ad 100. 1 = 10 kr.,  
= 30 Pf. — **C. gall.** 1 = 15 kr.;  
pulv. = 18 kr. **Tet.** 10–20  
Tpf. p. d.

**Crotonis oleum.** Inn. selten,  
in Plv., Pill., m. anderen  
Oelen. 1–3 Trpf. auf 5'0  
Zucker in 6 Th., 1–3mal.  
Aeuss. rein od. m. Oel od.  
Fettz. Einreib. 5–20 Trpf.  
1 = 4 kr. = 5 Pf.

\***Crotonochloralum hydratum**  
zu 0'3–0'5–1'0 auf 1–3mal  
in wäss. Lösung. Hypnotic.

**Cubebae.** In Pulv., Pill.,  
Latw. 1'5–5'0, 3–4mal.  
fruct. 50 = 52 kr., pulv.  
10 = 16 kr. = 15 Pf. **Extr.**

**Cub.** in Pill. 0'3–1'0. 5 =  
23 kr.; 1 = 30 Pf. **Ol. C.**  
aeth. 3–4 Tpf., 3–4mal.

\***Cucurbitae semen** 100–200 St.  
als Brei od. in Emulsion  
gegen Bandwurm.

\***Cuprum aceticum** in 150–200

Th. Aq. lösl. zu Collyrien.  
10'0 = 15 Pf. — **C. alumi-**  
**natum (Lapis divinus).**  
Aeuss. in Sol. 0'05 bis

0'15 auf 30'0 Augenwass.

0'3–1'5 auf 35'0 zu Ein-

spritz., Wundw. 10 = 12 kr.

= 10 Pf. — \***C. carbonicum.**

Inn. 0'3–0'5, 4–6mal tägl.

in Pulv., Pill. Aeuss. 5'0

auf 30'0 Fett. — \***C. oxyda-**

**tum nigr.** Inn. 0'02–0'8, 4mal

tägl. in Pulv. Aeuss. wie

voriges. 1 = 5 Pf. — †**C.**

**sulfuricum.** Inn. Pulv.,

Pill., Sol. 0'01–0'03, 2–3m.

tägl.; als Brechm. 0'2–3'0

p. d. Für Kinder 0'04–

0'15 p. d. Aeuss. als

Waschw., Einspritz. 0'1–

0'5 auf 30'0; Ugt. 0'1–0'3

ad 30'0. 10 = 3 kr. = 5 Pf.

**C. muriat. oxyd.** 0'008–0'01

–0'02 p. d. **Tet.** 5–10 Trpf.

p. dos.

\***Curare u. Curarin v. Strych-**

**nos guinensis,** ein heftiges

Narcoticum. 0'002 0'01

subc. 0'10 = 10 Pf.

**Cydonia. Sem. Mucilago.**

Aeuss. zu Augenw. 50 =

35 kr. **Mucilago S C. Schleim.**

10 = 3 kr.

\***Damiana. Extr. Nervinum**

bes. bei Sexualkrankh.,

2–4'0 p. dos.

\***Daturinum** 0'1:10 Aq. mit

einigen Tropfen Ac. sulf.

zu Pupillen-Erweiterung.

**Decoct. Zittmanni fort.** aus

Sassaparilla mit Alumen.

Calomel Cinnabaris Seena

etc. bestehend. 250 = 81 kr.;

500 = 59 kr., 1 Pfund =

145 Pf. — **Dec. Zittm. mitius**

zu den Resid. des starken

Decs. bios cort. citr., car-

dammom. etc. hinzugefügt;

250 = 42 kr.; 500 = 47 kr.;

1 Pfund = 85 Pf.

\***Delphinium,** aus dem Samen

von Delph. Staphisagria,

dem Veratrin in der Wir-

kung analog. Inn. 0'02–0'1

- p. d. Aeuss. 0'2—1'0 auf 10'0 Fett oder Alcohol.
- †*Digitalis purpureae* folia. In Pulv., Pill. 0'02—0'08. In If. 0'05 bis 1'5 auf 100'0 esslöffelw. sciss. 10 = 2 kr. = 5 Pf. s. pulv. 10 = 4 kr. = 10 Pf. †Tinct. Dig. 5—20 Tpf., 2—5mal. 5 = 3 kr.; 10 = 10 Pf. Ung. Dg. 1 : 10 Fett. †Acetum D. 10—30 Trpf. 3—4mal tgl. 10 = 10 Pf.
- †*Digitalinum* 0'001—0'003. 0'01 = 10 kr.; 0'10 = 15 Pf.
- \**Diosma crenata*. s. *Buccu*. Fol. 15'0 auf 300'0. Inf. Tet. 5'0 p. dos.
- \**Ditana digitifolia* fördert die Milchsecretion.
- \**Duboisinum* sulf. u. Extr. *Duboisiae myoporoid.*; wirks. *Succedaneum* d. *Atropins*; in Sol. ext. 0'10:100; int. 0'001—0'0015; auch subc. 0'01: 20 Aq. 0'01 = 45 Pf.
- Dulcamara*. *Stipites*. Det. 10'0—30'0 auf 300'0. 50 = 3 kr.; 10 = 10 Pf. Extr., in Sol., Pil. 5'0—8'0 p. die. 1 = 5 Pf.
- \**Dulcamarinum* 0'1—0'2.
- \**Elaterium*, (Drastic., Diuret.) 0'05—0'1—0'2 in Pulv., Pill. Auflösung. — \**Elaterin*. 0'003—0'005, 3mal tägl.
- \**Elaeum chloratum*. (Liquor hollandicus, Aether anaesth. Arani.) Aeuss. als Anaesthet. 10'0 bis 20'0 mit Ol. hyosc.
- Electuarium aromat.* 10 = 4 kr. und El. ar. c. opio inn. 1'0 in Pill. od. Bissen 10 = 6 kr. El. lenitiv. Abführm. 50 = 28 kr. El. e Senna 10 = 10 Pf.
- Elemi*. *Resina elemi*. Nur zum äussern Gebr. als Reizm. 30 = 11 kr. 10 = 10 Pf. — Ung. Elem. Verbandsalbe. 10 = 15 Pf.
- Elix. ac. Halleri* v. *Ac. sulf.*
- \**Emetinum* v. rad. *Ipecac.* 0'005—0'01 inn. als Emeticum 10 = 60 Pf.
- \**Emplastrum adhaesiv.* *Pettenkoferi*. Sap. calcarei 40'0, Terebinth. coct. 20'0, Sebi ovill. 50'0. — *Empl. ammoniac.*, *asae foet.*, *galbani* (parantur eodem modo cum res. pini et cera flava. Ammon. galban. et asae foetid.). — *Empl. cantharid.* Blasenpflaster. 10 = 13 kr. = 25 Pf. — *E. cerussae*, Bleiweisspflaster 10 = 4 kr. = 10 Pf. — *Empl. cumini vel carv.* bei Flatulenz auf den Unterleib. — *E. diachylon comp.* 50 = 20 kr. simpl. 50 = 14 kr. *Empl. Hydrarg.* 50 = 32 kr.; 10 = 20 Pf. — *Empl. oxycroc.* bei torpid n Geschwülsten. 10 = 16 kr. = 30 Pf. — *Empl. saponatum* beirheum. Affect. 10 = 5 kr. = 15 Pf.
- \**Ergotinum* v. *Secale corn.*
- \**Erigeron philadelphic.* Ol. aether. 5 Tpf. p. dos. bei Metrorrhagie.
- \**Eserinum* sulf. v. *Faba calab.*
- \**Eucalyptus globulus*. Fol. in Pulv. 5—10'0 Inf. Antipyreticum 100 = 20 Pf. — \*Tct. Euc. 10 = 20 Pf. Ol. E. aeth. (*Eucalyptol*) inn. 0'3—2'0 zu Inhal. Einreibungen; auch antisept. Wirkung. 10 = 150 Pf. Vinum E. 1 bis 2 Theel. mehrm. tgl.
- Euphorbium*. 5'0—12'0 auf 30'0 Empl. oder 10'0—30'0 auf 30'0 Fett als Ungt. 10 = 2 kr. = 10 Pf. — Tet. E. 10 = 15 Pf.
- \**Extract. malti*, 10'0—30'0 in Lösung. — \**Extr. malti ferratum* (*Extr. malt.* 95'0, *Ferri pyrophosph.* cum ammon. citr. 2'0, Aq. destill. 3'0) 10'0—30'0 p. dos.

\**Faba calabarica* selten. 10 = 20 Pf. — Extr. F. c. inn. 0'005—0'02 bei Convuls. Epilepsie. 0'10 = 10 Pf. — Tet. F. c. 1:5 Spir. 2—5 Tpf. mehrm. tgl. bei Tetanus. \**Eserinum sulf.* inn. 0'001—0'003; äuss. 0'1:100; Myoticum 0'01 = 35 Pf. \**Phyostigminum salicyl.* Ebenso Fel tauri depur. 0'5—2'0 in Pill. od. in arom. Wässern. 1 = 12 kr. = 5 Pf.

\**Ferrum aceticum siccum.* 0'05—0'1—0'2. p. d. 1 = 5 Pf. Tinct. F. ac. aeth. 5—10 Tpf. 3m. tgl. — \**F. albuminatum* inn. 0'10—1'5. 10 = 80 Pf. — \**F. ammoniat.* 0'25—0'6 p. d. in Pill. oder Sol. — \**F. amm. citric.* 0'2—0'1 p. d. — \**F. ammon. tartar.* 4'0 auf 30'0 Aq. esslöffelw. bei Chlorose. — \**F. arsenicum* 0'01—0'02. Aeuss. 1'0—2'0 auf 15'0—30'0 Fett. — \**F. bromatum.* 0'08—0'3 p. d. 1 = 5 Pf. — *F. carb. sacch.* 0'2—0'6, mehrm. tägl. 5 = 6 kr.; 10 = 10 Pf. — *F. citricum* 0'05—0'1—0'2 p. d. 1 = 5 Pf. — \**F. hydrocyanicum.* 0'08—0'3 p. d. — †*F. iodatum sacch.* Inn. in Sol., Pil., Latw. 0'3—1'5, 3—4mal 5 = 11 kr.; 1 = 5 Pf. Syr. F. iod. 1—5'0 tgl. 10 = 14 kr. = 20 Pf. — *F. lacticum* Inn. Plv. zu 0'08—0'2, mehrm. tgl. 5 = 9 kr.; 10 = 15 Pf. — *F. limatum alcoholisatum.* Inn. in Pulv., selt. in Pill., Latw., Wein. 0'08—2'0. 2—3mal. — \**F. oxydatum aceticum liquid.* 0'6—2'0. — *F. oxydatum dialysatum.* (Liqu. F. peroxychlorati) 5—10—20 Tpf. p. d. 10 = 8 kr. = 5 Pf. — \**F. oxydat. hydricum.* Inn. Mixt. 10'0—30'0 auf 400'0 Wasser in kurz. Zwischen-

räumen bei Arsenikvergiftung. — *F. oxydato-oxydulatum.* Innerl. in derselben Form 0'08—0'2, 2—3 mal. 5 = 14 kr. \**F. peptonatum* 0'0 bis 0'50 in Pill. 1 = 15 Pf. *F. pomat. extr.* 0'3—0'6. 5 = 5 kr.; 1 = 10 Pf. Tinct. mal F. wie F. pom. 10—20 Tpf. 10 = 8 kr. — *F. phosphoricum oxydulatum.* Inn. dieselbe Form 0'08—0'3—0'6, äusserl. in Ugt. 5'0—10'0 auf 30'0. 5 = 15 kr. — *F. pulveratum* inn. 0'1—0'5 p. d. in Pulv. Pill. 10 = 3 kr. *Globuli mart.* 1—3 St. zum Bade 1 St. = 20 kr. — \**F. et natr. pyrophosphoricum.* Wirksames Präp., nicht unangenehm im Geschmack. 10—20—30 Gm. p. d. 1 = 2 kr.; 10 = 25 Pf. — *F. sesquichloratum solutum.* Inn. in Sol., Tet. Latw.; Pill. zu 0'15 bis 0'5 3—4mal. Aeuss. als blutstillendes Mittel. 10 = 5 kr. = 10 Pf. — Extr. malat. Ferri 5 = 5 kr. — *Spiritus ferri chlorati aethereus.* (Tinct. nervino — tonica Bestuscheff) Inn. 10—20 Trpf. 2—3mal auf Zucker. 10 = 8 kr. — *F. sulfuricum.* Inn. in Pillen Sol. 0'05—0'3, 2 bis 3mal Aeuss. zu Augenw., Inj. 0'10—0'5 auf 30'0. 10 = 2 kr.; 100 = 10 Pf. — \**F. tannicum* 0'6—5'0 in Syr. Cinnam. oder in Pill. mit Extr. Absinth. gegen Chlorose. 10 = 30 Pf. — \**F. tartaricum* 0'3—0'6 p. dos. \**F. valerian.* 0'08—0'15 p. d.

*Filix Mas.* (Anthelminticum.) Rad. inn. als Pulv. zu 2'0—10'0. 2—3mal sciss. 50. = 8 kr. pulv. 10 = 6 kr. Ext. F. m. aeth. 1'5 mit Pulv.

- rad. fl. mar. zu 20 Pillen.  
Früh u. Abends 10 Stück.  
5 = 40 kr.; 1 = 60 Pf.
- Foeniculum.** Semina fl. ex.  
10°0 bis 25°0. fruct. 50 =  
7 kr., pulv. 10 = 5 kr. Ol.  
aeth. 1—4 Tpf. Pulv. 1 =  
2 kr. = 5 Pf. Aq. F. 50 =  
4 kr.; 100 = 10 Pf.
- Franciscea uniflora** Antisyp-  
hit. Diuret. Purg. — \*Extr.  
fluid. 5—20 Tropfen gegen  
Scroph., Rheumat.
- \***Fuchsin** 0°15—0°20 p. dos. in  
Oblat. Spir. od. Pillen gg.  
Morb. Brighti.
- Galbanum.** Gummi resina, zu  
Empl. Pulv. 50 = 24 kr.  
10 = 25 pulv. 10 = 9 kr.
- Galeopsis grandiflora.** Hb. 15°0  
bis 30°0 auf 400°0 Det. 50  
= 10 kr.; 10 = 10 Pf.
- Gallae quercus turc.** Inn. 150  
bis 30°0 auf 400°0 Det. 50  
= 12 kr.; 10 = 10 Pf. Tct.  
G. äuss. conc.; verdünnt  
als Mundw. 10 = 15 Pf.
- Gelatina lichen carragahan.**  
Gelatina l. isl. zu Det.,  
Mixt. 5°0—10°0—15°0. 10  
= 24 kr.
- \***Gelsemium.** Rad. (Narcoti-  
cum) 0°05—0°2 mehrm. tgl.  
pro die höchstens 1°0.  
\*Extr. G. und \*Tinct. G. inn.  
u. äuss. \*Gelsemium My-  
driat.
- Gentianae radix.** Inf. 5°0—15  
auf 200°0, sciss. 50 = 6 kr.;  
100 = 40 Pf., pulv. 10 =  
4 kr. = 5 Pf. Ext. Gent. 0°5  
—1°0 p. d. 5 = 6 kr.; 10 =  
35 Pf. Tinct. G. inn. zu 25  
bis 50 Trpf.
- \***Geoffroya Surinam.** Cort.  
als Anthelminticum in  
Pulv. 2°0 bis 5°0 in Det.  
20°0 auf 200°0. Tct. 20 bis  
60 Tpf. p. d.
- Globuli martialis** v. Ferrum.  
**Glycerinum.** Inn. 20°0—30°0 p.
- die. Lösemittel vieler  
äuss. angewendeter Med.  
50 = 12 kr. Ung. Glyc.: Amyli  
1, Glyc. 15. 10 = 5 kr.
- Gua Pulv.** in Salben 1:4 od. 5  
s. Chrysarobin.
- \***Gossypium herbae.** Emenag.  
u. Abort. Extr. fl. 4—10°0.
- Gramen.** Rad. 20°0—50°0 auf  
200°0. 50 = 4 kr. Extr. 8°0  
—15°0. 10 = 9 kr. = 50 Pf.
- Succus expr.** 15°0—30°0 p.  
die. 50 = 4 kr.
- \***Grindelia robusta** gg. Asthma,  
Blasencat. und Malaria.  
2—4°0 des Fluid-Extr. 3mal  
tägl.
- \***Guaco o. Huaco.** Fol.: 2°0  
der Blätter u. 10°0 der Sten-  
gel oder den Stengel allein  
mit 15°0:800°0 Aq. auf  $\frac{1}{3}$   
eingekocht.
- Guajaci lignum.** In Det. 20°0—  
30°0 auf 200 tägl., 50 = 27 kr.  
pulv. 10 = 8 kr. Tct. Guaj.  
20 bis 30 Tropf., 2—3mal.  
10 = 5 kr. = 15 Pf., pulv.  
10 = 10 kr. = 5 Pf. Resina  
Guajaci nativa. Inn. Pulv.,  
Pill., Emuls. Sol. 0°3—0°6.  
10 = 15 Pf.
- Guarana** v. Paullinia sorb.
- Gummi arab.** v. Mimosa 5°0  
bis 15°0 zu Mixt. und für  
scharfe Mittel. (Camph.)  
50 = 25 kr., pulv. 10 =  
8 kr. = 20 Pf. Mucilago G.  
ar. 1 G : 2 Aq. 10 = 5 kr.  
Pulv. gummosus, als Constit.  
f. Pulv. od. Pill. 10 =  
5 kr. — Syrupus gumm.  
(Muc. G. arab. Syr. spl.  
aa. p. ae.) — Pasta gummosa  
albuminata. Mixt. gumm.  
(Gummi. Sacch. aa. 15.  
Aq. 170.)
- †**Gummi gutti** in refr. Dos. 0°03  
—0°2 mehrm. tägl., 0°3—  
0°5 als Drasticum, Emuls.,  
Pillen.



**Burjun Ol.** 10—15 Tröpf. mehrm. tägl. gg. Blenn. u. Hautkr.  
**\*Hamamelis virgin.** Tonic. und Adstr. 4—8'0 Fluid. Extr.

**Hellebori nigri radix.** In Pill., dos. refr. 0'1—0'2; dos. plen. 0'5—1'0, Inf. 5'0—10'0 auf 200'0. 50 = 14 kr. Extr. H. in Pill., Sol. 0'2—0'6. 1 = 8 kr. — 20 Pf. \*Tet. H. 10—20 Tröpf. 2—3mal.

**\*Helminthochorton.** In Det. 8'0—15'0 auf 100'0 Colatur.

**\*Helminthia tuberosa.** In Pv. zu 5'0—10'0 mit Conserva rosar. als Anthelminticum  
**Hepar sulfuris.** In Pill., Pulv. 0'2—0'3 pro dos. Aeuss. zu Bädern, \*Hep. sulf. mart. in Pill., Pulv. 0'2—0'3, 2—4mal tägl.

**\*Homatropinum hydrobromatum** in wäss. Lösung 1:100 Mydriat. 0'10 = 800 Pf.

**Hordeum vulg.** Det. zum Getränk.

**Humuli Lupuli strobuli.** Inn. in Inf. 5'0—25'0 auf 200'0 Wasser. Aeuss. zu Umschlägen. Extr. H. 10—12'0 auf 200'0. Tet. H. 5'0—10'0 p. die. — Lupulin. 0'3—0'6—1'0 in Pulv. u. Pill.

†**Hydrargyr. acet. oxyd.** Aeuss. geg. Sommersprossen, 1'0:300'0 Aq. rosar. 1 = 5 Pf.

— †**H. bichlorat. albuminatum** solubile zu subcut. Inj.; inn. wie Subl. H. bichl. ammoniatum. (M. praecip. alb.) als Augensalbe 0'10—0'5 auf 5'0 frischer ungesalzener Butter 1 = 3 kr. = 5 Pf. — †**H. bichl. corrosivum.** Inn. in Sol., Pill. 0'005—0'01, 1—2mal; äuss. als Mundw. 0'05—0'1 auf 30'0; Clstr. 0'02—0'05; Augenw. 0'02 auf 50'0; Waschw. 0'05 bis 0'1 auf 30'0. 1 = 1 kr.; 10 = 20 Pf. — †**H. bijodatum**

**rubrum.** (Deutojodur. hyd.) Inn. in Pulv., Pill. alcohol. oder äther. Sol. zu 0'03, 2mal. Aeuss. Ugt. 0'08—0'2 auf 5'0. 1 = 4 kr. = 10 Pf.

— **\*H. bromatum.** Dem Calomel analog, aber nicht so leicht Speichelfluss erregend. — **\*H. cum creta.** (5 Th. Kreide auf 1 Th.

Hydr.) 0'1—0'3—0'6 bei Syph. inf. — **\*H. cyanogenat.** 0'005—0'05, mehrm. tägl.

in Pill. Sol. Aeuss. 0'05—0'1 auf 5'0. Fett. — **H. chlorat.**

**mite.** (Calomel.) Inn. in Pulv., Pill. 0'05—0'6, 2—3mal. Aeuss. zu Clstr., Ugt.

0'05—0'5 auf 5'0. 1 = 2 kr. = 5 Pf. — **\*H. formamidatum**

Sol. zu subc. Inj. 1'0 enth. 0'01 Hg. †**H. jodatum flavum.**

(Protojoduretum Hydr.) Inn. in Pulv., Pill. 0'05—0'2, 2—3mal. Augensalbe

0'1—0'2 auf 5'0. 1 = 5 kr. = 10 Pf. — **H. oleinicum**

statt Ung. Hydr. 1:2—5 Fett. — **H. oxyd. flavum**

(Merc. praec. fl.) Inn. selt. in Pill., Pulv. 0'01 bis 0'05, 2—3mal. Aeuss. das

Pulv. als Aetzm. Ugt. 0'05 bis 0'5 auf 5'0; Augensalbe 0'08 auf 5'0. 1 = 4 kr.

— **\*H. oxydulatum nigrum.** (Merc. solubilis.) Inn. Pulv., Pill. 0'1—0'2, 2—3mal.

Ugt. 0'1 bis 0'5 auf 5'0. 1 = 5 Pf. — **\*H. peptonatum**

solubile zu subc. Inj., weniger reizend als Subl. — **\*H. phosphoric. oxyd.** zu 0'05—0'08, bei Syph. inf. — **H.**

**stibiato-sulfuratum.** (Aeth. antim.) Innerl. Pulv., Pill. 0'1—0'3, 2—3mal. **\*H. sulf.**

**nigrum.** (Aethiops mineralis.) Inn. Pulv., Pill. 0'3—0'6, 2—3mal. Ugt. 4'0 auf 30'0. 10 = 20 Pf. Ung.



- H. cin. 10 = 8 kr. = 20 Pf.  
 \*H. tannicum oxydulatum zu 0'10 3mal tgl.
- Hydrastis canadensis.** Tonicum Extr. 1—4'0 gegen Uterin-Blutungen. Berberinum.
- \*Hydrochinonum Antipyr. subcut. od. inn. 1—2<sup>0</sup>/<sub>10</sub> Lös. zu Inj. bei Tripper.
- \*Hydrogenium hyperoxyd. Desinfect. bei Wundbehandl. Diphtheritis.
- Hydromel** inf. v. Senna.
- Hyoscyamus niger.** Folia. Inn. Pulv., Pill., 0'1—0'2. If. aq. v. vinos. 2'0—5'0 auf 200'0. Aeusserl. zu Breiumschlägen. Clyst. 2'0—4'0. fol. sc. 10 = 6 kr. = 10 Pf. pulv. 50 = 10 kr.; 10 = 17 Pf. Oleum. H. coctum 5'0—10'0 zu Einreib. 50 = 16 kr.; 10 = 16 Pf. †Extr. H. 0'03—0'2, 1—2mal. 1 = 6 kr. = 20 Pf. — \*Hyoscynum hydrojod. wie Atropin. \*Hyoscyamin. 0'05 auf 20'0 Aq. dest. z. Pupillenerweiter.
- \*Hyssopus. Hba. Als Ingrediens der Sp. arom. und Aq. vuln. spir.
- \*Jaborandi Fol. Inf. e 3'0—5'0 ad 200'0. Diaphor. u. Sialagog. 10 = 20 Pf. — Syr. J. 2—3 Esslöffel p. dos. — †Pilocarpinum hydrochlor. 0'01—0'03 p. dos. 3stündl. subc. 0'02 p. dos. 0'01 = 20 Pf.
- Jacea.** Hba. in Pulv. 0'5—2'0 p. dos. in Dect. 5'0—10'0 auf 200'0. sciss. 50 = 5 kr., pulv. 10 = 4 kr.
- Jalapae radix.** Innerl. in Pulv., Pill., Latw., Emuls. in dosi refr. 0'2—0'5; in plena 0'8—1'5, 2—3mal. 10 = 8 kr. Resina J. 0'5—1'0. 1 = 12 kr. = 10 Pf.
- Ichthyocolla.** Zu Clyst. 2'0—4'0 auf 120'0 10 = 33 kr.
- \*Ichthyolum ext. mit Vaseline 30—40% bei Prurigo und Pruritus; int. in Pill. bei rheumat. Aff. à 0'10 4—10 St.
- \*Jequirity. Sem. Inf. 0'5; 100 zu künstlicher Conjunct.
- †Jodoformium. 0'02—0'20 p. die in Pulv., Pill., äuss. als Streup.; in spir. Lös. zu Einreib., in Salben 1:20; Clyst. mit Album Ovi 1:50. 1 = 6 kr. = 10 Pf. pulv. 1 = 1 kr.
- \*Jodol, Ersatz für Jodoform. in Pulv., Salbe, Glyc.
- †Jodum. Inn. in Sol. 0'01—0'03 mit 1'0 Natr. mur. in 400'0 Aq. Aeuss. zur Einathm. durch Verdampfung einer Jod-Kochsalzlösung u. s. w. zu Ugt. 0'5 auf 30'0 Fett. 1 = 6 kr. = 15 Pf.
- †Tinct. Jodi selt. inn. 2—10 Tpf., 2—3mal. Zu Einspritz. 1 Th. auf 2—30 Thle. Zur Bepinselung der Haut und Schleimhaut 5 = 5 kr.; 10 = 25 Pf. — \*Aether jodat. zur Einath. — \*Ammon. Jod. zu 0'1—0'5 bei Scropheln. bei Psor. 1'5—5'0 auf 30'0 Cer. — \*Amylum jodat. 2'0 2mal tägl. — \*Chloroform. Jod. (0'2 Jod auf 30'0, Chlorof.) zu Aetzg. — \*Glycerinum jodat. Jodi puri-Kali hydroj. aa. 5'0, Glycerini 100'0. Aeuss. bei Lupus u. s. w. — \*Jodo-Tannin, Jod und Tannin aa. in 10 Th. Aq. — Syr. jodotannico. 1 Kaffeel. tgl. 2mal.
- Ipecacuanhae radix.** Innerl. Plv., Pill., Mixt. 0'05—0'1, 3—4mal. If. dos. refr. 0'1—0'5 auf 200'0. Dos. plena 1'0—2'0, den dritten Theil alle <sup>1</sup>/<sub>4</sub> St. bis zum Erbrechen. Aeuss. in Salben. zur Pustelbildg. 1 = 3 kr. =

5 Pf., pulv. 1 = 4 kr. = 10 Pf.  
Syr. lp. Zusatz zu Mixt. u.  
Inf. 10 = 5 kr. = 10 Pf.  
Tct. 5 = 7 kr. Emeticum,  
stärkste emetische Dosis  
0'015.

Iris florentina. Rad. zu Zahn-  
pulv. 10 = 5 kr.

\*Juglans regia. Fol. Zu 15'0—  
30'0 auf 100'0—200'0 Det.

Extr. J. 0'3—1'0, mehrm. tgl.

Juniperus comm. Beeren. Inn.

Pulv. 0'6—1'5, 2—3mal.

Inf. 15'0—30'0 auf 200'0.

50 = 2 kr. — Roob jun.

15'0—30'0 tägl. 50 = 38 kr.

Das Holz in Det. 15'0—30'0

in Mixt. als Diureticum.

Oleum zu Einreibgn. 1 =

2 kr. = 5 Pf. Ung. l. 10 = 5 kr.

Kalium Antifebr. 0'50—1'0  
bei Typhus etc.

Kallium aceticum solut. (Liqu.

terrae fol. tart.) 10'0—30'0,

in Mixt. p. die. 10 = 5 kr. =

15 Pf. K. bromatum. Inn. 0'3—

0'5 p. dos. in Sol. Pill., Pulv.

Aeuss. 1'0 auf 10'0 Fett.

10 = 9 kr. = 15 Pf.; pulv.

= 10 kr. — K. carbonicum

crudum. Bloss äusserlich zu

Bädern 100'0—120'0. Wasch.

2'0—5'0 auf 400'0. 100 =

15 kr. = 30 Pf. — K. carbonio.

depur. (Sal tartari.) In Sol.

0'2—1'0, 2—4mal. Aeuss. als

Augenw. 0'1—0'3 auf 30'0.

10 = 4 kr.; 100 = 35 Pf. —

K. carb. sol. (Ol. tartari per

deliquium.) 5—25 Tpf.,

2—4mal. 10 = 2 kr. —

Pot. Riveri esslöffelweis.

K. causticum. (Lap. chir.)

Bloss äuss. als Aetzm. b.

Bisswunden, 0'05—0'5 zu

Waschw. — K. chloric. Inn.

1'0 auf 100'0 Aq. dest.

Mundwass. 1:100, 10 = 3 kr.

= 10 Pf. — \*K. chromicum

navum. Als Emetie. 0'1—

0'2 für Erwachsene, 0'1

für Kinder. — \*K. chromi-

cum rubrum. (K. bichrom.)

Aeuss. in concentr. Lösung

gegen syphilit. und kreb-

sige Auswüchse. — K.

citrin. (Potio Riveri anti-

emetica.) K. cabr. dep.

4'0, Succ. citri rec. pr.,

Aq. comm. aa. 50'0, Syr.

simpl. 15'0. — K. ferro-

tartaricum. (Globuli mart.)

Zu Bädern bei Scrophul.,

Anämischen. 10 = 25 kr. —

K. hydrooxydat. (Kal. caust.

fusum s. Lapis caust. Chir.)

10 = 10 kr. — K. hydro-

tartaro. (Cremor tartari.)

Innerl. in Pulv., Latw.,

Mixt. 3'0—6'0, 2—4mal.

Aeuss. als Zusatzmittel zu

Zahnpulv. 10 = 6 kr. —

K. hypermang. cryst. Mildes

Caust. u. Desinfectionsm.

0'5—5'0 auf 300'0 Aq.

Waschw. 10 = 41 kr. = 15 Pf.

— K. jodatum In Sol., Pill.

0'2—1'5, 3—4mal; Augenw.

0'2—0'6 auf 30'0, Ugt. 2'0

—4'0 auf 30'0. mit Jod in

Glycerin od. Salbent. 10 =

30 kr. = 50 Pf. — K. natronato-

tartaricum. (Tart. Lixivae

et Sodae, Seignette-Salz).

In Pulv., Sol., Mixt. als Küh-

lungen. 1'0—2'0, 3—4mal,

als Purgans 2'0—25'0, 1—

2mal. Aeuss. zu Clystieren

15'0—30'0. 10 = 4 kr. — K.

nitric. dep. Inn. Det. Emuls.

5'0 auf 300'0. Aeuss. zu

Bähungen, Waschungen,

Mundw., Streupulv. 10 =

2 kr. — \*K. picro-nitricum.

0'2—0'6, mehrm. tägl. geg.

Wechselfieber empfohlen.

— †K. stibiotartaricum. (Tart.

stibiatus velemet.) Innerl.

in dosi refr. in Sol., Mixt.,

schleimigen Det., Pill.,

0'005—0'01 p. dosi. 1—4mal

im Tage; dosi plena 0'1—

0·3 in der näml. Form. Aeuss. am häufigsten in Empl. mit Mezereum oder Cantharid., aa. 1·0, Clyst. 0·3–1·0; in Ugt. 2·0–5·0 ad 15·0. 1 = 2 kr.; 10 = 20 Pf. — (Ung. Autenriethi) u. Pflaster 1:4. — Empl. diachyl. comp. 1 = 2 kr. — †Vinum stibiat. dos. refr. bei Kindern 5–10 Tpf., 2–4mal, dosi plena 10·0–25·0 p. dos. Kindern kaffee-löffelw. 10 = 10 kr. — \*K. tartaricum boraxatum. (Tart. boraxatus, Cremor tartari solub.) In Sol. 0·1–0·2, 3mal; als Purgans 15·0–30·0. 10 = 20 Pf. — K. natrio-tartaricum Sal. Seignetti. Wie d. Vorige. 10 = 4 kr. — K. tartaricum (Tart. tartari-sat.) Inn. in Sol. und Pulver, nur mit sehr trockenen Pflanzentheilen 0·3–1·5, 4m.; als Abführm. 15·0–30·0. 10 = 10 kr. — K. sulfuratum (Hepar. sulf. kal.) Inn. in Pulv. 0·1–0·2, 3–6mal, bei Vergiftungen 1·5–6·0 in kurzen Zwischenräumen. Aeuss. zu Bädern 70·0–150·0 auf 1 Bad; zu Waschungen 4·0–8·0 auf 30·0. 10 = 12 kr. = 20 Pf. K. sulf. pro balneo 60 = 9 kr.; 100 = 50 Pf. — K. sulfuricum. (Arc. duplic.) Inn. als auflösend, kühlend. Mittel in Plv., Sol. 1·0–5·0; als Purgans 30·0–100·0, 1–2mal. 50 = 6 kr., pulv. 10 = 3 kr.

Kamala. (Anthelminthicum.) 10·0 bis 15·0 Pulv. mit Wasser. 1 = 4 kr. = 5 Pf.

\*Kava - Kava, schweisstreibend, 30–50 Tropf. inn.

\*Keratinum zum Ueberziehen v. sog. Darmpillen.

Kino, Gummi Kino. Inn. als Plv., Pill., Sol. 0·3–0·6. 10 = 20 Pf.

Kouso v. Koso, Brayera anthelminthica. Flores. 20·0 Pulv. auf 2mal in Limonade zu nehmen. sciss. 50 = 15 kr.; 10 = 20 Pf., pulv. 10 = 6 kr. = 25 Pf.

\*Lanolin, Salben-Constituens bei Hautkrankheiten.

Lapis mitig. v. Arg. nitr.

Laurocerasi aqua. Innerlich rein oder in Mixt. 5–30 Tropf., 2–3mal. Augenw. 2·0–5·0 auf 15·0. 10 = 5 kr.

Lavandula. Flores, Aq. Spir. Zum äuss. Gebrauche. 50 = 24 kr., conc. 10 = 5 Pf.

Ol. L. 1 = 3 kr. = 5 Pf. Spir. L. zu Waschungen. 50 = 20 kr.

\*Ledum palustre. Hba. 10·0–15·0 auf 120·0. If., geg. Keuhlhusten und Rheum.

Lichen carragaheen. 2·0 auf 120·0. — L. islandicus. 10·0–20·0 auf 200. 50 = 6 kr.; 100 = 35 Pf.

Lignum campechianum innerl. in Dec. 5·0–15·0 auf 100. 10 = 1 kr.; 100 = 15 Pf. Extr. l. c. 1 = 10 Pf.

Linimentum ammoniatum 50 = 16 kr.; 10 = 10 Pf.; L. saponato-camphoratum. (L. volatile camphor.) Aeuss. bei Rheum. 50 = 14 kr.; 10 = 10 Pf. — L. saponato-camphorat. liquid. (Opodeldoc fluid.) äusserl. gegen rheumat. Schmerzen. 10 = 10 Pf. — L. saponato-chloroformiat. 10 = 10 Pf.

Linum Sem. in Dec. 30·0–60·0 auf 400·0 Aq. 50 = 4 kr.

Ol. L. zu Salben, Linimenten. 50 = 8 kr.

Liquiritia. Radix. 15·0–30·0 auf 200·0. sc. 50 = 6 kr. pulv. 10 = 6 kr. Extr.

5 = 9 kr.; 1 = 5 Pf. —  
*Succus l. pulv.* 10 = 8 kr.  
*Liquor acidus Halleri.* 3 Thl.  
*Spir. Vini rect.*, 1 Thl.  
 acid. sulf. conc. 5–20 Tpf.  
 auf 1–2 Esslöffel Zucker-  
 wasser od. 5'0 auf 30'0 Syr.  
 rub. idaei dem Getränke  
 beizumischen. 10 = 3 kr.  
*L. ammonii anisat.* (Stimu-  
 lans.) 10–20–40 Tpf. in  
 Mixt. 10 = 4 kr. = 10 Pf.  
*\*Lithium carbonicum.* 0'3–0'5  
 p. d., 2–3mal tägl. 1 = 10 Pf.  
*Lobeliae inflatae herb.* In  
 Pulv. 0'5–1'0, 2–3mal;  
 Inf. 5'0–10'0. 10 = 5 kr. =  
 15 Pf. †*Tet. L.* 10–20 Tpf.,  
 2–6mal. 5 = 4 kr.; 10 =  
 15 Pf.  
*Lupulinum.* 0'3–0'6 p. d. 1 bis  
 2mal tägl. in Plv., Pillen  
 1 = 1 kr., *glandula Lupuli*  
 10 = 15 Pf.  
*Lycopodium.* Sem. 0'5–1'5, 2–  
 3mal tägl. in Pulv. Aeuss.  
 als Streupulv. 50 = 21 kr.  
*Maels,* siehe *Nux moschata*.  
*Magnesium borocitricum* 0'5  
 p. die in Plv. *M. carb.*  
 0'3–1'5, 3–4mal Aeuss.  
 als Zusatz zu Zahnp. 10 =  
 4 kr. = 10 Pf. — *M. citricum*  
 0'3–0'5 p. d. 5 = 14 kr.;  
 10 = 20 Pf. — *Pot. magn.*  
*citr. effervens* w. d. Vorige.  
*Dos.* = 54 kr. *M. hydro-ox-*  
*datum.* (*M. hydrica.*) Gegen-  
 gift gg. Arsenik 50 = 13 kr.  
 — *M. lacticum.* Als Abführm.  
 2ständl. 1 Essl. Gegengift  
 gegen Arsen. 5 = 15 kr.;  
 1 = 5 Pf. — *M. oxydat.* (*M.*  
*usta.*) In Pulv., Mxt. 0'3–  
 1'5, 10 = 14 kr.; 10 = 15 Pf.  
 — *M. sulfuricum.* Inn. in  
 Sol., Pulv., Latw. 1'5–5'0  
 als *Solvens.* 2–3mal tägl.,  
 15'0–30'0, als Abführm.;  
*Clyst.* 15'0–90'0. 50 = 5 kr.;  
 100 = 15 Pf.

*Maltum* 50 = 7 kr. Extr. *M.*  
 10 = 10 Pf.

*Malva vulg.* Föl. Zu Gargelw.  
*Spec. emoll.* 50 = 6 kr.  
*flor.* = 11 kr., conc. 10 = 15 Pf.

*Manganum hyperoxydat. nati-*  
*vum.* In Plv., Latw., zu  
 0'05–0'5, 1–3mal tägl.  
 Aeuss. als Ungt. 5'0–10'0  
 auf 30'0 Fett. 50 = 11 kr.  
 — *\*M. aceticum.* 0'3–0'6  
 p. d. *\*M. muriaticum.* 0'3–  
 1'0 p. d. Aeuss. 4'0 auf  
 120'0 – 200'0 Aq. — *\*M.*  
*phosphoricum.* 0'6 p. d. — *\*M.*  
*sulfuricum* 4'0 auf 120'0. Aq.  
 p. die. zu Ungt. 4'0 auf  
 30'0 Fett.

*Manna,* als Zusatz zu If.  
 und Det. 10'0 = 5 kr. = 15 Pf.  
 — *Syr. mannatus.* 1–2  
 Kaffeel. voll 10 = 3 kr. =  
 10 Pf. — *Mannit.* 2'0 bis 8'0  
 für Kinder, führt schmerz-  
 los ab.

*Massa pilul. Ruff.* 5 = 10 kr.

*\*Matteo.* Hba. (Adstring.)  
 Det. Inf. 15'0 auf 200. Zu  
 Einspritz. Pulv. z. Blut-  
 stillung. conc. 10 = 15 Pf.  
*Tot. M.* 20–40 Tpf. Aq. *M.*  
 100 = 15 Pf.

*\*Maydis stigm.* 2 4'0, Extr. fl.  
 p. die gegen Blasenleiden.

*Mel depuratum.* In Sol., Mxt.,  
 Latw. 15'0–30'0, 2–3mal,  
 zu Clyst. 30'0–50'0. 50 =  
 10 kr. *M. rosat.* 50 = 17 kr.  
 — *Oxymel simpl.* 30'0–60'0  
 auf 400'0 10 = 3 kr.

*Melilotus.* Hba. et Summitates.  
 Inf. 5'0–10'0 auf 200'0,  
*sciss.* 50 = 5 kr.; 10 = 5 Pf.,  
*pulv.* 10 = 4 kr. = 10 Pf.  
*Emplastr.* *M.* 10 = 4 kr.

*Melissa.* Hba. Inf. 4'0–8'0 auf  
 200'0–250'0. 50 = 14 kr.;  
 10 = 10 Pf. Aq. *M.* 50 = 7 kr.;  
 100 = 15 Pf.

*Mentha crispa.* Hba. Inf.  
 — 15'0 auf 400'0 Aq.



- Mixt. 50 = 12 kr.; 10 = 10 Pf. Aq. M. cr. 100 = 15 Pf.  
 — \*M. piperita. Hba. Inf. 10'0—15'0 auf 200'0. 50 = 12 kr.; 10 = 10 Pf. Ol. 1—2 Trpf. auf Zucker. 1 = 15 kr. = 20 Pf. Elaeosacchar. 4'0—8'0 zu Pulv. Aq. M. p. 50 = 6 kr.; 100 = 15 Pf.  
 Rotulae M. p. 10 = 5 kr.; Spir. M. p. 50 = 14 kr.  
 \*Mentholum bei Migräne, Neuralgie, Zahnschmerz.  
 \*Methylenum bichloratum statt Chlorof. bes. in England.  
 Millefolium. Hba. 30'0—50'0 auf 400'0 Inf. oder Det. 50 = 5 kr.; 100 = 35 Pf. Extr. 1'0—3'0, 2—4mal. 1 = 30 Pf.  
 \*Millipedes. 0'1—0'3, gegen Hydrops.  
 †Morphinum, siehe Opium.  
 \*Moschus. Inn. in Pulv., Pill., Mixt. 0'04—0'3, 3—6mal. 0'01 = 10 Pf.  
 Mucilago cydon. Sem. 10 = 3 kr. M. gumm. ar. 10 = 5 kr.  
 Myrrha. In Pv., Emuls. 0'3—0'5, 2—3mal. Aeuss. Pv. 10 = 10 kr. = 15 Pf. Tot. 10 = 5 kr. Ol. Ungt., Extr. 1'5—2'0, 2—3mal. 1 = 10 Pf.  
 \*Naphtalinum. 0'05—0'2. mehrmals tägl. in Syr., Linctus, Emuls. Aeuss. 2 Th. auf 20 Th. Fett. 10 = 10 Pf.  
 \*Naphtol v. Pix. liq.  
 \*Nardus celtica. 8'0—15'0 auf 120'0—200'0 Inf.  
 Natrum aceticum. (Terra fol. Tart. siccae seu crystall.) 5'0—15'0, das getrocknete 0'2—1'0, 2—3mal. Aeuss. als Einspritz., Waschw. 5 = 4 kr.; 10 = 5 Pf. = N. benzoicum 0'10—0'3 und bis 0'5—1'0 mehrm. tgl. 10 = 50 Pf. — N. boracicum (Borax) zu Pinselsaft 5:30 zu Waschungen 2:30, 10 = 3 kr. N. bromatum inn. 10 = 20 Pf. — \*N. chloricum o. oxy-mur. 2'0—5'0 auf 150'0 Aq. 10 = 30 Pf. — N. hydrocarb. (N. bicarbon.) 0'3—1'5, 2—4mal. 50 = 5 kr.; 10 = 5 Pf. — Pulv. aërophorus 2:1'5 Weinsäure. 10 Dos. = 35 kr. — Pulv. aër Selditzensis Natr. u. Weins. je 3:10 weinsaures Kalium-Natr. 10 Dos. = 85 kr. — N. citricum. Wie N. carb. — \*N. lacticum. 2'0—5'0 p. d. 1 = 5 Pf. — N. jodatum, wie Kal. jodat. 10 = 60 Pf. — \*N. nitricum. Wie Kali nitricum. 10 = 5 Pf. — N. phosphoricum. Als solvens 0'3—1'5, 2—4mal; als purgans 15'0—30'0 auf 120'0, 1—2mal. 5 = 3 kr.; 10 = 10 Pf. — N. salicylicum 0'5—1'5 Pill., Pulv. Sol. Temp. herabs. Antipyreticum, bes. innerl., besser als Salicylsäure. 1 = 3 kr.; 10 = 50 Pf. — \*N. subphosphor. 0'5—1'0—2'0. pro die in Solut. geg. Tuberculose. — \*N. hyposulfurosum. 3'0—5'0 p. die. Aeuss. 30'0 bis 120'0 zum Bade. 10 = 5 Pf. — N. silicicum. 0'5—1'0, 2mal tägl. geg. Gichtab-lagerungen. 50 = 10 kr. N. salicylicum Inn. in Pulv. 1—4'0, 2—5mal tägl. — N. sulfuric. 1—4'0, crystall. (Sal Glauberi.) Wie 15 Magnesia sulf. 50 = 8 kr.; 100 = Pf.  
 Neurinum bei Diphtheritis mit 3—6procent. Lösung stündl. zu bepinseln.  
 \*Nicotianae folia. Inn. in If. 0'05—0'15, 3—4mal 1 Essl. Clyst. 2'0—5'0 auf 300'0. 10 = 15 Pf. \*Extr. in Plv., Pill. 0'8, 1—4mal. Aeuss. — \*Nicotinum. 0'002—0'005, inn. bei chron. Darm-Catarrh



als Inj. 0'05 auf 15'0 schleimige Flüssigkeit, bei Blasenlähmung.

**Nux moschata.** 0'3—0'5 in Pulv. p. d. 50 = 39 kr., pulv. 10 = 12 kr. = 30 Pf. — **Ol. macidis.** 1—3 Tropf. auf 2'0 Zucker. 1 = 5 kr. = 10 Pf. — **Elaeosacchar. macidis.** 5'0 zu Pv., Tct. 10—20 Tpf. p. dos. 10 = 20 Pf.

†**Nux vomica.** In Pulv., Pillen 0'02—0'15. 10 = 6 kr. †**Extr.** ebenso; **Extr. spir.** für Kinder. 0'005—0'01, 2—3mal. 1 = 13 kr. †**Tct.** 5—10 Tpf., 1—2mal oder 2'0—4'0 auf 200'0—250'0. 5 = 4 kr.

\***Oleum anthelminticum.** (Ol. Chabert) gegen Bandw. 2'0—5'0 p. dos. \***Ol. animale aethericum.** Ol. animale Dipelli 5—20 Tpf. p. dos. (Nervinum.) — **Ol. cadinum,** äusserl. 50 = 8 kr. — **Ol. cajuputi.** Aetherisch. 1—10 Tpf. auf Zucker. Nervinum. — †**Ol. crotonis.** Acre drastic. Inn. 0'005—0'02. 1 = 4 kr. — **Ol. Gaultheriae,** wie Salicylsäure; 10 Tropfen in Glycerin oder Wasser. — **Ol. jecor. asell.** 5'0 p. d. 1—3mal tägl. 50 = 10 kr.; 100 = 35 Pf. — **Ol. j. as. ferrugineum.** Ebenso. — **Ol. Olivar.** 50 = 14 kr. — **Ol. petrae dep.** Innerlich. 5'0—6'0 selten, äuss. gegen Ausschläge. — **Ol. Ricini** 50 = 13 kr. — **Ol. rosar.** 1 = 37 kr.; 1 Trpf. = 5 kr.

**Ononis spin.** 2'0—5'0 auf 400'0 Det. 50 = 4 kr.; 100 = 40 Pf.

†**Opium.** Pulv., Pill. 0'01—0'05; bei Tetanus, Del. tremens 0'05—0'2, 2—3mal. Aeuss. zu Ungt., Empl., Einreibg. 1 = 6 kr. = 15 Pf. — \***Acetum opii,** zu 3—5—10 Tpf., 2—

3mal tägl. — = 60 Pf. — †**aq. aquos.** Ebenso schwächer) 1 = 45 Pf. — †**Tinct. O** Tpf., Mxt. 10—1 Linimenten. U auf 5'0. 5 = 5 kr. — †**Laudan. liquid** Op. crocata.) einfache Tct. 5 1 = 10 Pf. — P Op., Ipecac. aa Zucker. 0'1—0'1 = 2 kr. — † In Pv. wie das 0'05 = 3 kr.; 0' — †**M. acet.** In Pill., Sol. 0'005 2mal; enderm. — 0'3 auf 5'0; 0'08. 0'10 = 10 hydrochloricum. aceticum. 0'05 = 10 Pf. — \***Coc** 0'015—0'06 mel in Pulv., Pill. 0 phosph. frisch subcut.; inn. 0 stark wie Morf **Origanum.** Hba. 1 gen. 50 = 5 kr. **Ovum gallinaceum.** men gegen Su giftung. \***Paeonia.** Rad. P Inf. 5—10'0 auf \***Pancreatin** Ston 5'0 inn. 1 = 20 **Papainum,** wie Pe bis 0'50 Als E Sacch. oder Na Zur Bepinsel. 0 **Papaver, albi semi** in Emuls. 10'0 200'0—250'0. — alb. Wie Oleu dale. — P. (capitapapave 10'0—15'0 auf esslöffelw. A

- schlagen. Clyst. 50 = 5 kr.  
— Syrup. diacodii. Theelöffelw. 10 = 3 kr.
- \*Papayotinum zu Einpins. bei Diphtheritis u. Croup; inn. 0'10—0'50 gg. Dyspepsie.
- \*Paraldehydum Hypnoticum in Emuls. Kapseln zu 1—3'0.
- Paullinia. Pasta Guarana. Adstring., Nervinum Inf. 5'0—10'0 (geg. Diarrhöe, Rheum. etc.) 1 = 6 kr. = 5 Pf.
- \*Pelletierinum tannicum. Anthelminthicum. Dosirung 0'30—0'40.
- \*Pengawar Djambi blutstillende Pflanzenwolle.
- \*Pepsinum. Pv. 0'1—0'8 p. dos. In Kapseln. 1 = 10 Pf. — Vinum P. Inn. esslöffelw. nach d. Mahlzeit.
- Petroleum rectifio. Inn. auf Zucker, in Pill., Mixt. 5—15 Tpf., 2—3mal. Aeuss. Z. Waschungen, Ugt., Empl. 50 = 18 kr.
- \*Petroselinum. Hba. et Rad. Aq. Petr. 30'0—50'0 zu Mixt. als Diureticum. 100 = 10 Pf.
- \*Phellandrium aquat. Semina Pv. 0'3—0'5 p. d. Inf. 10'0.
- \*Phlorrhizinum. 1'0—1'2 p. d. gegen Intermittens.
- †Phosphorus. 0'005—0'02, 2—4mal, am besten in Emuls. ol. Aeuss. Ungt. Liniment. 0'5 auf 30'0 Oel oder Fett. 10 = 20 Pf.
- \*Phytolacca. Fructus, gegen Bandwurm.
- \*Pichurim. Faba in Pv. 0'1—1'5 in If. 8'0—15'0 auf 200'0 geg. Durchfälle.
- \*Picrotoxin. Aeuss. 0'3—0'5 auf 30'0 Oel oder Fett, gegen Kopfgrind, inn. 0'001—0'006 gg. Rückenmarkslähmung.
- †Pilocarpinum hydr. v. Jaborandi.
- Pilulae laxantes 2—3 Stück 5 = 11 kr.
- \*Pimpinella. Rad. In Inf. 12'0 auf 200'0. Tet. 20—30 Tpf. auf Zucker.
- \*Piper nigrum et album. Innerl. die Körner, 5—10 Stück; Pulv. 0'3—0'5, 1—3mal; Inf. 5'0—10'0 auf 400'0, esslöffelw., 4—6mal. — \*Piperinum. Inn.-Pulv. oder Pill., 0'5 tägl. — \*Ol. piper. aeth. 1—5 Tpf.
- \*Piscida erythrina, Hypnot. und Sedat. 0'3—0'5 des Abends.
- Pix liquida zu Inhal. bei Bronchial-Catarrh. Mit Fett zu Einreibgn. 50 = 5 kr.; 100 = 20 Pf. Aq. picis aus Pix l. 1, Aq. ferv. 10. 100 = 10 Pf. — Naphtol  $\beta$  in Alkohol u. Salbe 1—15% gg. Hautkrankheiten.
- †Plumbum acet. depur. (Sacch. Saturni.) In Pv. 0'02—0'15, 1—2mal; äusserl. Augenw. 0'1—0'2 auf 30'0; Augensalbe 0'1—0'2 auf 30'0. 10 = 4 kr. = 10 Pf. — Pl. aceticum basicum solut. (Acet. lithargyri). Aeuss. zu Augenw. Einspritz., Ugt., Umschlägen etc. 15'0—30'0 auf 300. 10 = 4 kr. = 10 Pf. Ung. Pl. ac. 10 = 5 kr. Aq. Goulardi 100 = 5 Pf. — Aqua Saturnina. Als Augenw., zu Bähungen, Umschlägen etc. 50 = 5 kr.; 100 = 10 Pf. — Pl. carbonicum. Bloss äuss. zu Streup., Ugt., Empl. 50 = 12 kr. 10 = 5 Pf. — \*Pl. chloratum. 0'5—2'0 Fett. — \*P. oxalicum. Wie Plumb. acet. — \*Pl. iodatum. Innerl. 0'1—0'2. Aeuss. 2'0 auf 30'0 Fett. 1 = 10 Pf. — Pl. oxydatum 50 = 14 kr. und Pl. hyperoxydatum rubr. 50 = 10 kr. Zu Ugt.,

Empl. — \**Pl. tannicum*. Blos  
äuss. in Sol. (Zu Ugt. aa.;  
zu Lösungen in Det. *Quercus*  
q. s. ad praecipitationem.) 10 = 55 Pf.

\**Podophyllum*. Rhiz. 0'04—  
0'08—0'1, 1—2mal tägl. als  
drast. Abführm. 1 = 15 Pf.  
*Resina P. u. Extr. fl.* \**Podophyl-  
linum* 0'08—0'1 in Pillen  
1 = 15 Pf.

\**Polygala amara*. Hba. 10'0—  
15'0 auf 250'0. 10 = 10 Pf.

\**Propylaminum* Trimethyla-  
min, Sedativum. Antipyre-  
ticum 0'01—0'2—0'3 in  
starker Verdünnung 4 bis  
5mal tägl. äuss., Aetzm.  
1 = 5 Pf.

*Pulpa cassiae* (ex fruct. *cassiae*  
fist.). Zu Mixt. 2'0—5'0.  
50 = 48 kr.

\**Pulsatillae nigr. herba rec.*  
In If. 2'0—10'0 auf 100'0,  
esslöffelw.; Pulv., Pill.,  
Latw. 0'1—0'3, 3—4m. Extr.  
0'05—0'2, 2—3mal. 1 = 15 Pf.  
Tct. 4 bis 10 Tpf., 3—4mal  
tägl.

*Punica granatum*, rad. cortex  
recens. Det. 30'0 bis 60'0  
auf 250'0—300'0. r. t. 50  
= 31 kr.; 10 = 15 Pf.; pulv.  
10 = 10 kr. = 20 Pf. Extr.  
in Sol., Latw. 15'0—25'0  
tägl. 5 = 23 kr.; 1 = 35 Pf.

*Pyrethri radix*. In Pulv.,  
Pill., Latw. 0'5—1'5; If.  
0'05—0'2 auf 100'0—200'0,  
esslöffelw., 3—4mal. 50 =  
13 kr.; 10 = 25 Pf. Tot. 10—  
30 Tpf., 2—3mal. Gurgelw.  
10'0 ad 25'0. 10 = 20 Pf.

*Pyridin*, b. Asthma, zu Inhal.  
4—5'0 auf ein Tuch.

*Quassiae lignum*. In Inf.  
seltener, Det. 5'0—10'0 auf  
200'0, esslöffelw. 50 = 6 kr.;  
10 = 5 Pf., pulv. 10 = 6 kr.  
10 Pf. Extr. in Sol., P.

0'3—0'5, 3—4mal.  
1 = 20 Pf.

\**Quebracho* (sprich  
scho). Lign. Cor  
10 Pf. \**Extr. Q.*  
Theel. 2—3m. tägl.  
wachsenen. \**Que*  
hydrochlor. Inn.  
Pill. Sol. ebenso

*Quercus*. Cortex. In  
auf 200'0 Aq. ad  
50 = 4 kr.; 100 =

*Ratanhiae radix*. In P  
1'0—3'0, 2—3mal  
Det. 10'0—15'0  
esslöffelw., 4—5m  
Einspritz., Mun  
18 kr., pulv. 10 =  
15 Pf. Extr. in Pv  
2—4mal. 5 = 32  
15 Pf. Tct. 10—30  
5 kr. = 20 Pf.

*Resorcinum puriss.*  
2'0 p. die in Sol  
1—5% in Sol.  
sept. und Antip

*Rheum chinense rad*  
Pill., Latw. 0'1  
refr.; dos. pl. 2'0—  
3mal; If. 5'0  
10'0—15'0 ad 12  
sciss. 10 = 18 kr.  
pulv. 1 = 3 kr.  
Extr. Rh. 5 = 34  
20 Pf. Tot. Rhel a  
Mxt. 5'0—12'0 a  
250'0. 10 = 4 kr.  
Tot. vin. ebenso  
Trpf., 2—3mal.  
= 25 Pf. Syr.  
3 kr. = 10 Pf.

\**Rhododendron*. Fo  
1'0 p. d. Inf. 5'0  
gegen Gicht.

\**Rhus toxicodendr*  
Inn. Plv., Pill.  
2—3mal. If. 0  
120'0, 3—4mal  
*Ricinus*. Oleum.  
15'0—50'0 al

Emuls. Aeuss. zu Klyst.  
50 = 13 kr.; 100 = 60 Pf.

\**Rubia tinctorum*. Rad. 0'5—3'0  
in Pulv., 20'0 auf 200'0 Det.

\**Ruta*. Hba. 10'0—15'0 pro Inf.  
10 = 10 Pf.

*Sabadilla*. Semen. Aeuss.  
zur Tödtung von Parasiten  
in Pv. od. Det. 10'0 auf 200'0  
Fruct. 50 = 7 kr.; 10 =  
15 Pf. pulv. 10 = 5 kr. =  
20 Pf. Ung. 10 = 6 kr.

†*Sabinae frondes*. Inn. Pil.,  
Latw. 0'3—1'5, 2—3mal.  
If. od. Det. 5'0—10'0 auf  
200'0. Esslöffelw. 3—4mal.  
sciss. 10 = 3 kr. = 5 Pf.,  
pulv. = 5 kr. = 10 Pf.  
Extr. 0'5—1'5, 2—3mal. 1 =  
25 Pf. Ol. 1—2 Tpf. täglich.  
Aeuss. geg. Condyl. 1 = 5 Pf.

*Salap. Radix*. 1'0 auf 200'0  
Det. 10 = 11 kr.

*Salix*. Cortex. 15'0—30'0 ad  
400'0 Aq. auf 200'0 einge-  
kocht. 50 = 5 kr. 100 =  
30 Pf. — \**Salicinum* In Sol.,  
Pill. 0'2—0'6 p. d.

\**Salol*, Antirheumaticum u.  
Antisept. 6—8'0 tägl.

*Salviae folia*. In If. 10'0—15'0  
ad 200'0 tägl. 50 = 10 kr.,  
pulv. 10 = 5 kr.; 100 = 55 Pf.  
Aq. S. 100 = 15 Pf. Extr. S.  
in Pill., Sol. 2'0—5'0; äther.  
Oele 1—2 Tpf., 3—4mal.

*Sambucus*. Flores. 10'0—15'0  
in Inf. 50 = 9 kr.; 100 =  
45 Pf. Aq. S. 100 = 5 Pf.  
Roob 15'0—30'0 zu Mixt.  
50 = 20 kr. Syrup. Ebenso.

\**Sanguis draconis*. 0'3—1'5,  
mehrm. tägl.

†*Santoninum s. Cina* 0'10 =  
2 kr. 1 = 15 Pf.

*Sapo amygdalinus s. medic.*  
Inn. gegen Vergiftungen  
mit Säuren 5'0 p. d., alle  
Viertelstunde in warm.  
Aq. gelöst. Als Solvens  
0'3—0'5 in Pillen p. d. —

*Sapo carbolicus* (sapo phe-  
nylatus) äuss. als Desin-  
ficiens. *Sapo crotonis*, 0'1—  
0'15—0'25. *S. jodatus* äuss.,  
ebenso *Sapo ol. jecor.*  
*aselli*. *S. kalinus*. (viridis)  
50 = 6 kr., *S. medicinalis*  
10 = 6 kr. *picis* 50 = 50 kr.,  
*S. sulfuratus*, spir. saponat-  
us 50 = 50 kr. Zu Ein-  
reibungen. Spir. sapon. kal.  
50 = 28 kr.

*Sassaparillae* Rad. In Plv.,  
Ltw. 10'0—15'0 tägl.; Inf.,  
Det. 10'0—30'0 auf 400'0  
tägl. 50 = 40 kr.; 10 = 20 Pf.  
Extr. 1'5—3'0 p. d.

\**Sassafras*. Lignum. 30'0—  
50'0 ad 400'0. Inf. 100 = 45 Pf.

\**Satureja*. Hba. Ingrid. d.  
spec. arom. u. Elect. arom.

\**Scammonium* 0'5 dosi plena;  
0'1—0'2 dosi refr. in Pulv.  
oder Emuls. 10 = 55 Pf. —  
*Resina Scammonii*. 0'1—0'5  
als Purgans. 1 = 10 Pf.

*Scillae Bulbus*. Inn. Pulv.,  
Pill., Latw. 0'05—0'15, 2—  
4mal. Inf. mit Wein oder  
Bier 5'0 auf 120'0. Ess-  
löffelw., 4—6mal. Aeuss.  
Ugt., Umschl. 1 = 2 kr.  
= 5 Pf. †Extr. Sc. 0'1—0'2.  
5 = 11 kr.; 1 = 10 Pf. Acet.  
*scillae*. 20—60 Tpf. 10:100  
als Mundwasser. 10 =  
1 kr. = 5 Pf. Tct. 10 bis  
20 Tpf. 10 = 1 kr. = 15 Pf. —  
*Oxymel*. 15'0—30'0 in Mixt.,  
Latw. 10 = 3 kr. = 15 Pf.

\**Scillitinum*. 0'01—0'1

†*Secale cornutum*. Inn. Pulv.,  
0'1—0'5 Inf. 2'0—5'0 auf  
200'0. 10 = 3 kr. = 20 Pf.

— \**Ergotinum purum*. (Extr.  
Sec.c.) 0'005—0'025 in Pulv.  
od. Sol. 1 = 5 kr. = 45 Pf.

*Senega*. Rad. 0'3—1'5 p. d. Pv.  
od. Pill., Inf. 10'0—12'0 ad  
120'0—200'0. 50 = 25 kr.,  
10 = 25 Pf. Extr. S. 0'25—1'0



inn. 1 = 20 Pf. — Syr. S. theelöffelw. allein od. als Zusatz.

**Senna alexandr.** Fol. Dosi refr. Pv. 0'3—0'5, If. 2'0—5'0 auf 120'0; dosi pl. Plv., Latw. 5'0—10'0, 3—6mal, Inf. 10'0—15'0 auf 50'0—100'0. 50 = 22 kr.; 10 = 20 Pf. pulv. 10 = 8 kr. = 25 Pf. Elect. lenitivum. 1:10 Const. 50 = 28 kr. — Aq. lax. Vienn. Inn. 15'0—60'0, 2—4mal tgl. 10 = 4 kr. = 15 Pf. — Hydromel inf. (Aq. lax. mit  $\frac{1}{3}$  Syr. mann.) 1 Kaffee-, Esslöffel voll 10 = 5 kr. — Syr. mannat. 2—4 Kaffee. 10 = 8 kr. = 10 Pf.

\***Serpentaria.** Rad. Pv. 0'5—1'5 p. d. Inf. 10'0—15'0 auf 120'0 bis 200'0. 10 = 10 Pf.

\***Simaruba.** Cortex. Inf. 10'0—25'0 auf 200'0.

**Sinapis nigra.** Semen. Inn. 1'5, 2—3mal tgl. mit Syrup etc. Aeuss. als Rubefaciens; zu Waschungen 10'0—150 auf 200'0. Inf. — Det. zum Bade 200'0—250'0; Mund- und Gurgelw. 2'0—5'0 auf 200'0. 50 = 5 kr. pulv. 50 = 10 kr. — \*Ol. sinap. aeth. Aeuss. 6 Tpf. auf 5'0 Oel od. 24 Tpf. auf 30'0 Alkohol zu Einreib. 1 = 12 kr. = 20 Pf. Spir. Sin. 5 = 8 kr.; 10 = 15 Pf.

**Sinap. alba.** 1 Kaffeeöffel Samen vor dem Essen.

\***Sparteium sulf.**, wie Digital., in wäss. Sol. 6 10 p. d.

**Species ad cataplasma.** 50 = 22 kr. Sp. altheae 50 = 7 kr.

— Sp. laxant. (Saint Germain.) 50 = 50 kr. 10 = 30 Pf.

— Spec. narcoticae. (Hb. Bellad., Conii mac. Hyosc.,

Flor. cham. au. p. aqua.)

**Spilanthus oleraceus.** Hba. Antiscorb. 50 = 20 kr. Tet. Sp. 5 = 4 kr.; 10 = 35 Pf.

**Spiritus aether.** 10—30 Tpf. mehrm. tägl. rein od. in Mxt. 50 = 18 kr. 10 = 5 Pf. — Sp. aether. nitricl. Wie das Vorige. 10 = 52 Pf. — Spir. cornu cervi succinatus 10—30 Trpf. — Spir. pyroacet. v. Acetonum. — Spir. saponis kalinus besteht aus Sapo kal. und Spir. Lavandulae 2:1. — Spir. sulfuricoaeth. (Liq. Hofmanni.) Inn. 10—30 Tropf. mehrm. tägl. — Spirit. Mindereri (Liq. ammon. acet.) äuss. S. vini conc. 50 = 7 kr. dil. 50 = 6 kr.

**Spongia pressa.** 1 = 15 Pf.

\***Stannum muriat.** Inn. 0'1 auf 5'0 Spir. aeth. mur. 5 Tpf. 3—4mal tägl., steigend bis 0'2 p. die, gegen Epilepsie; 0'1—0'15 p. die in Pillen als Wurmmittel.

†**Stibium chloratum.** (Butyrum antim.) Blos äuss. als Aetzm. 1—10 Tpf. 10 = 18 kr. — St. Sulf. aurantiacum. (Sulfur. aurat. Antim.) In Pulv., seltener in Pill. oder noch seltener in Mxt. 0'05—0'1. 2—4mal tägl. 1 = 4 kr.; 10 = 15 Pf. — St. sulf. nigr. (Ant. crud. praepar.) 0'3—0'5 p. d. 50 = 6 kr., pulv. = 14 kr. 100 = 50 Pf.

†**Stramonium.** Folia. In Plv. Pill. 0'05—0'15. 1—2mal. If. 1'5—3'0 auf 100'0—200'0 10 = 1 kr. = 5 Pf. — Semina Inn. Pulv., Pill. 0'05—0'15, Extr. S. ebenso 0'05—0'15 1 = 15 Pf. Tet. 4—5 Tpf., 2—3mal. 10 = 15 Pf.

\***Strophantus**, Ersatz f. Digit. — Tinct. Str. 5—15 Tropfen.



†**Strychninum.** Inn. in Pulv. u. Pill. Sol. 0'003—0'01. 2—3mal tägl. äuss. in Salb. u. öligen Lös. 0'03 bis 0'30 auf 10'0. 0 1 = 5 Pf. — †**Str. nitr.** ebenso und zu subc. Inj. 0'01 = 1 kr.; 0'10 = 5 Pf.

**Styrax liquidus.** Aeusserlich zu Salben 100'0—300'0; ebenso **Styrax calamita.** 10 = 4 kr. = 10 Pf.

**Sulfur. praecipitatum.** (Lac. sulfuris.) Inn. 0'15—1'0 p. dos., mehrm. tägl. 10 = 13 kr. = 10 Pf. — **S. sublimatum.** (Flor. sulf.) Inn. 0'3—0'5, als Purgans 1'5—5'0 p. d. 50 = 16 kr.; 100 = 20 Pf. — \***S. jodatum,** 0'5—1'5'0 auf 30'0 Fett, gegen Acne etc. 1 = 10 Pf.

\***Sumbul. Radix.** 0'15—0'5 in Plv. 5'0—12'0 auf 200'0 Inf.; Tet. 10—40 Trpf.

**Tamarindus. Fructus.** 30'0—50'0 auf 200'0 Det. **Pulpa** 15'0—30'0 zu Mixt., Latw. 50 = 25 kr.; 10 = 10 Pf.

**Tannacetum.** (Anthelminthicum) Hba. 15'0—30'0 auf 200'0 If.

**Taraxacum.** Hba. Succus expr., 50'0—100'0 täglich, Radix 30'0—60'0 auf 300 Det. 50 = 5 kr.; 100 = 35 Pf. Extr. 10'0—15'0 tägl. in Sol., Latw. 10 = 7 kr. = 45 Pf.

**Tayuyae rad.** Purgans Febri-fugum, Antisyph. und Antiscrophul. — Tinct. T. 2—12 Trpf. 3—4mal tägl. mit Wasser verdünnt; auch zu subc. Inj.

**Terebinthina comm.** Ol. ter. rectific. Inn. 10—20 Trpf. p. dos., 10'0—15'0 mit Eierdotter abgerieben als Emuls.; zu Clyst. 15'0. 50 = 5 kr.; 10 = 5 Pf. — **T. Chiae** (Chios-Terpentin) 1:5 p. die gegen Krebs. —

\***Ol. terebinth. ozonisatum.** Inn. 5—10—20 Trpf. 3—4 stündl. in Zuckerwasser, Honig u. s. w. 50 = 7 kr.

\***Thallinum sulf.** Antipyret. 0'25—0'75 p. dos. in Sol. 1—1½'0 gegen Blenn.

\***Thuja occidentalis.** Tet. zum Betupf. v. Condylom.; 1—4 Trpf. auf 30'0 bei Trachom.

**Thymolum** bei Magencat., inn. 0'05—0'1:100, äuss. in spir. Sol. als Verbandmittel 1'0:1000 Aq. 1 = 15 Pf. — **Thymols. Natron** bei infect. Krkh. zu 0'5 bei Kindern und 3'0 bei Erwachsenen.

**Tilia europaea.** Flor. 10'0—15'0 auf 200'0 Inf. 50 = 9 kr.

**Tinctura amara.** 10 = 4 kr. = 15 Pf.

**Tormetillae radix.** (Adstr.) In Dt. 10'0—15'0 auf 200; Plv., Ltzw. 0'3—1'5, 3—4mal. Extr. 0'04—0'08 tägl. 1 = 5 Pf.

**Trifolium fibrinum.** (Amarum.) If. aq. v. vin. 2'0—15'0 auf 200'0. 50 = 6 kr.; 100 = 4 Pf., pulv. 10 = 4 kr. Extr. aq. 5'0 p. d. 5 = 6 kr.; 1 = 5 Pf. Succ. expressus 4'0—10'0.

**Trimethylaminum** v. Propylam.

**Tupelo-Stifte** wie Laminaria.

**Unguent. aromat.** 10 = 5 kr. **cerussae.** 10 = 4 kr., **diachyl.** 10 = 8 kr., **Hydrarg.** 10 = 8 kr. — **U. cantharidum** als Epispast., irritirend; ebenso **U. Mezerol.** **U. Elemi** als reizende Salbe.

\***Urethan,** Hypnot. 0'10 p. dos. **Uva ursi. Folia.** 15'0—20'0 auf 200'0 Det. 50 = 5 kr.; 100 = 35 Pf.

**Valerianae rad.** If. 10'0—15'0 auf 200'0 W. tägl., Pv., Pill. Ltzw., 0'3—1'5 2—3mal tägl. 50 = 7 kr.; 100 = 70 Pf., pulv. 10 = 4 kr. = 15 Pf. **Acidum v.** zu 3—6—10 Trpf. inn., mehrm. tägl. in

Sol. 1 = 15 Pf. — Aqua V. dest. 15°0–30°0 p. d. 100 = 15 Pf. *Oleum aethereum*. 1–3 Tpf. auf Zuck.; 1 = 13 kr. = 20 Pf. *Extr. aquos.* 0°3–0°6 p. d. 1 = 30 Pf. *Tet.* 10–20 Tpf. p. d. 10 = 4 kr. = 15 Pf. *Vanilliae siliquae*. Inn. Plv., Pill. 0°2–0°5; If. 5°0–10°0 ad 100°0; 1 = 10 kr. *Tet.* 10 bis 20 Tpf. p. d. 1 = 15 Pf.

*Vaselinum*. Rückstand v. der Petroleumbereitung. Vorzügliche Salbengrundlage bes. f. Arg. nitr. 10 = 10 Pf.

† *Veratrum album*. Rad. 0°5–1°5 auf 100°0–200°0. If. Aeuss. als Niespulv. Ugt. 5°0 auf 100°0–200°0 Fett. 10 = 1 kr., pulv. 10 = 4 kr. — † *Tet. v. a.* 6 = 3 kr.; 10 = 20 Pf. — \* *Veratrum viride*. Wirkt wie *Digitalis*. † *Veratrinum*. 0°05–0°2 in Alkohol gel., mehrm. tägl. Aeuss. 0°15. — 0°3:5°0 Fett. 0°05 = 2 kr. 0°1 = 5 Pf.

*Verbascum Flores.* (Diaphor.) 10°0–15°0 auf 400°0 Inf. 50 = 32 kr.; 10 = 20 Pf.

\* *Xylolum* 15–30 Tropf. 1–3 stündl. gg. Variola.

\* *Zodoaria Radix*. Pulv. 0°5–1°5 p. d. 50 = 7 kr.; 10 = 5 Pf., pulv. 10 = 4 kr. = 10 Pf.

\* *Zibethum*. 0°3–0°5 p. d. Plv. † *Zincum aceticum*. 0°5–1°5 al Brechm. Aeusserl. 0°15 ad 30°0 zu Inj. 10 = 24 kr. = 10 Pf. *Z. bromatum*. inn. 0°1–0°2 steigend in Pillen oder Salbe bei hyst. Krämpfern — *Z. chloratum*. Aeuss. al Aetzm. in Substanz oder als Pasta, zu Einspritzungen 0°05–0°3 auf 30°0 Wasser. Ugt. 2°0–5°0 ad 30°0 Ugt. rosat. 10 = 20 kr. = 15 Pf. — *Z. oxydatum*. (Flor. Zinci.) Innerl., Pulv. 0°0–0°03, 2–4mal. Aeuss. Ugt. 10°0 auf 30°0 Fett. 10 = 4 kr. = 20 Pf. — \* *Z. phosphoratum* inn. statt Phosphor 0°001–0°003 mehrm. tg. † *Z. sulfuricum*. Inn. Pulv. Pill., Sol. dos. refr. 0°01–0°02, 2–3mal; dosi plen 0°1–0°5 alle 5–10 Minut bis zur Wirkung. Augenw. 0°05–0°2 ad 100°0; Einspritzung; Waschung. 0°15–0°4 ad 30°0. 10 = 5 kr. = 5 Pf. \* *Z. sulfo-carbolicum* ebenso. 1 = 5 Pf. — *Z. valerianicum* 10 = 60 Pf.

*Zingiberis radix*. Inn. Pulv. 0°3–0°5. 1–3mal. Inf. ad v. vin. 5°0–10°0 auf 200°0 50 = 16 kr.; 10 = 10 Pf. pulv. 10 = 6 kr. = 16 Pf.

## 10. Verzeichniss der wichtigeren Bäder und Curorte.

Aachen in Preussen. Kochsalzhaltige Schwefelthermen Kaiser- und Quirinusquelle, Rosen- u. Corneliussquelle. Badeärzte sind alle in der Stadt practicirenden Aerzte. *Abbach in Baiern*. Schwefelquelle. Aerzte: Die in der Stadt practicirenden.

*Abbazia in Istrien*. Seebad u. Wasserheilanst. Arzt: Schwan. *Adelheidsquelle*, s. Heilbrunn. *Adelholzen in Oberbaiern*. Klim. Höhen-Curort. Mineral- und Soolbad. Arzt: Liegl.

- Aibling** in Ob.-Baiern. Sool- und Moorbäder. Aerzte: Gitschgen, Gschwändler, Sömmmer.
- Albisbrunn** im Canton Zürich (Schweiz). Molkencur. und Wasserheilanstalt. Aerzte: Paravicini, Wagner.
- Alexanderbad** in Baiern. Erdig-salinischer Eisen-Säuerling. Kiefernadelbäder und Wasserheilanstalt. Aerzte: Cordes (Wasserheilanstalt) und Günther (Mineralbad).
- Alexisbad** in Anhalt-Bernburg. Stahlquelle. Aerzte: Heusinger, Kothe, Polland.
- Alm am Eck**, s. Kainzenbad.
- Altefähr** in Pommern. Ostseebad. Aerzte aus Stralsund und Putbus.
- Altenburg (Deutsch-Altenburg)** in Nieder-Oesterreich. Jodhaltige, erdig-salin. Mineralquelle.
- Altensalza**, s. Elmen.
- Alt-Halde**, Grafsch. Glatz i. Schlesien. Alkal. Eisensäuerling. Mineral-, Moor-, Douchebäder; Brunnen-, Milch-, Molkencur. Wasserheilanstalt. Arzt: Hoffmann.
- Alt-Oetting (St. Georgenbad)** in Ober-Baiern. Erdig-salin. Schwefel-, Alaun- u. Salpeterquelle. Aerzte: Forster, Zahler.
- Alt-Prags** im Pusterthal. Salinisches Schwefelwasser.
- Alvaneu** im Canton Graubünden (Schweiz). Schwefelbad.
- Amalienbad**, s. Langenbrücken.
- St. Andreasberg** im Harz. Klimatischer Curort für Lungenkranke. Pneumatischer Apparat. Arzt: Jacobasch.
- Anholz** im Pusterthal in Tirol. Sal. Eisenvitriolsäuerling und alkal.-sal. Schwefelquelle. Arzt: Meyer.
- Autarast** in Baden. Erdig-salin. Eisensäuerling. Arzt: Schneyder.
- Apnrade** in Schleswig-Holstein. Ostseebad mit Einrichtungen für kalte und warme Salzbäder. Aerzte: Cohn, Duus, Gross, Mordhorst, Ritter, Schleikjær.
- Arapatak**, s. Elöpatak.
- Arco** in Süd-Tirol. Klimatischer Wintercurort, Trauben-, Milch- und Molkencur. Aerzte: Bresciani, Carmelini Gager, v. Kottowitz, Kuntze, Mezzena, Schider, Vambianchi.
- Arendsee** i. d. Prov. Sachsen. Wasserheilanstalt. Irisch-röm. Bäder etc. Aerzte: Bock, Trull, Veit.
- Arnstadt** in Thüringen. Sool- und Kiefernadelbad. Aerzte: Niebergall, Oswald.
- Artern** in der Prov. Sachsen. Sool- und Dampfbad. Aerzte: Brehm, Peuckert.
- Assmannshausen** am Rhein. Alkal. Säuerling und Lithion-Therme. Arzt: Sturm.
- Audab** in Ober-Baiern. Curort m. erdig-salin. Schwefelquelle.
- Augustusbad** in Oldenburg, s. Scharbeutz.
- Augustusbad** bei Dresden (Radeberg). Kräftige Eisenquellen. Arzt: Bräunig.

**Aussee** in Steiermark. Klimat. Höhen-Curort. Soolbad. Terrain-, Milch- und Molkencur. Aerzte: Farvargen, Schreiber, Sittmoser, Veth. — **Dr. Schreiber's Wasserheilanstalt „Alpenheim“** (Inhalation, Heilgymnastik, Massage, Soolbäder).

**Baden bei Wien.** Salin. mur. Gypsquellen mit Schwefelwasserstoffgehalt. Aerzte: Barth, Czuberka, Deutsch, Halporn, Hassack, Heinz, Hoffmann, Jellinek, Klein (Augenarzt), Kosak, v. Mülleitner, Peiker, Podzabradsky, Raab, Schwarz Carl, Schwarz Josef, Taub, Taussig, Weiss, Wettendorfer.

**Baden-Baden** im Grossherzogthum Baden. Alkalische Kochsalzthermen von 41–46° C. und Chlor-Lithiumquelle. Inhalation zerstäubten Mineralwassers. Pneum. Anstalt. Molkencur. Neue Badeanstalt „Friedrichsbad“. Aerzte: Apfel, Baumgärtner, Berton, v. Corval, Fischer, Frey, Heiligenthal, v. Hoffmann, Jörger, Knecht, Neidert, Oeffinger, Oster, Schindler, Schliep, Schmidt, Seelos, Schneider, Vocke.

**Badenweiler** in Baden. Klimatischer Curort und Thermalbad. Aerzte: Kollmann, Mandowski, Siegel, Thomas.

**Balaton-Füred**, s. Füred.

**Baldócz** (Post- und Telegr.-Station Szepes-Varallja) in Ungarn. Kalkhalt. alkal.-muriat. Eisensäuerling. Bade- und Trinkcur. Arzt: Schön.

**Bartfeld** in Ob.-Ungarn. Curort mit kräftigen Eisenquellen. Arzt: Kronpacher.

**Bentheim** in Hannover. Kalte Schwefelquellen u. Schwefelschlamm. Arzt: Soltenkamp, in der Stroth.

**Berchtesgaden** in Ober-Baiern. Soolbad und klim. Curort. Aerzte: Hacker, Sartorius.

**Berg**, s. Cannstadt.

**Berggiesshübel** (Johann Georgenbad) bei Dresden. Badeanstalt mit 5 schwachen Eisenquellen.

**Bergquell** Frauendorf bei Stettin in Pommern. Heilanstalt für Nerven- und Gemüthskranke. Arzt: Zenker.

**Beringerbad** bei Quedlinburg in Preussen. Bromhaltige Soolquelle. Aerzte: Schrader, Strauss.

**Berka** (Ilm) in Thüringen. Luft-Curort. Arzt: Willrich.

**Bertrich** in der Rheinprovinz. Ländlicher Curort mit Thermalquellen. Arzt: Cüppers.

**Bearig** in Preussen (Kreis Saarburg). Erdig-sal. Mineralquelle. Arzt: Lübke.

**Bikszad** in Ungarn (Com. Szatmar), Muriat.-alkal. Säuerling. Trink-, Bade- und Molkencur. Arzt: v. Vajay.

**Bilin** in Böhmen. Hervorragendster Natron-Säuerling. Cur- und Wasserheilanstalt, Dampfbäder, Inhalation.

Arzt: von Reuss.

**Birresborn** in Rheinpreussen. An doppeltkohlensaurem, Natron reicher alkalischer Säuerling.

**Blistriz a. Hostein** i. Mähren. Molkencuranstalt. Arzt: Toff.



- Blankenberghe** in Belgien. Nordseebad. Aerzte: Cosyn, Notebaert, Verhaeghe.
- Blankenburg** am Harz. 800—1000' ü. d. M. 7° 64' R. mittl. Jahrestemp., klim. Curort für Nervenkrankte, Kiefer-nadelbad. Aerzte: Eyslein, Müller und Rehm.
- Blankenburg** in Thüringen (Schwarzathal). Heilanstalt für Nervenleiden. Arzt: Bindseil.
- Blankenburg** in Schwarzburg-Rudolstadt. Klim. Curort. Aerzte: Hartlaub, Hopfe, Schwabe.
- Blankenhain** in Thüringen. Klim. Curort. Arzt: Kessler.
- St. Blasien** im badischen Schwarzwalde. Höhengurort. Aerzte: Hauffe, Kugler.
- Blenhorst** bei Nienburg an der Weser. Alkal. Schwefelquellen. Arzt: Rapmund.
- Bocklet** in Baiern. Eisen- und Schwefelquelle. Aerzte: Scherpf, Werner.
- Boll** in Württemberg. Zwei alkal.-sal. Schwefelquellen.
- Boppard** (Marienberg) i. d. Rheinprovinz mit zwei Wasserheilanstalten. Aerzte: Borges, Burkart, Heussner.
- Bordighera** an der Riviera in Italien. Klim. Curort. Aerzte: Christeller, Schmitz.
- Borkum** in Hannover. Nordseebad. Aerzte: Holm, Lüders.
- Borszék** in Siebenbürgen. Starker alkalisch-muriatischer Eisensäuerling. Arzt: Szilyassy.
- Bösling** bei Pressburg in Ungarn. Erdig-sal. Eisenquellen. Arzt: Friedler.
- Bozen** in Tirol. Klimatischer Wintercurort. Aerzte: Die in der Stadt practicirenden.
- Brückenau** in Baiern. Kohlensäurereiche Stahlquellen. 80° R. Arzt: Wehner.
- Buchenthal** im Canton St. Gallen. 510 M. ü. d. M. Wasserheilanstalt. Terraineuren. Hydro-elekt. Bäder. Arzt: Wollensack.
- Buchlowitz**, s. Leopoldsthal.
- Budapest**, s. Ofen.
- Bukowine** in Preuss.-Schlesien. Erdig-sal. Eisenquellen. Arzt: Bobrecker.
- Bünde** bei Osnabrück in Hannover. Eisenquelle. Aerzte: Höpker, Selige.
- Burgbernheim** in Baiern. Wildbad mit 5 erdig-sal. Säuerlingen. Arzt: Werr.
- Burtscheid** bei Aachen. Alkal. Kochsalz- und Schwefelthermen. Aerzte: Braus, Hommelsheim, Laaf, Lang, Lüth, Schroeder, Zuhelle.
- Busko** in Russ.-Polen. Kochsalz- und Schwefelbäder. Aerzte: Dymnicki, Majkowsky.
- Buziás** in Ungarn. Muriat. Eisensäuerling. Aerzte: v. Csajághy, Paumann, Wittner.
- Calw** in Württemberg, 346 M. ü. d. M., Luftcurort.
- Cammin** in Pommern. Sool- u. Moorbad. Massage. Aerzte: Gercke, Raabe, Wegner.



**Canstatt** mit Berg in Württemberg. Mineralischer Eisen-säuerling. Aerzte: Biezinger, Fischer, Fanser, Köstlin, Ott, Löwe, Pantlen, Rühle, Schöffler, Veiel.

**Carlsruhe** in Oberschlesien. Kiefernadelbad, Wasser- und klim. Curen. Aerzte: Graber, Kleiber.

**Charlottenbrunn** in Preuss.-Schlesien. Eisenquelle und Molkencur. Aerzte: Bujakowski, Neisser, Wiedemann.

**Cleve** in der Rheinprovinz. Klim. Curort mit eisenhalt. Mineralquelle. Aerzte: v. Ackeren, Arntz, Bollinger, Brinkmann, Gerome, Lauff, v. Rossum, Tenhosen, Trompetter.

**Colberg** in Pommern. Sool- u. Seebad. Aerzte: Behrend, Hänisch, Rohde, Starke, Schmolling, Weissenberg.

**Constanz** in Baden. See- und Soolbäder. Arzt: Honsell.

**Cranz** in Ostpreussen. Seebad. Aerzte: Kaulbars, Schubert, Wottrich.

**Cudowa** in Preuss.-Schlesien. Kohlensäurereiche Eisenquellen. Aerzte: Jakob, Scholz.

**Cuxhaven** (Grimmershörn) bei Hamburg. Nordseebad. Aerzte: Hälssen, Schmidt.

**Czgelka** bei Bartfeld in Ungarn. Ludwigsquelle: Jodhaltiger alkal.-muriat. Natron-Säuerling (Heilwasser); Stefansquelle: Höchster Soda- und Kohlensäuregehalt.

**Dachsberg** bei Prambachkirchen in Ob.-Oesterr. Stahlqu. Dangast in Oldenburg. Nordseebad. Arzt: Ohling.

**Darkau** in Oesterr.-Schlesien. Jodbromquelle.

**Daruvár** in Slavonien. Eisen-Therme. Porzellan-, Spiegel- u. Schlambäder. Trinkcur; Elektrizität. Aerzte: Brink, Hirschenstein.

**Davos** im Canton Graubündten (Schweiz). Klim. Curort, 5940' ü. d. M. Sommer- und Winteraufenthalt für Lungen- und Nervenkrankte. Aerzte: Beeli, Boner, Schimpff, Spengler, Unger.

**Deutsch-Altenburg**, s. Altenburg.

**Deutsch-Kreuz** in Ungarn. Alkalischer Säuerling.

**Diersdorf** in Preuss.-Schlesien. Eisenhaltige Schwefelquelle. Arzt: Böer.

**Diessen** (Baierdiessen) in Oberbaiern. Klim. Luftcurort. Aerzte: Höber, Wieneringer.

**Dietsenmühle** in Hessen-Nassau. Wasserheila. Arzt: Genth.

**Dievenow**, Seebad in Pommern. Auch Warmbad (Sool-Schwefel) und Molkencur. Aerzte: Raabe, Wegener.

**Dillenburg** in Hessen-Nassau. Luftcurort. Arzt: Speck.

**Dizzenbach** in Württemberg. Alkal.-muriat. Säuerling. Aerzte: Braunn, Bundschuh, Erlenmeyer.

**Dobbelbad**, s. Tobelbad.

**Doberau** (Heiligendamm) in Mecklenburg. Ostseebad. Aerzte: Becker, Kortüm, Lange.

**Dolau**, s. Neu-Rakoczy.

**Dombhat**, s. Radna.

**Dornburg**, Nordseebad. Arzt: Jansen.

**Donaueschingen** in Baden. Soolbäder.

**Dornawatra** (Bukowina). Stahlquelle, Moorbäder. Aerzte: Binder, Wohl.

**Driburg** in Westphalen. Erdig-salinische Stahlquelle mit starkem Gehalt an Kohlensäure ( $8\frac{3}{4}^{\circ}$  R.). Aerzte: Hüller, Riefenstahl.

**Dürkheim** in Baiern. Brom- und jodhaltige Soolquellen und Traubencurort. Aerzte: Herrmann, Hilgard, Kaufmann, Löchner, Lolt, Raabe.

**Dürrenberg** in der Prov. Sachsen. Soolbad. Arzt: Grosche.  
**Dürheim** im bad. Schwarzwald. 700 M. ü. d. M. Soolbad und Luftcurort. Arzt: Kürz.

**Düsternbrook** bei Kiel in Schleswig-Holstein. Ostseebad.  
**Eberswalde**, s. Neustadt-Eberswalde.

**Ebingen** in Württemberg. Kalkhaltige Quelle. Arzt: Palm.  
**Edenkoben** in Baiern. Traubencurort, Wasserheilanstalt und Schwefelquelle. Aerzte: Felsenthal, Grimm, Jaeger, Straub, Zahn.

**Eger**, s. Franzensbad.

**Egerdach** in Tirol. Alkal.-erdige Mineralquelle. Molkencur.  
**Eggenberg** bei Graz. Wasserheilanstalt. Arzt: Schleicher.

**Eichwald** bei Tepitz in Böhmen. Wasserheilanstalt „Theresienbad“. Arzt: Molin.

**Eilsen** in Schaumburg-Lippe. Erdig-salinische Schwefelquelle. Aerzte: v. Bodemeyer, Beusen, Weiss.

**Elgersburg** in Thüringen. Wasserheilanstalt. Klimat. Curort. Arzt: Barwinski.

**Elisabethbad** a. d. Ostsee, s. Niendorf.

**Elisabethbad** in Brandenburg, s. Prenzlau.

**Elmen** (Altensalza) in der Provinz Sachsen. Soolbad mit eisen- und bromreicher natürlicher Soole, auch klimat. Curort. Aerzte: Kirchheim, Trüstedt.

**Elöpatak** oder **Alapatak** in Siebenbürgen. Gasreicher alkal.-erd. Eisensäuerling. Arzt: Schwarz.

**Elster** im Kgr. Sachsen. Curort mit alkal.-salin. Stahlquellen. Aerzte: Cramer, Flehsig, Hahn, Pässler, Peters.

**Empfang** in Ober-Baiern. Luftcurort, Sool-, Moor- und Mineralbadeanstalt. Arzt: Leonpacher.

**Ems** in Nassau. Kochsalzh. Natronthermen ( $22-38^{\circ}$  R.), 85 M. ü. d. M. König Wilhelms-Felsenquellen mit vorzüglichen Cureinrichtungen, Wilhelmsquelle  $40.5^{\circ}$  C., Augustaquelle  $39.2^{\circ}$  C., Victoriaquelle  $27.9^{\circ}$  C. Aerzte: Döring, Flothmann, Geisse, Goldbaum, Goltz, Helmkampf, Ibell, Kastan, Orth, Panthel, Prussian, Vogler, Wenkenbach, Wuth.

**Eperles** in Ungarn. Eisenfreier alkal. Lithion-Säuerling „Salvator“.

**Erlau** in Ungarn. Indiff. Therme.

**Ernsdorf-Jaworze** in Oesterr.-Schlesien. Molkencur- und Wasserheilanstalt. Klim. Curort. Arzt: Smolenski.

**Fachingen** in Nassau. Natronsäuerling.

- Falkenstein** in Hessen-Nassau. Heilanstalt für kranke. Aerzte: Dettweiler, Meissen.
- Faulensee-Bad** im Berner Oberland (Schweiz). Gy Mineralquelle. Klim. Curort. Arzt: Jonquière
- Fellach** in Kärnten (auch Vellach). Badeanst. Natronsäuerlingen. Arzt: Gussenbauer.
- Flinsberg** in Preuss.-Schles. Klimatischer Curort Moor-, Fichtennadel- und Lohebäder; Hydro Fichtennadel-Dampf-Inhalation. Aerzte: Adam
- Forstbad** bei Arnau im böhm. Riesengebirge. L. 423 M. ü. d. M. m. einer Badeanst. Arzt: Lor
- Frankenhausen** in Thüringen. Soolbad. Fluss- und bad. Aerzte: Graef, Maniske, Pflug.
- Franzensbad (Eger)** in Böhmen. Glaubersalzhaltigen Quellen mit viel freier Kohlensäure, Gasquelle beste Eisenmineralmoor in Europa. Trink- u. Zur Trinkcur werden zumeist: Salzquelle, Wies Franzensquelle und der kalte Sprudel, — zur die Louisenquelle und der unvergleichliche 3 wendet. Aerzte: Buberl, Cartellieri jun., D Diessl, Egger, Fellner, Hamburger, Hofma Klein, Loimann, Margulies, Müller, Prze Steinbach, Steinschneider, Straschnow.
- Frauensee** bei Eisenach in Thüringen. Klim Sommercurort. Badehaus im See. Arzt: Steg
- Frelenwalde** in Brandenburg. Salinische Eisenqu Moorbad. Aerzte: Elten, Gisevius, Holzhausen wisch, Senstius.
- Freiersbach** in Baden. Eisen-, Salz- und Schw Aerzte: Mast, Schneider.
- Friedrichshafen** am Bodensee in Württemberg. anstalt. 405 M. ü. M. Klimat. Curort, 1260' i Meere. Aerzte: Faber-, Jehle, Leibold.
- Friedrichsrode** bei Gotha. Luftcurort, Fichten Aerzte: Keil, Weidner.
- Friedrichsseebad**, s. Rügenwalde.
- Friedrich Wilhelmsbad**, s. Putbus.
- Frohneiten** in Steiermark. Wasserheilanst. Arzt:
- Füred** am Plattensee (Balaton-Füred) in Ungar säuerling; Bade-, Trink- und Traubencur. Wa kalte Säuerling-(Stahl)-Bäder. Aerzte: Mangold, Engel, Wundarzt Gemal.
- Fürstenthale** bei Halle a. d. Saale. Soolbad. Francke, Hochheim.
- Gaisfahn** bei Vöslau in Nied.-Oest. Wasserhe Aerzte: Friedmann, Veninger.
- Gardone-Riviera** am Garda-See, Nord-Italien. Klim Wintercurort. Aerzte: Königer, Rohden.
- Gastein (Wildbad-Gastein)** in Salzburg. Ind 7 Quellen von 30—99° R. Aerzte: Bunzel, v. H Pröll, Schider, Spinner. Aerzte in Hofga

- das Wasser von Wildbach-Gastein geleitet wurde:  
 Stöckl, Wick.
- Gauting** in Ob.-Baiern. Erdig-alk. Schwefelqn. Arzt: Strüpf.
- Gellnau** in Hessen-Nassau. Alkal. Natronsäuerling.
- Geltschberg** in Böhmen. Wasserheilanstalt u. klimatischer  
 Curort. Arzt: Gans.
- Genovevabrunnen** in Rheinpreussen. Alkal. Säuerling.
- St. Georgenbad**, s. Alt-Oetting.
- Gernsbach** in Baden. Luftcurort, Kiefernadelbad. Aerzte:  
 Kraushaar, Krische, v. Pochhammer, Schöpflin.
- Gersau** am Vierwaldstätter-See in der Schweiz. Klim.  
 Curort. 440 M. ü. d. M. Arzt: Pestalozzi.
- Gertrudisbrunnen** in Biskirchen a. d. Lahn (Nassau).  
 Alkal.-salin. Säuerling.
- Giesshübl-Puchstein** bei Karlsbad in Böhmen. Alkal. Säuer-  
 ling. Cur- u. Wasserheilanst., elektr. Curen. Massage, Luft-  
 bäder, Reconvalescentenstation. Pension. Arzt: Gastl.
- St. Gilgenberg** bei Bayreuth in Baiern. Heilanstalt für  
 Nerven- und Gemüthsranke Arzt: Falco.
- Gleichenberg** in Steiermark. Alkal.-muriat. Säuerling (Con-  
 stantins- und Emma-Quelle). Eisensäuerling (Klausner-  
 stahlbrunnen). Alkal.-muriat. Eisensäuerling (Johannis-  
 brunnen). Gleichmässiges, subalpines Klima, Schutz  
 gegen rauhe Winde. Aerzte: Brühl, Bulikowski, Clar,  
 Fischer, Höffinger, Hönigsberg, Kaufer, Kentzler,  
 Kuntze, Lazar, Rauch, Szigeti, Zavori, Ziffer.
- Gleissen** in der Lausitz (Preussen). Badeanstalt für  
 Kohlenmineral-Schlamm-bäder.
- Gleisweiler** in Baiern. Wasserheilanstalt, Kumys-, Trau-  
 ben- und Molkencurort, 990' ü. d. Meere Arzt: Schneider.
- Glücksburg** in Schlesw.-Holst. Ostseebad. Arzt: Schmidt.
- Gmunden** am Traunsee in Oberösterreich. Sool-, Fichten-  
 nadel-, Alpenkräuter-, elektr. und Seebäder, Kefir, pneu-  
 matische Kammer. Aerzte: Gallasch, Krakowizer,  
 Rischner, Wagner, Wolfsgruber.
- Goczalkowitz** in Preuss.-Schlesien. Jod- u. bromhaltige Sool-  
 quelle 13° R. Souldampfbäder. Aerzte: Babel, Kratzert.
- Godesberg** b. Bonn. Eisenh. Natronquelle u. Wasserh.-Anst.  
 Aerzte: Brockhaus, Finkelnburg, Gerber, Pohl, Schwann.
- Görbersdorf** in Preuss.-Schlesien. 561 Meter über dem  
 Meere. Erste in der schwindsuchtfreien Zone errichtete  
 Heilanstalt. Arzt: Brehmer mit fünf Assistenzärzten.
- Görhlitz** in Preuss.-Schlesien. Heil- und Pflegeanstalt für  
 Gemüthsranke, Pensionat für Nervenranke und ärztl.  
 Pädagogium für jugendliche Nerven- und Gemüths-  
 ranke. Arzt: Kahlbaum.
- Gräfenberg** in Oesterr.-Schlesien. Erste in Deutschland  
 von Vincenz Priessnitz im Jahre 1830 gegründete  
 Wasserheilanstalt. Arzt: Hosanu.
- Greifenberg** am Ammersee in Ober-Baiern. Alkal.-erdige  
 Stahlquelle. Arzt: Niedermair.



**Greifswald** in Pommern. Sool- und Moorbad.

**Gries** bei Bozen in Tirol. Klim. Curort. Aerzte: Höffinger, Kölle, Marchesani, Mayrhofer.

**Griesbach** in Baden. Glaubersalzquellen mit Eisengehalt und vieler Kohlensäure. Arzt: Jägerschmid.

**Grimmershörn**, s. Cuxhafen.

**Gross-Müritz** in Mecklenburg. Ostseebad und Luftcurort. Aerzte: Bauer, Mittenheimer, Wagner.

**Gross-Ullersdorf**, s. Ullersdorf.

**Grullbad** im Reg.-Bezirk Münster (Preussen). Eisenhaltige Chlornatriumquelle.

**Grünberg** in Pr.-Schles. Traubencurort. Arzt: Schirmer.

**Grund** in Hannover. Klim. Curort, Fichtennadelbad und Molkenanstalt. Aerzte: Brockmann, Freymuth.

**Haffkrug** in Schleswig-Holstein. Ostseebad. Aerzte: Busse, Brückmann, Gildemeister, Schor.

**Hall** in Ober-Oesterreich. Jod- und bromh. Soolquelle. Aerzte: Katser, Körbl, Magerl, Pachner, Pollak, Rabl, Schubert.

**Hall** in Tirol. Klim. Curort mit Soolbad. Aerzte: Ganner.

**Hall** in Württemberg. Sool-, Dampf- und Heissluftbad. Aerzte: Dicenta, Dürr sen. und jun., Honold, Löhrl, Pfeilsticker.

**Hallein** in Oesterreich. Mutterlaugen- und Soolbäder. Aerzte: Furke, Storko.

**Harkány** in Ungarn. Schwefeltherme. 50° R. Arzt: Heller.

**Harsfalva** im Com. Bereg in Ungarn. Alkal. Säuerling. Arzt: Schlesinger.

**Hassfurt** am Main in Baiern. Schwefelwasserstoffhaltiges Eisenwasser. Arzt: Beck.

**Hechingen** in Preussen. Alkalisch-salinische Schwefelquelle. Aerzte: Bosch, Geissler, Gföner, Koller.

**Heilbrunn** (Adelheidsquelle) in Ober-Baiern. Jod- und bromhaltige Kochsalzquelle. Arzt: Steger.

**Heiligendamm**, s. Doberan.

**Helgoland**. Nordseebad und klim. Curort. Aerzte: Ruprich, Schwarz.

**Herculesbad** bei Mehadia in Süd-Ungarn. Reiche Schwefelquellen (27 bis 46° R.). Kochsalztherme (38° R.). Trinken. Badecur, Massage, Elektrotherapie. Aerzte: v. Litsek, Maurer, Némethi, Popoviciu, Vuia.

**Heringsdorf** auf der Insel Usedom. Ostseebad. Aerzte: Kortüm, Vogt, v. Wallenstedt.

**Herrenalb** in Württemberg. Luftcurort. Wasserheilanstalt. Aerzte: Müllberger, Tüllmann.

**Herzogs Ludolfsbad** bei Gaudersheim in Braunschweig. Soolbad. Aerzte: de Bra, Durlach.

**Heustrich** im Berner Oberlande (Schweiz). Alkalisch-salinische Schwefeltherme. Arzt: Neukomm.

**Hévíz** in Ungarn. Indifferente Therme. Arzt: Haay.

**Hofgastein**, s. Gastein.

- Hofgeismar** in Hessen. Stahl- und Fichtennadelbad. (Quellen 8½° R.) Aerzte: Lenz, Lohmann, Plitt.
- Höhenstadt** bei Passau in Baiern. Schwefel- u. Schwefelmoorbad. Arzt: Pointmayer.
- Hohenstein** im Kgr. Sachsen. Alkal.-erd. Eisenquelle mit Fichtennadelbädern.
- Homburg v. d. Höhe** in Nassau. Eisenhaltig-salinische Säuerlinge, Trink- und Badecur während des ganzen Jahres. Inhalation von zerstäubtem Mineralwasser, Sool-, Kiefernadel-, Gas- u. Moorbäder. Aerzte: Becker Alb., Becker Aug., Becker Ludw., Deetz, Haase, Heyd, Hitzel, Hoeber, Hünereuth, Lewis, Lommel, Schetelig, Weber, Will, Zurbuch.
- Houschka** bei Prag in Böhmen. Alkalisch-salinische Eisenquelle. Arzt: Fetter.
- Hubertusbad** bei Thale im Harz. Soolbad und Wasserheilanstalt. Aerzte: Bode, Preiss.
- Hunyadi-Janos-Bitterquelle** in Ofen.
- Ilmenau** in Thüringen. Wasserheilanstalt, Kiefernadelbad. Künstliche Mineralbäder, klimatischer Curort. Aerzte: Preller, Hassenstein.
- Immenau** in Hohenzollern. Stahlbad, Wasserheilanstalt. Aerzte: Mock, Wern.
- Innsbrunnen** in Tirol. Wildbad mit kalter Schwefel- und Eisenquelle. Arzt: Scheiber.
- Inowrazlaw** im Reg.-Bez. Bromberg. Soolbad. Aerzte: Förner, Mannheim, Rakowski, v. Reutt, Winkler.
- Interlaken** (Schweiz). Klimat. Curort. Aerzte: Delachaux, Schären, Strasser, Volz, Zürcher.
- Inzersdorf** bei Wien. Privatheilanstalt für Nerven- und Gemüthsranke der DDr. Bresslauer und Fries.
- Ischl** im Salzkammergut. Salzsoole, Schwefel- und Kochsalzquelle. Klimat. Curort. Fichtennadel- und Dampfbäder, Wasserheilanstalt. Aerzte: Fürstenberg, Heine mann, Hertzka, Kaan, v. Kottowitz, Mayer, Pfost, Pollak, Reibmayer, Schütz, Stieger.
- Iwonicz** in Galizien. Jodhalt. Kochsalzquelle. Arzt: Swirski.
- Jaxtfeld** in Württemberg. Salzsoole. Arzt: Pfeilsticker.
- Johann-Georgenbad**, s. Berggiesshübel.
- Johannisbad** im Riesengebirge in Böhmen. Akratotherme, 29° C. warm, Bassin- und Wannenbäder, ¼ Stunde entfernt eine schwache Eisenquelle. Auch Luftcurort, 650 M. ü. d. M., Molkencur. Aerzte: Kopf, Pauer, Schreier.
- Johannisberg** bei Geisenheim im Rheingau. Curanstalt für Nervenleidende. Arzt: Hecker.
- Johannisbrunn** (Meltscherbad) in Oest.-Schlesien. Eisensäuerling mit Moor- und Fichtennadelbäder. Arzt: Schwarz.
- Jordansbad** in Württemberg. Erdig-alkalische Eisenquelle. (8° R.) Bade- und Trinkcur. Arzt: Renz.

**Juliusbad** bei Harzburg in Braunschweig. Soolbad und Luftcurort. Aerzte: Dankworth, Dreyer, Franke, Münzel, Reinhardt.

**Kabala-Polyana** (Com. Marmaros in Ungarn). Bad mit 3 kohlensauren Eisenquellen. Arzt: Gelel.

**Kahlberg** in Westpreussen. Ostseebad. Arzt: Fleischer.

**Kainzenbad** (Kanitzerbad) in Oberbayern, 2480' ü. d. M. Klimat. Curort und Mineralbad. Natron-, Schwefel- u. Stahlquelle. Arzt: Sauer.

**Kallberg** bei Passau in Baiern. Stahlbad. Arzt: Waltl.  
**Kaltenleutgeben**, Nieder-Oesterr. Wasserheilanst., gymn., elektr. und Diät-Curen. Aerzte: Emmel, Winternitz.

**Karlsbad** in Böhmen. Alkal.-salin. Mineralquellen von 22°5 bis 73°30 C. Trink- und Badecur. Mineralwasser-, Moor-, Dampf- und Eisenbäder. Aerzte: Abeles, Bayer, Becher, Cartellieri, Czapek, Fleckles, Freund, Friedenthal, v. Gallus, Gans, E. u. J., Glaser, Grünberger, Hassewitz, Herrmann, Hertzka, Hirsch, Hirschfeld, Hochberger, Hofmeister, Jaworski, Kafka, Kállay, Kleen, Kraus, G. u. J., Kretowicz, Lang, London, Löwenstein, Löwy B., Löwi, Marterer, Maschka, Mayer, D. u. J., Mlady, Neubauer, Pichler, Pleschner, Pollatschek, Pollitzer, Preiss, C. u. L., Putzler, Ritter, Rosenberg, Rosenzweig, Roth, Ruff, Schnee, Schuhmann-Leclercq, Seligmann, Stark, Stephanides, Sticha, Strunz, Sztankovány, Wollner.

**Karlsbad** (Mergentheim) in Württemberg. Curanstalt mit einer Bittersalzquelle. Aerzte: Ellinger, Lindemann, Pffüger, Stütze.

**Karlsbrunn** in Oesterr.-Schlesien. Kalte alkalisch-erdige Eisensäuerlinge, Trink- und Badecur, auch Molken- und Wassercur. Arzt: Siegel.

**Karlsruhe** bei Oppeln in Ober-Schlesien. Kiefernadelbad, Wasserheilanstalt und klim. Curort. Arzt: Graber.

**St. Katharinenbad** bei Iglau in Mähren. Mineralquelle. Arzt: Beran.

**Katwyk aan Zee** (Holland). Nordseebad. Arzt: Hoog.

**Kissingen** in Baiern. Chlornatrium- u. Thermalsoolquellen, erstere zur Trink-, letztere zur Badecur verwendet. (Die Trinkquellen: Rákoczy, Pandur, Maxbrunnen 10° C.; die Badequellen: Soolsprudel 18° C., Schönbornsprudel 20° C.) Aerzte: Beyerlein, Chlapowski, Dietz, Diruf E., Diruf G., Diruf O., Gätschenberger, Gottburg, Gramko, Heckenlauer, Ising, Landien, Lender, Ripps, Scherpf, v. Sohlern, Sotier, Stöhr, Sturm, Travis, Welsch, Zober.

**Kochel** in Oberbayern. Natronquelle. Arzt: Burkart.

**Kohlgrub** in Baiern. Eisenquelle. Arzt: Gabler.

**König Ludwigsbad** bei Salzburg. Soolen-, Moor- u. Fichten- nadelbäder.

**Königsborn** bei Unna in Westphalen. Sool- und Thermalbad. Aerzte: Bitter, Friederichs, Kipp, Schulze-Höing.

sbraun bei Königstein in Sachsen. Wasserheilanstalt.  
- und Milcheuren. Arzt: Putzer.

sdorff-Jaztrzeb in Preuss.-Schlesien. Jod- und brom-  
ige Soole. Aerzte: Karfunkel, Seltmann, Witczak.  
swart in Böhmen, subalpiner klim. Curort, 723 M.  
f., Victorquelle, Marienquelle und Neuquelle sind  
alquellen; Richardsquelle ist reinster eisenfreier  
erling. Fichtennadel-, Stahl- und Eisenmineralmoor-  
er, Nadelholzwaldungen. Arzt: Kohn.

nica in Ober-Ungarn. Erdig-salinische u. eisenhaltige  
erlinge, 2679' ü. d. M. Arzt: Ormay.

in der Provinz Sachsen. Soolbad. Aerzte: Bockel-  
m, Groddeck, Knorr, Noeldechen, Rosenberger, Uhle,  
m, Weise.

itz im Fürstenthum Reuss. Warme Sand-, Sool- und  
fernadelbäder. Arzt: Sturm.

enhehl-Tölz in Oberbaiern. Jod- und schwefelhaltige  
pelt-kohlensaure Natronquelle. 2000' ü. d. M. Aerzte:  
lmann, Höfler, Jungmaier, Streber.

aa-Topfitz in Croatien. Akratotherme. 30—35° R.  
zte: v. Aigner, Folnegovic.

h in Oberbaiern. Alpencurort mit einer Schwefel-  
lle. Alle Arten Bäder. Molkencur. Arzt: May.

en in Ober-Oesterreich. Wasserheilanstalt. Elektr.  
Diätturen Arzt: Fleischanderl.

nach in der Rheinprovinz. Jod- und bromhaltige  
lbäder. Aerzte: Bardach, Bresgen, Dupuis, Engelm,  
m, v. Frantzius, Freudenbeig, Germer, Hermann,  
sel, Heusner, Jung H., Jung S. R., Karst, Lier, Mark-  
d., Prieger, Röhrig, Stabel, Strahl, Trantwein,  
per.

orf bei Karlsbad. Alkal. Säuerling.

ca in Galizien. Eisensäuerling. Aerzte: Blatteis,  
rczewski, Zdun, Zieleniewski.

owice bei Krakau. Schwefelbad. Arzt: Dura.

ne bei Szezawne in Galizien. Klim. Curort. Arzt:  
decki.

ck in Preuss.-Schlesien. Indiff. schwefelwasser-  
thältige Therm. 16—22° R. Aerzte: Josef, Gergens,  
gnar, Ostrowicz, Schütze, Voelkel (Wasserheil-  
t „Thalheim“), Wehse.

na (Niederlangenau) in Preuss.-Schlesien. Erdig-  
liche Eisenquelle. Arzt: Seidelmann.

nbrücken (Amalienbad) bei Bruchsal in Baden. Kalt-  
wefelquelle. Aerzte: Ziegelmeyer.

nsatza in Thüringen. Schwefelquelle. Aerzte: Baum-  
i, Seyferth.

stadt, Provinz Sachsen. Stahlbad, Trink- und Bade-  
Wannen- und Douchebäder. Arzt: Bätge.

berg im Harz, Provinz Hannover. Wasserheil-  
und Luftcurort. Aerzte: Ritscher, Wander.



**Leuk** im Canton Wallis (Schweiz). Arsen- und eisenhaltige Gypsthermen (51° R.). Aerzte: Brunner, v. Werra.  
**Levieo** (Vitriolo) Südtirol. Klim. Curort. Aerzte: Avenit Pacher, Pstrini.

**Liebenstein** in S.-Meiningen. Erdig-sal. Eisenquellen, klim. Curort, Wasserheilanstalt. Aerzte: Franz, Hesse.

**Liebenhell** in Württemberg. Indifferente Thermen (17 1/2 50° R.). Arzt: Romerdt.

**Liebowitz** in Böhmen. Alkalisch-erdige und eisenhaltige Sauerlinge. Arzt: Plumert.

**Lindau** am Bodensee in Baiern. Klim. Curort. Seebad. Schwimmanst. Aerzte: Bever, Kimmerle, Mayr, Vol.

**Lindenberg** in Hannover. Fichtennadelbad. Arzt: Müller.

**Lipik** in Slavonien. Jod- und bromhaltige Natronquelle. Aerzte: Gregorić, Kern, Roheim.

**Lippspringe** in Westphalen. Erdig-salinische Eisenquelle mit starkem Stickstoffgehalt (17° R.). Aerzte: v. Brun Dammann, Frey, Königer, Rhoden, Sauer.

**Littenweiler** bei Freiburg im Breisgau (Baden). Stahlquelle.

**Lobenstein** im Fürstenthum Reuss. Stahlquelle, Moor- und klimat. Curort. 1503' ü. d. M. Arzt: Aschenbach.

**Lubien** in Galizien. Schwefelbad. Arzt: Jana.

**Luhatschowitz** in Mähren. Salzbad. Jod-, brom- u. alkal. Quellen. Aerzte: Gallus, Küchler, Spielmann.

**Mährisch-Teplitz** bei Weisskirchen in Mähren. Ind. Therme. Arzt: Pollach.

**Marbach** am Bodensee (Schweiz). Wasserheilanstalt.

**Margarethen-Hellquelle** im Com. Bereg in Ungarn. Alkal. Sauerling.

**Margarethen-Insel, s. Ofen.**

**Mariabrunn** bei Röhrmoos in Baiern. Erdig-salin. Kal. wasser. Luitcurort.

**Marienbad** in Böhmen. Kräftige Glaubersalzquelle (Kreuz- und Ferdinandsbrunn), erdig-salinischer Sauerling (Rudolfsquelle) u. Eisenquelle (Ambrosiusbrunn), Gas-, Moor-, Stahl- und Dampfbäder. Aerzte: v. Basch, Danz David, Dobieszewski-Grimm, v. Heidler, Herzig, Igrisch, Kaufmann, Kisch, Kopernicki, Kopf, Lang, Lichtenstadt, Löwy, Lucca, Opitz, Ott, Prager, Reich Schindler-Barnay, Schmidt, Sterk, Wolfner.

**Maribathal** bei Oravitza in Ungarn. Höhengcurort. Arzt: Hoffenreich.

**Mathildenbad-Wimpfen** im Grossherzogthum Hessen. Jod- und bromhaltige Kochsalzquellen. Arzt: Weigand.

**Mattigbad** in Ober-Oesterreich. Eisenquelle, Fichtennadel-, Dampf- und Douchebäder. Arzt: Staininger.

**Maximiliansbad** am Venusberg bei Innsbruck. Mineral- u. Schwefelbad. Eisen- u. alaubalt. Bitterwasser.

**Mayrbad** bei Mindelheim in Baiern. Eisen-, erdig- Mineralquelle. Alle Arten Bäder. Aerzte: De Hossemann, Primus.

adia, s. Herulesbad.

berg im Fürstenthum Lippe. Erdig-salinische Koch-  
lz-, Stahl-, Schwefel- u. Gasquelle. Arzt: Holtz.

nezer-Ruszauda. Seebad im Com. Torontal in Ungarn.  
atrontherme. Arzt: Rankovits.

scherbad, s. Johannisbrunnen.

tone in Frankreich (Dep. Alpes maritimes). Klimat.  
ort. Aerzte: Beset, v. Cube, Siordet, Stiege, Thieme.

an, Südtirol. 340 M. ü. d. M. Klimatischer Wintercur-  
t. Saison von September bis Juni. Trauben-, Molken-

id Milcheur. Pneumatische Kammer. Oertel'sche  
rrainstation. Alpines Klima. Eisenbahn. Directe

agen Wien und Berlin. Curgemässe Einrichtungen,  
sequenz 10.989. Aerzte: Brül, Dobieszewsky, Fischer,

ank, v. Guggenberg, Hausmann, Hönigsberg, Huber,  
Kaan, Käufer, Kirchhammer, Kittel, Kleinhans,

uhn, Ladurner, Mazegger, v. Messing, Pircher, Prager,  
öll, Prünster, Rochelt, Schreiber, Theiner, Veninger.

gentheim, s. Karlsbad.

roy in Pommern. Ostseebad. Aerzte: Forner, Oswald,  
igt.

ling bei Wien. Eisenmineralbad.

a im Weissenburger Comitatz in Ungarn. Agnesquelle,  
hlensäurereichstes Wasser Ungarns.

dsee im Salzkammergut. Klim. Curort mit Sool- und  
utterlangensalz-, See-, Fichtennad el-, Eisenmoorsalz-,

hwefel- und Moorbädern. Aerzte: Flatz, Lechner.

t-Dore in Frankreich (Dep. Puy de Dôme). Schwach  
atron- und kochsalzhaltige Thermen 42° R. Aerzte:

ivin, Bronchin, Richelot.

treux mit Clarens, Vernex und Veytaux am Genfer  
ee. Klimatischer Curort. Aerzte: Bertholet, Carrard

n. u. jun., Chatelanat, Lardy, Lussy, Masson, Miniat,  
onnier, Reichenbach, Steiger, Fräulein Dr. v. Thilo.

Moritz im Ober-Engadin (Schweiz). Eisensäuerling.  
limat. Curort, 1769 M. ü. d. M. Aerzte: Berry, Biermann,

rügger, Christeller, Drummond, Tavernay, Veraguth.  
ster am Stein bei Kreuznach. Jod- und bromhaltige

sole (24 1/2° R.). Aerzte: Glässgen, Welsch.

zuzschlag in Steiermark. Wasserheilanstalt u. klim.  
urort. Arzt: Urbaschek.

kau (Hermannsbad) in Preuss.-Schlesien. Glaubersalz-  
altige Eisenquelle. Aerzte: Prochnow.

helm (Schwalheim) in Hessen-Darmstadt. Soolsprudel  
it starkem Gehalt an Kohlensäure u. alkal. Säuerling.

erzte: Bode sen., Bode jun., Grödl, Müller, Schott.  
targemünd in Baden. Luftcurort. Aerzte: Menzer,

brig.

ndorf in Hessen. Glaubersalzhaltige Schwefelquelle  
ed Molkencuranstalt. Aerzte: Ewe, Rögler, Varren

rst.

**Neudorf** (Constantinsbad) bei Mies in Böhmen. Eisensäuerling. Arzt: Dlauhy.

**Neuenahr** bei Bonn. Kohlensäurereiche alkalische Therme. Aerzte: zur Nieden, A. Schmidt, Rich. Schmitz, Teschemacher, Unschuld.

**Neuendorf** auf der Insel Wollin in Pommern. Ostseebad. Klim. Curort.

**Neuhaus** in Baiern. Eisenh. Kochsalzwasser. Arzt: Bilmann.

**Neuhaus** in Steiermark. Indifferente Therme. Arzt: Paltauf.

**Neumark** in Baiern (Oberpfalz). Eisenh. salin. Schwefelquelle. Arzt: Schweninger.

**Neu-Bakoczy** (Dölan) bei Halle. Muriatischer Säuerling. Inhalationseuranstalt. Arzt: Steinbrück.

**Neu-Schmeks** (Uj Tátra-Füred) in Ungarn. Terrain-Curort. Klim. Winter-Curort, Wasserheilst. und Sanatorium für Lungenkranke. Seehöhe 1006 M. Post- und Telegraphenstation. Arzt: v. Szontágh.

**Niederbrunn** im Elsass. Kochsalzquelle. Aerzte: Borl, Klein.

**Niendorf** (Elisabethbad) i. Oldenburg. Ostseeb. Arzt: Reich.

**Nizza** in Frankreich (Dep. Alpes-maritimes). Seebad und klimat. Curort. Aerzte: Crossly, Jacoby, Lippert, Meyhoffer, Pröll, Schmelz, Schnee, Zürcher.

**Norderney** in Hannover. Nordseebad. Aerzte: Böckmann, Fromm, Kruse, Thalheim.

**Ober-Döbling** bei Wien. Heilanst. für Gemüths- u. Nervenkrankte. Aerzte: Leidesdorff und Obersteiner.

**Obernigk** bei Breslau. Heil- u. Pflegeanstalt für Nerven- und Gemüthskrankte. Arzt: Kleudgen.

**Ober-Salzbrunn** in Preussisch-Schlesien. Alkal.-salin.-erd. Säuerling, Moorbäder etc. Aerzte: Berliner, Kuschbert, Nitsche, Pohl, Reinkober, Straehler, Valentiner.

**Oeynhausen** in Westphalen. Sehr stark kohlensäurehaltige Kochsalzthermen (24° R.). Aerzte: Cohn, Lehmann L. & E., Rinteln, Sauerwald, Voigt.

**Ofen** (Budapest) in Ungarn. A. Bitterquellen: Mattoni's Ofner Königsbitterwasser; Saxlehner's Hunyadi János; Hirschler's Franz Josef; Ofner Rákoczy; Hunyadi Lászlo; Aesculap; Victoria; János. B. Erdige Thermen: Mattoni's Königin Elisabeth-Salzbad (Arzt: Bruck); Blocksbad (Arzt: Váry Szabó); Bruckbad (Arzt: v. Heinrich); Königsbad; Lukasbad; Kaiserbad; Margarethen-Insel; Palatin-Insel.

**Ofen.** Elisabethb. Salin. Bäder. Trinkcuren. Arzt: Bruck.

**Ostende** in Belgien. Nordseebad. Aerzte: Corbisier, de Hondt, Janssens, de Jumné, Kockenpoo, van Oye,

Saulmann, Schramer, Verscheure.

**Ostenstein**, im Kgr. Sachsen. Klimat. Curort mit einer Eisenquelle. Moor- und Dampfbäder. Arzt: Garnerus.

**Parád** in Ungarn. Eisen-, Schwefel- und Alaunquellen. Arzt: Losteiner.

- Partenkirchen** in Baiern. Klimat. u. Molkencurort. Arzt: Waegener.
- Pachtoldsdorf** bei Wien. Wasser- und Kiefernadel-Curanstalt mit Inhalation, Dampf-, Wannen- und medic. Bäder. Arzt: Recheles.
- Petersthal** in Baden. Stahl- u. Lithionquelle. Arzt: Jaegerschmidt.
- Pirna** in Sachsen. Heilanstalt für Geistes- u. Nervenkranken. Arzt: Pierson.
- Pistyan** in Ungarn. Schwefelquelle mit vorzüglichem Schlamm. Aerzte: Alexander, Fodor, Reg.-Arzt Schwarz, Wagner, Weinberger, Wisznowski.
- Polzin** in Pommern. Alkal.-salin. Eisensäuerling (7° R.). Aerzte: Bechert, Deetz, Lehmann.
- Preblau** in Oesterreich. Alkal. Säuerling. Fichtennadelbäder. Arzt: Bancalari.
- Puchstein**, s. Giesshübl.
- Püllna** in Böhmen. Naturbitterwasser. (Versendung.)
- Puthus**, Insel Rügen. Ostseebad mit Einrichtungen für warme See- u. Soolbäder. Aerzte: Bengelsdorf, Brasch.
- Pyrawarth** in Nieder-Oesterreich. Starke Eisenquelle, Moorbäder, Eisenschwimmbad. Arzt: Brée.
- Pymont** im Fürstenthum Waldeck. Stahl- und Soolquelle. Alle Arten Bäder. Aerzte: Gruner, Lynker, Marcus, Menke, Schücking, Seebohm, Weitz.
- Rabbibad** in Südtirol. Alkalisch-muriatische Eisenquelle. Aerzte: Job, Stroflo.
- Rabka** in Galizien. Jod- und bromhaltige Soolquellen. Arzt: Kopernicki.
- Radegund** bei Graz. Wasserheilanst. Aerzte: Novy, Ruprich.
- Radein** in Steiermark. In hohem Grade reichhaltiger Natron-Lithion-Säuerling, Trink- und Badeanstalt. Arzt: Schönviszner.
- Radolfszell** in Baden. Seebad und Traubencurort.
- Radna** oder **Dombhat** in Siebenbürgen. Klim. Curort und alk. Eisensäuerling. Arzt: Kádár.
- Ragaz-Pfäfers** im Canton St. Gallen in der Schweiz. Indifferent. Therme (27°). Aerzte: Dormann, Jäger, Kaiser, Schädler.
- Rajeck-Teplitz** bei Sillein in Ungarn. Alann- und eisenhaltige indiff. Therme (28° R.). Arzt: Lichtenstein.
- Ránk-Herlein** bei Kaschau in Ungarn. Alkal. Säuerling. Arzt: Szteblo.
- Rehburg** in Hannover. Erdig-salinische Eisenwässer (12° R.). Molkencuranstalt. Aerzte: Kaatzer, Michaelis.
- Reiboldsgrün** im sächs. Voigtlande. Gebirgs-Heilanstalt (700 Meter) für Lungenkranke. Sommer und Winter besucht. Aerzte: Driver, Fromm, Jacobi.
- Reichenau** in Nieder-Oesterreich. Wasserheilanstalt „Rudolfsbad“. Arzt: Siegel.
- Reichenhall** in Baiern. Alpencurort mit Soolbad und Molkencuranst. Fichtennadelbäder, Inhalation. Aerzte



- Bulling, Bardach, Cornet, Goldschmidt, v. Liebig, Loeb, Mund, Pachmayr, Rapp, Schmid, Schneider.
- Reinerz** in Preuss.-Schlesien. Alkalisch-muriatischer Eisensäuerling, klimat. Gebirgscurort. Aerzte: Berg, Hilgers, Kolbe, Schubert, Secchi, Zdralek.
- Reutlingen** in Württemberg. Kalte Schwefelquelle. Aerzte: Springer, Vöhringen.
- Rippoldsau** in Baden. Glaubersalzhaltiger Eisensäuerling und salinische Eisenwasser. Arzt: Feyerlin.
- Rodna** (Dombhat) in Siebenbürgen. Alkal.-muriat. Eisensäuerling. Arzt: Bartok.
- Rohitsch-Sauerbrunn** in Steiermark. Glaubersalzsäuerling, Bade-, Trink-, Molken-, Milch-, Wasser-, elektrische und Kefyr-Curen. Massage. Aerzte: Glax, Hoisel.
- Rolands-Eck** in Rheinpreussen. Fichtennadelbad. Arzt: Brockhaus.
- Rom** in Italien. Klim. Curort. Aerzte: Dantone, Ehrhardt, v. Fleischl, Hoyer, Manassei, Nardini, Neuhaus-Zimmerly, Pantaleoni, Weber, v. Wendt, Wittmer, Zaverthal.
- Römerbad** in Steiermark. Akrotherme mit freier Kohlensäure u. Stickstoff. Elektrizität und Massage. Römerquelle 35° C., Amalienquelle 38° C. Arzt: Mayrhofer.
- Römerquelle** bei Gutenstein in Kärnten. Reinstes alk., vollkommen schwefelfreier Alpensäuerling. Sommerfrische. Bäder.
- Roncegno** in Süd-Tirol. Natürliche arsen- und eisenhaltige Quellen. Molken- und Traubencur. Wasserheilanstalt. Klim. Sommercurort. Aerzte: Borgherini, Goldwurm.
- Ronneburg** in Sachsen-Altenburg. Eisenhaltige Mineralquelle. Aerzte: Findeisen, Rossbach.
- Rosenheim** in Ober-Baiern. Eisenhaltige Schwefelquelle. Arzt: Schillinger.
- Rothenfelde** in Hannover. Jod- u. bromhaltige Soolquelle. Arzt: Kanzler.
- Rothenfels** in Baden. Kochsalzquelle. Arzt: Schenk.
- Rožnau** in Mähren. Molkencurort. Aerzte: Koblovsky, Kvasnička, Modry, Polansky.
- Rudolstadt** in Schwarzburg. Molkencuranstalt u. Fichtennadelbad. Aerzte: Clemens, Gansert, Hartung, Möller, Schumann, Syrbius.
- Rügenwaldermünde** in Hinterpommern. Ostseebad. Aerzte: Haake, Hanke, Hellweger.
- Säckingen** in Baden. Alkal.-sal. Kochsalztherme. Aerzte: Bauhofer, Mainhard.
- Saidschütz** in Böhmen. Bittersalzquelle.
- Salzburg** in Oesterreich. Moorbäder. Arzt: Göttersdorfer.
- Salzdeffurth** in Hannover. Soolbad. Arzt: Wahle.
- Salzhause**n in Hessen. Soolbad. Arzt: Prinz.
- Salzhemmendorf** in Hannover. Sool- und Fichtennadelbad.
- Salzig** bei Boppard am Rhein. Sool- und Schwefelquell.
- Salzschlief** in Hessen-Nassau. Jod-, brom- und lithionhaltiger Säuerling. Arzt: Wolffberg.

**Salzuffeln** in Lippe-Deilmold. Soolquelle. Aerzte: Lenzberg, Meyer.

**Salzungen** in Sachsen-Meiningen. Soolquellen. Trink-, Bade- und Inhalationscur. Aerzte: Ley, Trautvetter, Wagner.

**Sangerberg** bei Marienbad. Eisen-, Natron-Säuerling u. schwefelh. Glaubersalzquellen. Arzt: Spinner.

**San Remo** in Italien. Klimat. Curort an der Riviera di Genova. Aerzte: Aicardi, Ameglio, Bobone, Biermann, v. Brunn, Brandis, Dauberg, Favarger, Freemann, Goltz, Hassal, Körner, Porten, Salzmann, Secchi, v. Tymowski.

**Schandau** in Sachsen. Eisenbad und klimat. Curort. Aerzte: Reuchel, Müller, Roscher.

**Scheveningen** in Holland. Nord-Seebad. Seewassercuren und Wannenbäder mit Douchen. Luftcurort. Arzt: van der Mandele, Mess, de Niet, Sluise.

**Schgums** in Süd-Tirol. Schwefel- u. Eisenquelle. Aerzte: Flora, Plant, Tinzl.

**Schiermonikoog**, Nordseebad. Arzt: van Bouen.

**Schönbrunn** (Habsburgerbad) im Aargau in der Schweiz. Kochsalzh. Schwefeltherme. Aerzte: Amsler, Hemann, Tymowski.

**Schlungenbad** in Nassau. Indifferente Therme 24° R. Aerzte: Baumann, Bertrand, Grossmann, Wolf.

**Schmalkalden** in Hessen. Sool- u. Kiefernadelbad. Aerzte: Lehnebach, Ruhmer.

**Schmeks** (Tátra-Füred) in Ungarn. Luftcurort mit Wasserheilanstalten, einem kohlenhaltigen Säuerling und Krummholzbäder. Arzt: Jármay.

**Schmeks, Neu-, s. Neu-Schmeks.**

**Schmeks, Unter-, s. Unter-Schmeks.**

**Schmiedeberg** im Reg.-Bez. Merseburg. Eisenmoorbad. Aerzte: Hessler, Sponholz.

**Schreuzheim** bei Ellwangen in Württemberg. Mineralbad und Luftcurort. Aerzte: Drachter, Gross, Schabel, Werfer.

**Schwalbach** (Langenschwalbach) in Hessen-Nassau. Eisenquelle und Moorbäder. Aerzte: Böhm, Frickhöffer, Gen'g, Gosebruch, Grebert, Michelsen, Oberstadt.

**Schweizermühle** im Kgr. Sachsen. Klim. Curort. Wasserheilstätte. Arzt: Mayerhausen.

**Seon** in Oberbayern. Schwefelbad. Arzt: Hacker.

**Selters** in Nassau. Alkal.-muriat. Säuerling. Arzt: Arthen.

**Sinaia** in Rumänien. Klim. Curort u. Wasserheilstätte. Arzt: Cherenbach.

**Soden** bei Frankfurt a. M. Kochsalzquellen von 12—19° R. Sprudel von 24° R. Molkencuranstalt. Aerzte: Fresenius,

Haupt, Koehler, Schwarz, Stölzing, Thilenius G. & O.  
**Soden** in Rheinbayern. Jod- u. bromhaltige Kochsalzquelle. Arzt: Stadelmann.

**Sodenthal** bei Aschaffenburg (Station Sulzbach am Main).  
Jod-Brom-Soolbad. Arzt: Stadelmann.

**Soest** in Westphalen. Kochsalzquelle. Aerzte: Baehrens, Garms, Suren.

**Sonnenberg** in Nüziders bei Bludenz. Fichtennadel-, Eisen-Moor- und Soolbäder.

**Spas** in Belgien. Stahlquellen. Aerzte: Cutler, Damseant, Lezaak, Schauer.

**Spindelmühle** bei Hohenelbe im böhmischen Riesengebirge. 750 M. ü. d. Meere. Luftcurort mit einer Badeanstalt. Aerzte: Heintze, Patz.

**Stainz** bei Graz in Steiermark. Kochsalzhaltiger, an kohlensaurem Kalk und Lithion reicher Natronsäuerling. Trink- und Bade-Cur. Aerzte: Machan, Polay.

**Steben** in Baiern. Erdig-alkalische Stahlquelle mit starkem Gehalt an freier Kohlensäure. Arzt: Stifler.

**Sternberg** in Böhmen, 4 Stunden von Prag. Stahlquellen. Bade- u. Trinkcur. Quellentemperatur 8° R. Arzt: König.

**Stolzenberg** in Hessen-Nassau. Sool- und Bitterquelle. Aerzte: Bartholmei, Kraushaar, Taccius.

**Suderode** (Beringerbrunnen) in Preussen (Prov. Sachsen). Soolquelle. Arzt: Barwinski.

**Sühl** in Thüringen. Chlorealcium. Soolquelle. Aerzte: Greve, Jung.

**Sülldorf** i. d. Pr. Sachsen. Soolquelle. Aerzte: Funcke, Goedel.

**Sulz** bei Liesing in Nieder-Oest. Klimat. Curort mit einem Eisensäuerling. Arzt: Plohn.

**Sulz** in Baiern. Eisenschwefelquelle. Arzt: Ehrat.

**Sulza** in S.-Weimar. Soolquellen. Aerzte: Saenger, Schenk.

**Sulzbach** in Baden. Glaubersalzthermen. Arzt: Schneider.

**Sulzbrunn** (Kempten) in Baiern. Jodhaltige Kochsalzquelle. Arzt: Schrank.

**Sutinsko** in Croatien. Indiff. Therme 29° R. Arzt: Prelé.

**Swansea** in England (Grafschaft Lancaster). Seebad.

**Swinemünde** in Pommern. Ostseebad. Aerzte: Kortum, Schultze, Wilhelmi.

**Swoszowice** bei Krakau. Schwefelbad. Arzt: Skakalski.

**Sylt**, eigentlich **Westerland**, als Hauptort, ausserdem **Wenningstedt** u. **Marientlust** (kleiner, für Minderbemittelte oder der grösseren Einsamkeit b. dürfenden Personen bestimmte Badeorte), an der Westküste der Insel Sylt. Nordseebad. Aerzte: Lahusen, Marons, Nicolas.

**Szklene** in Ungarn (Com. Bar-). Erdig-alkal. Therme. Bade-, Trink-, Milch- und Molkencur. Arzt: Gasparez.

**Szllacs** in Ungarn. Eisenquelle mit grossem Reichthum an Kohlensäure. Aerzte: Hasenfeld, Szemere.

**Szebráncz** in Ungarn. Muriatische Schwefelquelle. Arzt: Widder.

**Tabarz** in Sachsen-Coburg-Gotha. Klimat. Curort und Wasserheilanstalt. Arzt: Lüntzel.

**Tarasp** im Canton Graubünden (Schweiz). Muriat. Natron- und Stahlsäuerlinge. Aerzte: Killias, Pernisch, Porta.

**Tátra-Füred**, s. Schmeks.

**Tatzmannsdorf** (Tarcza) in Ungarn. Glaubersalzhaltige Eisenquelle. Bader, Trink- und Molkencur. Klim. Curort. Arzt: Thomas.

**Tegersee** in Baiern. Klimat. Curort, 2487' ü. d. M.

Aerzte: Rosner, Herzog Carl in Bayern, Löwenheim.

**Teinach** in Württemberg. Erdig-alkalischer Säuerling.

Wasserheilstalt. Fichtennadelbäder. Arzt: Wurm.

**Teplitz** in Mähren, s. **Mährisch-Teplitz**.

**Teplitz-Schönau** in Böhmen. Alkal.-salin. Thermen. Moor- bader. Aerzte: Baumeister, Bergmann, Eberle, Eichler, Ficker, Friedländer, Heller, Hirsch J. u. M., Janka, Knaur, Kraus, von Krajewski, Langstein, Lieblein, Löwy, Lustig, Müller, Musil, Radnik, Redlich, Richter, v. Seiche, Stein, Walther.

**Thal** bei Ruhla, s. **Louisenbad-Thal**.

**Thale**, s. **Hubertusbad**.

**Thalheim**, s. **Landeck**.

**Thalkirchen** bei München. Wasserheil- und diätetische Anstalt für Nerven-, Unterleibs- und sexuelle Leiden. Morfumentziehungscur. Arzt: Stammeler.

**Tharand** in Sachsen. Klimat. Curort. Eisen- u. Kiefernadelbäder. Heilanstalt für Nervenkrankhe. Arzt: Haupt.

**Tobelbad** in Steiermark. Eisenhalt. Akrotothermen. Porcellan-, Fichtennadel- und elektr. Bäder. Massage. Gebirgscurort. Arzt: Blumauer.

**Topfca** in Siebenbürgen. Badequelle von 26° C. Erdig-salin. Säuerling. Arzt: Mild.

**Topusko** in Croatien. Indifferente Thermen (39—40° R.). Mineral- u. Schlamm-bäder. Klim. Sommercurort. Arzt: Trenz.

**Tölz**, s. **Krankenheil**.

**Traunstein** in Ober-Baiern. Mineral-, Sool- und Moorbad. Aerzte: Amann, Gesselle, Leonpacher, Wolf.

**Trentschin-Teplitz** in Ungarn. Schwefeltherme. Aerzte: Filipkiewicz, Gallia, Ventura.

**Triberg** in Baden. Luftcurort. Aerzte: Federle, Kreglinger.

**Truskawec** in Galizien. Schwefel- und starke Kochsalzquellen, Salz-, Schwefel- u. Eisenmoorbäder, Arzt: Plech.

**Tüffer** in Steiermark. Römerbad. Akrototherme von 30 bis 31° R. Arzt: Mayrhofer.

**Markt Tüffer** in Steiermark. Kaiser Franz Josefbad. Arzt: v. Schön-Perlashof.

**Ullersdorf** in Mähren. Alkal.-salin. Trinkquelle; Schwefelquelle. Bade- und Molkencuranstalt. Arzt: Lorenz.

**Unter-Schmeks** (Also Tátra-Füred) in Ungarn. Eisenmoorbäder. Wasserheilstalt. Klim. Curort. 340 M. Seehöhe. Bader, Trink- und Terraincur. Arzt: v. Pap.



**Ustron** in Oesterr.-Schlesien. Klimat. Curort mit Molken-  
curanstalt. Arzt: Göbl.

**Veldes** am Veldeser See in Krain. Glanbersalzhaltiger  
Natroneisensäuerling. Wasserheilanstalt. Arzt: Rikli.

**Vellach**, s. Fellach.

**Venedig** in Italien. Seebad und klimat. Curort.

**Vernex**, s. Montreux.

**Vetan**, s. Fettau.

**Vevey** am Genfer See. Klim. und Traubencurort. Aerzte:  
Barnaut, Cuénod, Guisan, Martin, Muret, Perrier,  
Reymond, Rossier.

**Veytaux**, s. Montreux.

**Vichy** in Frankreich (Dep. Allier). Reine Natronthermen.  
Aerzte: Barudel, Champagnat, Chopard, Cornillon,  
Daumas, Dubois, Durand, Fardel, Gaudin, Grellety,  
Nicolas, Popier, Senac, Souligeux, Villemin.

**Vihnye** in Ober-Ungarn. Eisentherme mit 38°3' C. Terrain-  
kuren. Arzt: v. Bolemann.

**Visehrad** in Ungarn. Klimat. u. Wassercuranstalt. Sonnen-  
bäder u. Heilgymnastik. Aerzte: v. Bakody, Sulkowsky.

**Vöslau** bei Wien. Indiff. Therme. Aerzte: Chimani,  
Rosenthal, Krischke, Veniger.

**Währing** bei Wien. Orthopädische Heilanstalt. Arzt:  
v. Weil.

**Warasdin-Töplitz** in Croatien. Schwefeltherme von 45 bis  
48° R. Bade- und Trinkcur. Schwefelschlamm-bäder.  
Elektricität. Massage. Arzt: Longhino.

**Warmbrunn** in Pr.-Schlesien. Indiff. Thermen (29—32° R.).  
Aerzte: Collenberg, Franz, Herzog, Hoehne, Jahn, Lange,  
Luchs, Müller.

**Warnemünde** in Meckl.-Schwerin. Ostseebad. Klim. Winter-  
curort für Nervenkranken. Aerzte: Mahn, Uterhart.

**Wasserburg** in Ober-Baiern. Indiff. Therme. Aerzte:  
Glonner, Kosak, Zierl.

**Wellbach** im Regierungs-Bezirk Wiesbaden. Schwefelbad.  
2 Inhalationssalons. Arzt: Stifft.

**Weinheim** in Baden. Stahlquelle. Aerzte: Carillon, May,  
Mittelstrass, Roder, Schellenberger.

**Weissenburg** im Canton Bern (Schweiz). Indiff. Thermen  
(22—23° R.). Curort für Husten- und Lungenkranken.  
Arzt: Henguenin.

**Westerland-Sylt**, s. Sylt.

**Wien**. Privatheilanstalt für Gemüthskranke. Arzt: Svetlin.

**Wiesau** (König Ottobad) in Baiern. Erd.-alkal. Säuerling  
mit hohem Eisengehalte. Arzt: Beyer.

**Wiesbaden** in Hessen-Nassau. Alkal. Kochsalzthermen von  
35° R. Bade-, Trink- u. Traubencur. Wasserheilanstalt.

*Auch klimat. Wintercurort. Aerzte: Alle in der Stadt  
practicirenden Aerzte.*

**Wildbad**, Württemberg. Indiff. Thermen. Aerzte: Bark-  
hardt, Haasmann sen. u. jun., v. Renz, Wagner.

**Wildstein** bei Trarbach a. d. Mosel. Indiff. heisse Therme von 29° R. Aerzte: Haack, Niessen.

**Wildungen** i. Fürstenthum Waldeck. Alkalische Eisensäuerlinge. Georg Victor-, Helenen- u. Königsquelle. Aerzte: Krüger, Mark, Reinhold, Röhrig sen., Röhring jun., Schmitz, Severin.

**Wilhelminenbad**, s. Wyk.

**Wilhelmsbad** bei Hanau in Hessen-Nassau. Luftcurort. Wasserheilanstalt.

**Wilhelmshöhe** bei Cassel. Klim. Curort. Cur- u. Wasserheilanstalt. Arzt: Greveler.

**Wimpfen** a. Neckar. Soolbad. Aerzte: Eisenmenger, Weigand.

**Wipfeld** (Ludwigsbad) in Baiern. Schwefel-, Stahl- und Eisenquellen. Schwefelmineralmoor. Arzt: Mercken. Gyps- und Eisenwasser, sowie Moorschlamm. Arzt: Tholus.

**Wittekind** in Preussen (Prov. Sachsen). Soolquelle. Aerzte: Graefe Carl, Graefe Max.

**Wolfach** in Baden. Stahlquelle. Kiefernadel- u. Soolbäder. Aerzte: Herrmann, Willmann.

**Wolkenstein** im Kgr. Sachsen. Indiff. Therme. Arzt: Kay.

**Wyk** in Schleswig (Wilhelminenbad). Nordseebad u. klim.

Wintercurort. Aerzte: Gerber, Hitscher.

**Zakopane** in Galizien. Klimatischer Curort. Zwei Wasserheilanstalten. Aerzte: Chramiec, Piasecki.

**Zandvoort**, Holland, Nordseebad. Aerzte: Gerke, Ten Cate-Hoe, Aemakens.

**Zoppot** bei Danzig. Ostseebad. Aerzte: Benzler, Friedländer, Pauske, Zaeck.

**Zwieselbad-Handlhof** a. d. Lammer in Salzburg a. d. Gisela-bahn. Salinische Mineralquelle. Luftcurt. Arzt: Höfner.

**Zwischenahn** in Oldenburg. Wasserheilanstalt und Luftcurort. Arzt: Fickert.

## 11. Die Bade- und Curorte nach ihrer Charakteristik alphabet. geordnet.

**Einfache alkalische Säuerlinge:** Bilin, Birresborn, Fachingen, Fellathaquellen (Villacher Bad), Geilnau, Giesshübl-Puchstein, Gleichenberg, Kochel, Königswart, Mont-Dore, Nenenahr, Obersalzbrunn, Passag, Preblau, Radein, Stainzer Säuerling „Johannesquelle“, Teinach, Tönistein, Vals, Vichy.

**Alkalisch-muriatische Quellen:** Ems, Gleichenberg, Luhatschowitz, Oberselters, Selters, Wiesbaden, Roisdorf, Royan-les-bains, Szezawinca.

**Alkalisch-muriatische Quellen mit Lithiongehalt:** Assmannshausen, Baden-Baden, Bilin, Dürkheim, Elster, Homburg, Kissingen, Obersalzbrunn, Salvator, Radein, Salzschlirf, Stainzer Säuerling „Johannesquelle“, Weilbach.

**Alkalisch-sulfatische Quellen:** Bertrich, Carlsbad, Füred, Marienbad, Rohitsch-Sauerbrunn, Stul'nya, Tarasp-Schuls.

**Eisenquellen:** Alexandersbad, Alt-Haide, Antogast, Bartfeld, Berka, Bibra, Bocklet, Borzék, Braubach-Dinkelholderbrunnen, Brückenau, Bukovine, Carlsbad (hat auch Eisenquellen), Charlottenbrunn, Cudowa, Driburg, Előpatak, Elster, Flinsberg, Franzensbad, Freinwalde, Freiernbach, Godesberg, Goldach, Gleichenberg, Griesbach, Heinrichsbad, Hofgeismar, Homburg von der Höhe, Imnau, Inselbad, Jakobsbad, König Ottobad, Königswart, Korytnica, Krynica, Liebenstein, Lieberwerda, Lobenstein, Malmedy, Marienbad, Neuenhain, Nidelbad, Niederlangenau, Petersthal, Polzin, Pyrawarth, Pymont, Rastenburg, Reiboldsgrün, Reinerz, Rippoldsau, Rodna, Roisdorf, Sangerberg, Schandau, Schwalbach, Schwarzbach, Soultzbach, Spaa, St. Moritz, Steben, Szliács, Tarasp-Schuls, Tatzmannsdorf (Tarcza), Teinach, Wilhelmsbad.

**Alkalisch-erdige Quellen:** Bath, Contrexéville, Herstes, Inselbad, Leuk, Lippspringe, Ussat, Weissenburg, Wildungen.

**Schwefel-Thermen:** Aachen, Aix-les-Bains, Amélie-les-Bains, Ax, Baden (bei Wien), Baden (Schweiz), Bagnères du Luchon, Barèges, Bartscheidt, Caunterets, Eaux bonnes, Eaux chaudes, Grosswardein, Harkány Héluau-les-Bains, Herkulesbad, La Preste, Lavey, Mehadia, Molitz, Piatigorsk, Pystian, Schinznach, St. Sauveur, Teplitz-Treuschein, Warasdin-Töplitz, Vernet.

**Kalte Schwefel-Quellen:** Allevard, Alveneu, Benthel, Challes, Eilsen, Enghien, Grindbrunnen, Gurnigel-Bach, Hechingen, Heustrich, Höhenstedt, Kainzenbad, Kässleres, Langenbrücken, Langensalza, Lenk, Le Prey, Löstorf, Lubien, Marlioz, Meinberg, Neundorf, Piesendorf, Reutlingen, Schimbergbad, Schwarzseebad, St. Honore, Szobrancez, Tannstadt, Uriage, Weilbach, Yverdon.

**Kochsalzquellen:** Alsó-Sebes, Beringerbrunnen, Cönnigsdorf, Hubertusbad, Homburg v. d. Höhe, Kronthal, Rastatt, Kreuzburg, Mondorf, Neuhaus, Neu-Bakow, Niederbrunn, Orb, Pyrmont, Salzhausen, Schmalkalden, Soden.

**Kühle Kochsalzquellen (Jodtrinkquellen):** Adelhausen, Geschaidhof, Hall, Iwonicz, Jodenthal, Kainzenbad, Königsdorff-Jatztrzeb, Lipik, Salzschlirf, Saxon-Bains, Sireck, Soden, Sulzbach, Sulzbrunn, Tölz, Wegg, Zaison.

**Kochsalzthermen:** Baden-Baden, Balneum, Batagny, Bourbonnes-les-Bains, Lichtenthal, Wiesbaden.

**Einfache Soolbäder:** Artern, Hall (Württ.), Jaxt, Juliusbad, Kösen, Köstritz, Rheinfelden, Rothenfelde, Salzuffeln.

**Jod- und bromhaltige Soolbäder:** Aibling, Arnstorf, Aussee, Bassen, Castrocara, Cieschossineck, Colberg, Döhlen, Elmen, Frankenhausen, Gmunden, Goczalkow, Hall (Oberösterreich), Hall (Tirol), Inowrazlaw, Ischl, Karlshafen, Königsborn, Kreuznach, Münster am Stein, Reichenhall, Rosenheim, Saliens, Salies-de-Béarn, Salsbrunn, Salzhemmendorf, Soolsdorf-Rodenberg, Straßburg, Traunstein, Wittekind.

**Alkalisch-salinische Thermen:** Teplitz-Schönau i. Böhmen.

**Kohlensäure Sool-Thermen:** Nauheim, Oeynhaus, Rehme, Schwalheimer-Brunnen, Werne.

**Wildbäder:** Badenweiler, Bains, Bormio, Gasthof, Johannisbad, Landeck, Liebenzell, Nérès, Neuhaus, Pfäfers-Ragaz, Plombières, Römerbad, Schlange, Toblbad, Tüffer oder Franz Josefsbad, Warmbad, Wäldchen, Wildbad.

**Seebäder (an der Nordsee):** Blankenberghe, Bösing, Morkum, Cuxhaven, Dangast, Föhr, Helgoland, Heide, Juist, Katwyk, Langevög, Neuwerth, Norderney, Osterland, Sandfort, Sheveningen, Wangeroo, Westerland.

**Seebäder (an der Ostsee):** Borbye, Colberg, Crampass, Dievenow, Friedrich Wilhelmsbad, Glücksbrunn, Hafkrug, Hassberg-Holstein, Heiliger-Damm, Haren, Haren, Kiel, Kahlberg, Marienlyst, Misdroy, Neukuhnen, Neundorf, Neuhaus, Pittau, Reinkenbagen, Rostock.



walde, Sassnitz, Scharbentz, Swinemünde, Travemünde, Utrikasborg, Warnemünde, Warniken, Westerplatte, Zoppot.

**Seebäder (in Frankreich):** Biarritz, Boulogne sur mer, Cabourg, Dieppe, Étretat, Fécamp, Havre de Grace, Marseille, Monaco, Nizza, Royau, Trouville.

**Italienische Seebäder:** Castellamare, Ischia, Livorno, Massa, Messina, Palermo, Spezzia Golf, Venedig, Viareggio, Villa-Franca.

**Seebäder (in England):** Barmouth, Bearmaris, Blackpool, Brighton, Cambelltown, Devonshire, Dover, Dreumere, Hastings, Kilrush, Lymington, Margate, Port Rush, Port Stewart, Ramsgate, Rothsay, Runcorn, Southport, Swansea, Tergmouth, Teuby, Town, Torquay, Tramore, Warrepoint, Wight, Yarmouth.

**Klimatische Curorte (subalpine):** Achensee, Albisbrunn, Aussee, Badenweiler, Badersee, Beggenried, Berchtesgaden, Boendorf, Chiemsee, Friedrichshafen, Gais-Garmisen, Gersau, Giessbach, Glion, Gmunden, Gottlieben, Gousenbad, Griessbach, Heiden, Heinrichsbad, Hertenstein, Interlaken, Ischl, Kainzenbad, Lindau, Luzern, Mammern, Mondsee, Netli, Partenkirchen, Reichenhall, Reeboldsgrün, Rippoldsau, Rohrschach, Schirsee, Schönbrunn, Starnbergerssee, St. Blasien, Tegernsee, Teinach, Todtmoos, Tryberg, Ueberlingen, Waeggis, Waldau, Weissbad, Wiesenbad, Wolkenstein.

**Klimatische Curorte (Sudeten):** Charlottenbrunn, Falkenstein, Görbersdorf, Johannisdorf, Karlsbrunn, Reinerz.

**Klimatische Curorte (mittlere Höhen):** Baden-Baden, Erlenbad, Liebenzell, Teinach.

**Klimatische Curorte (in den Vogesen):** Alexandersbad, Beuron, Brotterode, Clamsthal, Die drei Aehren, Elgersburg, Friedrichsrode, Geradsmer, Gernsbach, Herrenalb, Ilmenau, Lobenstein, Muggendorf, Ottilienberg, Rossweil, Schoenmünzsch, Streitberg, St. Andreasberg, Tabarz.

**Klimatische Curorte (alpines Klima):** Arenstein, Bormio, Bürgenstock, Churwalden, Davos am Platz, Davos, Doerfl, Engelberg, Felsenegg, Grindelwald, Klosters, Königswart, Krenth, Ohladis, Pontresina, Rigi-First, Rigi-Kaltbad, Rigi-Klösterli, Rigi-Kulm, Rigi-Scheideck, Rigi-Staffel, Samaden, Schönfels, Schweneck, Seelisberg, Seewis, Sils Maria, Silva Plana, St. Beatenberg, St. Moritz, Stoos, Weissenstein.

**Winterstationen:** Aci-reale, Aigle, Ajaccio, Algier, Arcachon, Arco, Bex, Bordighera, Bournemouth, Brighton, Cadenabbia, Cairo, Cannes, Catania, Chernex, Clifton, Corn, Eastbourne, Glion, Gries, Guernsey, Hastings, Hyères, Jersey, La Specia, Lugano, Madeira, Malaga, Mentone, Meran, Montrenx, Nervi, Nizza, Palermo, Pau,

Pisa, Porto San Maurizio, Rom, San Remo, Torquay, Venedig, Ventnor, Vevey.

**Wasserheilanstalten:** Albisbrunn, Anclam, Aussee, Baden b. Wien, Brestenberg, Brühl, Brunnthal, Buchenthal, Centnerbrunn, Ceruobbio, Debno, Dietsmühle, Eckerberg, Eggenberg, Eichwald, Elgersburg, Engelberg, Gainfarn, Geltschberg, Gerardmer, Gleisweiler, Giesshübel, Godesberg, Grafenberg, Helenenthal, Herrenalb, Hofheim, Hohenstein, Ilmenau, Johannisberg, Ischl, Kaltenleutgeben, Karlsbrunn, Königsbrunn, Königstein, Kreische, Kreuzen, Laubach, Lauterberg, Liebenstein, Mammern, Marienberg, Marillathal, Michelstadt, Mühlbad, Nassau, Nerothal, Obermais, Pallanza, Pelonken, Priessnitzthal, Radegund, Regoledo, Ruhla, Schlensingen, Schönbrunn, Schweizermühle, Sonneberg, Sophienbad, Stuer, Tiefenau, Villa d'Este, Visegrád, Wartenberg, Wolfsanger, Zuckmantel.

**Moor- und Schlammäder:** Bocklet, Carlsbad, Cudowa, Elster, Franzensbad, Flinsberg, Kissingen, Königswart, Limane bei Odessa, Marienbad, Prückenan, Pyrmont, Reinerz, Spaa, Steben, Teplitz, Triburg.

**Schwefelmoore:** Acqui, Aix-les-bains, Baden b. Wien, Bentheim, Driburg, Eilsen, Gurnigl, Limane bei Odessa, Mehadia, Meinberg, Neudorf, Niederlangenau, Topuszek, Uriage, Wipfeld.

**Bitter-Quellen:** Birmensdorf, Friedrichshall, Gallhofen, Gran, Hessische, Iwanda, Kis-Czeg, Kissingen, Mergentheim, Montmirail, Ober-Alap, Ofen, Püllna, Sedlitz, Saidschitz.

**Trauben-Curorte:** Auerbach, Bozen, Dürkheim, Edenhofen, Eppan, Gleisweiler, Goarshausen, Gries, Honnef, Meran, Neustadt, Rudesheim, Schönberg, Vöslau, Weinheim, Wien.

## 12. Künstliche Bäder.

Kalte Bäder 10–20° C. + 8–15° R.,

Kühle " 20–28° " + 16–22° "

Laue " 28–34° " + 23–26° "

Warme " 34–40° " + 27–32° "

Heisse " 40–45° " über 32° "

Vollbad (bis an den Hals reichend) etwa 200–400 Liter für Erwachsene, 50–200 Liter für Kinder. Halbad (bis zur Herzgrube reichend) 100–150 Liter. Sitzbad 20–30 Liter. Localbad nach Massgabe der Körpertheile, z. B. Fussbad 10 Liter.

**Alkalische Bäder, s. Laugenbad.**

**Aromatische Bäder:** a) durch Zusatz des Aufgusses von  
 500—1000 Gr. Kamillen, oder  
 500—1000 „ Pfefferminze, oder  
 300— 500 „ Kalmuswurzel, oder  
 200— 500 „ Spec. aromat. auf 2—10 Liter  
 Wasser in ein Bad.

b) Durch Zusatz von:

50—100 Gr. Spir. Angelicae comp., oder  
 „ Calami,  
 „ Mastiches comp.,  
 „ Serpylli.

Etwa die Hälfte für ein Kind.

**Chlorkalkbäder:** 500 Gr. Calcaria chlorata zu einem Vollbad,  
 10°0 auf 1 Liter Wasser zu einem Localbad.

**Eichenrindenbäder, vide:** Tanninbäder.

**Eisenbäder:** 1. reines Eisenvitriol. Ferr. sulf. venale 30°0  
 bis 60°0 und gereinigte Potasche 120°0. 2. reines Eisen-  
 vitriol 30°0, Kochsalz 60°0, Natr. bicarb. 90°0. Für Kinder  
 ein Viertel der Dosis.

**Eisenmoorbäder:** 1 Kilo Mattoni's Eisenmoorsalz oder  
 1 Flasche Eisenmoorlange für 1 Vollbad; bei Kindern  
 und Schwächlichen geringere Concentration.

**Fichtennadelbäder:** Fichtennadelextract (Extr. Pini syl-  
 vestr.) 150—500 Gr.

**Harzbäder:** Terebinth. ven. und Picis liq. aa 1000°0 mit  
 warmem Wasser stundenlang gerührt (Trousseau).

**Jodbäder:** Kal. jod. 50°0—100°0 zum Vollbad, 5°0—10°0 zum  
 örtl. oder Sitzbad. — Oder: Kal. jod. 20°0, Jodi puri  
 10°0. (In Holzwannen.)

**Kleienbad:** Weizenkleie  $\frac{1}{2}$  — 1½ Kilogr. in 5 Liter Wasser,  
 durch  $\frac{1}{2}$  Stunde gekocht.

**Laugenbad:** Rohe Potasche 100—500 Gr. in ein allgemeines  
 Bad, 5—10°0 zu einem örtl. Bad. Auch Kali caust. siccum  
 10°0 bis 50°0 bis 100°0 auf ein allgemeines Bad.

**Leimbäd:** 500—1000 Gr. Colla anim. in heissem Wasser gelöst.

**Malzbäd:** 1—3 Kilogr. Gerstenmalz  $\frac{1}{2}$  St. in 4—5 Liter  
 Wasser gekocht zum Bad.

**Milch- oder Molkenbäder** rein oder zur Hälfte mit Wasser  
 gemengt.

**Moorbäder, v. Eisenmoorbäder.**

**Mutterlaugenbäder** 1—3 Kilogr. Halleiner Mutterlaugen-  
 salz auf 1 Bad.

**Salzbäd:** 2—4 Kilogr. Koch- oder Seesalz, oder 1 Kilogr.  
 Kochsalz und 1 Kilogr. Mutterlaugensalz oder 1 Liter  
 Mutterlange.

**Säurebäd:** Ac. muriat. od. nitr. 100°0—500°0 auf 1 Vollbad  
 (Holzwanne).

**Schwefelbäd:** 1. Natrium subsulfuros. 50°0—100°0, oder 2.  
 Kalium sulfuratum pro balneo 50°0—100°0 (stärker!), 3.  
 Kalium sulfuratum pro balneo 30°0, Acid. sulf. crud. 15°0





den (Apomorphinum hydrochl., Coffeinum, Extr. scillae, Hydrarg. cyanatum, Jodoformium, Physostigminum salicyl., Pilocarpinum hydrochlor., Secale cornutum — andere daraus — und zum Theil aus der Pharmacopoe überhaupt — gestrichen (in letztere Kategorie gehören Aconitinum, Aqua laurocerasi, Baryum chloratum, Folia toxicodendri, Fructus sabadillae, Hydrargyrum nitricum, Morphinum purum und aceticum, Radix Hellebori viridis, Strychninum, Tinct. belladonnae, Tinct. digitalis aetherea, Tinct. toxicodendri, Zincum aceticum und valerianicum). Für Aqua laurocerasi ist Aqua amygdalarum amararum, — für Morph. aceticum ist Morph. hydrochloricum zu dispensiren.

A. Eulenburg.

	Ph. austr.		Ph. germ.	
	p.dosi	p.die	p.dosi	p.die
Acetum digitalis . . . . .	—	—	2'0	10'0
Acidum arsenicosum . . . . .	0'006	0'012	0'005	0'02
„ carbolicum . . . . .	—	—	0'1	0'5
„ hydro-cyanicum (Pharmac. austr. 1855) . . . . .	0'05	0'20	—	—
Aconitinum (germanicum) (Geiger und Hesse, Merck)	0'007	0'04	—	—
Apomorphin. hydrochloricum	—	—	0'01	0'05
Aqua amygdalarum amararum	1'50	5'00	2'0	8'0
„ laurocerasi . . . . .	1'50 <sup>40</sup>	5'00	—	—
Argentum nitricum . . . . .	0'03	0'20	0'03	0'2
Atropinum . . . . .	0'002	0'006	—	—
„ sulfuricum . . . . .	0'002	0'006	0'001	0'003
Auro-Natrium chloratum . . . . .	0'03	0'10	0'05	0'02
Cantharides . . . . .	0'07	0'20	0'05	0'15
Chloralum hydratum . . . . .	—	—	3'0	6'0
Codeinum . . . . .	—	—	0'05	0'2
Coffeinum . . . . .	—	—	0'2	0'6
Conium . . . . .	0'001	0'003	—	—
Cuprum sulfuricum pr. emetico	0'40	—	1'0	—
Digitalinum (Ph. gall. n. austr.)	0'002	0'01	—	—
Extractum aconiti . . . . .	0'03	0'12	0'02	0'1
„ belladonnae foliorum	0'10	0'40	0'05	0'2
„ „ radices	0'05	0'20	—	—
„ cannabis indicae . . . . .	0'10	0'30	0'1	0'4
„ colocynthis . . . . .	0'10	0'40	0'05	0'2
„ conii . . . . .	0'18	0'60	—	—
„ digitalis . . . . .	—	—	0'2	1'0
„ hyoscyami . . . . .	0'15	0'80	0'2	1'0

	Ph. austr.		Ph. germ.	
	p.dosi	p.die	p.dosi	p.die
Extractum nucis vomicae (Ph. austr.) = Extr. strychni (Ph. germ.)	0'04	0'20	0'05	0'15
" opii . . . . .	0'10	0'40	1'15	0'5
" scillae . . . . .	—	—	0'2	1'0
Ferrum iodatum . . . . .	0'06	0'24	—	—
Folia belladonnae . . . . .	0'15	0'60	0'2	0'6
" digitalis . . . . .	0'20	0'60	0'2	1'0
" stramonii . . . . .	0'25	1'00	0'2	1'0
Fructus colocynthidis . . . . .	0'30	1'00	0'3	1'0
Gutti . . . . .	—	—	0'3	1'0
Herba conii . . . . .	0'30	2'00	0'3	2'0
" hyoscyami (Ph. germ.)	—	—	0'3	1'5
Hydrargyrum bichloratum . . . . .	0'01	0'04	0'03	0'1
" bijodatum (rubrum) . . . . .	0'01	0'04	0'03	0'1
" cyanatum . . . . .	—	—	0'03	0'1
" iodatum (flavum) . . . . .	0'06	0'40	0'05	0'2
" oxydatum . . . . .	0'03	0'10	0'03	0'1
" " via humida paratum . . . . .	—	—	0'03	0'1
Jodoformium . . . . .	—	—	0'2	1'0
Jodum . . . . .	0'03	0'12	0'05	0'2
Kalium stibio-tartaricum (Ph. austr.) = Tartarus stibiatus (Ph. germ.) . . . . .	0'30	1'00	0'2	0'5
Kreosotum . . . . .	0'04	0'16	0'1	0'5
Lactucarium . . . . .	0'30	1'20	0'3	1'0
Liquor Kalii arsenicosi (Ph. germ.) . . . . .	—	—	0'5	2'0
Morphinum . . . . .	0'02	0'10	—	—
" aceticum . . . . .	0'03	0'12	—	—
" hydrochloricum . . . . .	0'03	0'12	0'03	0'1
" sulfuricum . . . . .	—	—	0'03	0'1
Oleum crotonis . . . . .	0'06	0'30	0'05	0'1
Opium . . . . .	0'15	0'50	0'15	0'5
Phosphorus . . . . .	0'001	0'005	0'001	0'005
Physostigminum salicylicum . . . . .	—	—	0'001	0'003
Pilocarpinum hydrochloricum . . . . .	—	—	0'03	0'06
Plumbum aceticum . . . . .	0'07	0'50	0'1	0'5
Radix belladonnae . . . . .	0'07	0'30	—	—
" hellebori viridis . . . . .	0'30	1'20	—	—
Rhizoma veratri albi . . . . .	0'30	1'20	—	—
Santoninum . . . . .	0'10	0'50	0'1	0'5
Secale cornutum . . . . .	—	—	1'0	5'0

	Ph. austr.		Ph. germ.	
	p.dosi	p.die	p.dosi	p.die
Semen strychni . . . . .	0'12	0'50	0'1	0'2
Solutio arsenicalis Fowleri (Ph. austr.) . . . . .	0'50	1'10	—	—
Strychninum . . . . .	0'007	0'02	—	—
nitricum . . . . .	0'007	0'02	0'01	0'02
Summitates sabinæ . . . . .	—	—	1'0	2'0
Tinctura aconiti . . . . .	0'50	1'50	0'5	2'0
" belladonnæ . . . . .	1'00	4'00	—	—
" cantharidum . . . . .	0'50	1'00	0'5	1'5
" colchici . . . . .	1'00	3'00	2'0	6'0
" colocynthidis . . . . .	—	—	1'0	3'0
" digitalis . . . . .	1'00	4'00	1'5	5'0
" jodi . . . . .	0'30	1'00	0'2	1'0
" lobeliae . . . . .	—	—	1'0	5'0
" nucis vomicæ (Ph. austr.) = Tinctura strychni (Ph. germ.)	0'50	1'50	1'0	2'0
" opii crocata . . . . .	0'50	2'00	1'5	5'0
" simplex . . . . .	0'50	2'00	1'5	5'0
Tubera aconiti . . . . .	0'12	0'60	0'1	0'5
Veratrinum . . . . .	0'01	0'03	0'005	0'02
Vinum colchici . . . . .	1'00	3'00	2'0	6'0
Zincum aceticum . . . . .	0'05	0'30	—	—
" cyanatum . . . . .	0'005	0'012	—	—
" sulfuricum . . . . .	0'05	0'30	—	—
" sulf. pro emetico . . .	0'80	—	1'0	—

## 14. Vergleichung der gebräuchlichen Thermometerscalen.

C. = Celsius, R. = Réaumur, F. = Fahrenheit.

C.	0	5	10	15	20	25	30	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
R.	0	4	8	12	16	20	24	28	28 $\frac{1}{2}$	29 $\frac{1}{2}$	30 $\frac{1}{2}$	31 $\frac{1}{2}$	32	32 $\frac{1}{2}$	33 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{2}$	35 $\frac{1}{2}$	36
F.	32	41	50	59	68	77	86	95	96 $\frac{1}{2}$	98 $\frac{1}{2}$	100 $\frac{1}{2}$	102 $\frac{1}{2}$	104	105 $\frac{1}{2}$	107 $\frac{1}{2}$	109 $\frac{1}{2}$	111 $\frac{1}{2}$	113

Anmerkung. Die Eintheilung von Réaumur und Celsius bewegt sich zwischen Gefrierpunkt (= Nullpunkt) und Siedepunkt des Wassers. R. nimmt 80, Celsius 100 Grade an. Bei Fahrenheit beginnt der Nullpunkt tiefer, u. zw. da, wo eine Weingeist- od. Quecksilbersäule in einer Kältemischung aus Salz und schmelzendem Eise zu stehen kommt. Von da bis zum Siedepunkt des Wassers nimmt er 212° an.

## 15. Schwangerschafts-Kalender. \*)

Letzte Menstruation		Tag der Geburt		Letzte Menstruation		Tag der Geburt	
Januar	1	October	8	Juli	5	April	12
"	5	"	12	"	10	"	16
"	10	"	17	"	15	"	21
"	15	"	22	"	20	"	26
"	20	"	27	"	25	Mai	1
"	25	November	1	"	28	"	4
Februar	1	"	4	August	1	"	8
"	5	"	8	"	5	"	12
"	10	"	12	"	10	"	17
"	15	"	22	"	15	"	22
"	20	"	27	"	20	"	27
"	25	December	1	"	25	Juni	1
März	1	"	6	"	28	"	4
"	5	"	10	September	1	"	8
"	10	"	15	"	5	"	12
"	15	"	20	"	10	"	17
"	20	"	25	"	15	"	22
"	25	"	30	"	20	"	27
"	28	Januar	2	"	25	Juli	2
April	1	"	6	"	28	"	5
"	5	"	10	October	1	"	8
"	10	"	15	"	5	"	12
"	15	"	20	"	10	"	17
"	20	"	25	"	15	"	22
"	25	"	30	"	20	"	27
"	28	Februar	2	"	25	August	1
Mai	1	"	5	"	28	"	4
"	5	"	9	November	1	"	8
"	10	"	14	"	5	"	12
"	15	"	19	"	10	"	17
"	20	"	24	"	15	"	22
"	25	März	1	"	20	"	27
"	28	"	4	"	25	September	1
Juni	1	"	8	"	28	"	4
"	5	"	12	December	1	"	7
"	10	"	17	"	5	"	11
"	15	"	22	"	10	"	16
"	20	"	27	"	15	"	21
"	25	April	1	"	20	"	26
"	28	"	4	"	25	October	1
Juli	1	"	8	"	28	"	

\*) Berechnet nach der Formel: Der Eintritt der Geburt findet statt 9 Monate minus 7 Tage (oder — 3 Monate + 7 Tage) nach dem Tage d. Eintrittes d. letzten Menstruation.



## 16. Sehproben.

Zur Untersuchung der Sehschärfe des Auges bedient man sich am zweckmässigsten der Probebuchstaben (Test-types) von Snellen, welche derart gewählt sind, dass ein Auge mit normaler Sehschärfe gewisse Buchstaben in gewisser Entfernung deutlich sehen kann. Diese in Fuss ausgedrückte Entfernung bildet zugleich die Nummer der betreffenden Buchstaben. So wird von einem Auge mit normaler Sehschärfe Nr. 20 in 20', Nr. 50 in 50' und Nr. 3 in 3' Distanz deutlich gelesen. Die Sehschärfe des Auges lässt sich durch einen Bruch ausdrücken, dessen Zähler die Entfernung des Objectes vom untersuchten Auge, und dessen Nenner die Nummer der Probebuchstaben bildet. In dem eben angeführten Beispiele wird also:  $S = \frac{20}{20}$  oder  $\frac{50}{50}$  oder  $\frac{3}{3} = \frac{1}{1}$  sein. Liest ein Auge in 20' blos Nr. XXX, so wird dessen Sehschärfe  $S = \frac{20}{30}$  sein. Liest das Individuum in 10' Sn XI., so ist dessen Sehschärfe wieder geringer und  $S = \frac{10}{40}$ . Liest es in 20' blos Sn C, so ist  $S = \frac{20}{100}$ .

Es ist rathsam, diesen Bruch nicht abzukürzen, da aus demselben nicht nur der Grad der Sehschärfe ersichtlich ist, sondern auch der Weg, auf dem dieselbe ermittelt wurde. Man lässt am zweckmässigsten in der Entfernung von 20 Fuss zuerst die grösseren und allmählig die kleineren Buchstaben lesen, bis man die kleinsten ermittelt, die in der genannten Entfernung deutlich wahrgenommen wurden. (Prüfung der Augen für die Ferne.) — Behufs Prüfung der Augen für die Nähe lässt man zuerst die kleinsten Nummern lesen, bis man die *grössten* eruiert, die das Auge noch deutlich lesen kann.

Im Nachfolgenden bringen wir einige Probe-Buchstaben genau nach Snellen und einige Leseproben, die ungefähr den angedeuteten Anforderungen entsprechen.

## II. (0,6.)

Die fünf Sinne des Menschen sind die fünf Eingangsthore, durch welche die gesammte Außenwelt mit all' ihrer Schönheit und Nützlichkeit den Einzug hält, um zu unserem Bewußtsein zu gelangen, und so unsere Erkenntniß und

 $\text{II}^{\frac{1}{\text{II}}}$ . (0,8.)

unser Wissen zu werden. Es ist letzteres ein unberechenbarer Vortheil, diese fünf Sinne zu wecken und in steter Thätigkeit zu erhalten und durch Uebung und Anleitung zu erwirken, daß dieselben möglichst

## III. (1,0.)

viele Eindrücke der uns umgebenden Außenwelt aufnehmen und dieselben, durch eigene Schwäche und Unvollkommenheit möglichst unberührt, an den Ort ihrer

 $\text{III}^{\frac{1}{\text{II}}}$ . (1,1.)

Bestimmung gelangen zu machen. Der Zweck nachfolgender Uebungen ist daher: die kindlichen Sinne und ihre Organe durch klare, bestimmte

## IV. (1,3.)

und wohl unterscheidbare Eindrücke zu wecken und zu befehen. Wir entnehmen den oben genannten Blättern von den

## VI. (2,0.)

stimmreich erdachten Uebungen  
nur einige der wesentlichsten.

VII<sup>I</sup><sub>II</sub>. (2,5.)

Bur Uebung des Gesichtssinnes lege man dem Kinde

## X. (3,2.)

drei Reihen von Farben vor, roth, blau,

## XV. (4,8.)

**E R H F A**

## XX. (6,5.)

**A V C B**

C. (32,5.)

**E**

L. (16,2.)

**P N**

XXX. (9,75.)

**S O Z**



## 17. Verzeichniss der Todesursachen.

Auf Grundlage der vom III. internationalen Congresse angenommenen Bezeichnungen.

Die mit \* bezeichneten Krankheitsnamen sind nur ausnahmsweise zu benützen.

I. Classe. Todtgeboren (*Mortuus natus*).

II. Classe. Verstorben innerhalb der ersten Woche nach der Geburt wegen

a) Schwäche (*Debilitas*),

b) angeborner Bildungsfehler, u. zw.:

Wasserkopf (*Hydrocephalus connatus*);

\*Blausucht (*Cyanosis*);

Gespaltenes Rückgrat (*Spina bifida*);

Afterverschluss (*Atresia ani*) u. s. w.;

c) Mangelhafter Ausdehnung der Lunge (*Atelectasis pulmonum*),

III. Classe. Tod durch Altersschwäche (*Marasmus senilis*).

IV. Classe. Gewaltsamer Tod (*Mors violenta*).

a) Selbstmord (*Suicidium*);

b) Mord, Todtschlag und tödtliche Verletzung (*Homicidium et laesiones letales*);

c) Hinrichtung (*Supplicium legale*);

d) Tod im Kriege (*Mors in bello*);

e) Hungertod (*Mors ex fame*);

f) Zufälliger Tod (*Mors accidentalis*). Jede Verletzung und jeder tödtliche Zufall ist genau zu charakterisiren.

V. Classe. Tod durch bestimmte Krankheiten (*Mors ex morbo*).

a) Krankheiten d. Gesamtnervensystems. Entzündung des Hirnes und seiner Häute (*Encephalitis et Meningitis*)

\*Hitziger Wasserkopf (*Hydrocephalus acutus*).

Hyperämie des Hirnes und seiner Häute (*Hyperaemia cerebri et meningum*).

Gehirnerweichung (*Encephalomalacia*).

Chronischer Wasserkopf (*Hydrocephalus chron.*).

Gehirnschlagfluss (*Apoplexia cerebri*).

Gehirngeschwülste (*Tumores cerebri*).

\*Irrsinn (*Insania*).

*Cretinismus* (*Cretinismus*).

Entzündung des Rückenmarkes und seiner Häute (*Myelitis et Myelomeningitis*).

Rückenmarksdarre (*Tubes dorsalis*).

Rückenmarksapoplexie (*Apoplexia spinalls*).

Starrkrampf (*Tetanus*), der sogenannte rheumatische.

Mundsperrre der Neugeborenen (*Trismus neonatorum*).  
 \*Krämpfe der Kinder, Fraisen (*Convulsiones infant.*).  
 Stimmritzenkrampf (*Spasmus glottidis — Asthma Millari*).  
 \*Lähmungen (*Paralysis, Paresis, Para — Hemiplegia*).  
 Veitstanz (*Chorea*).  
 Fallsucht (*Epilepsia*).  
 Nervenschmerz (*Neuralgia*).  
 Herzkrampf (*Stenocardia*).  
 Nervöses Asthma (*Asthma bronchiale*).

b) Krankheiten der Respirations- und Circulationsorgane.

Häutige Bräune (*Croup*).  
 Kehlkopfentzündung (*Laryngitis — Pseudocroup*).  
 Oedem um die Stimmritze (*Oedema circa glottidem*).  
 Stimmritzenverengung (*Stricture glottidis*).  
 Vereiterung d. Kehlkopfknorpel (*Perichondritis laryngea*).  
 Kropf (*Struma — Degenerationes glandulae thyreoideae*).  
 Luftröhrenentzündung (*Bronchitis*).  
 Erweiterung der Bronchien (*Bronchiectasia*).  
 Lungenausdehnung (*Emphysema pulmon.*).  
 Lungenentzündung (*Pneumonia lobaris et lobularis*).  
 \*Lungen-Oedem und Hyperämie (*Hyperaemia et Oedema pulmon.*).

Lungenbrand (*Gangraena pulmon.*).  
 Mangelhafte Ausdehnung der Lungen (*Atelectasis pulmon. acquisita*).

\*Lungenblutfluss (*Haemoptoe — Infarctus haemoptoicus*).  
 Rippenfellentzündung (*Pleuritis — Exsudatum pleuriticum, Empyema*).

Luftansammlung in der Brusthöhle (*Pneumothorax*).  
 Herzbeutelentzündung (*Pericarditis, Exsudatum pericardiale*).

Entzündung des Herzfleisches und seiner Innenhäute (*Myo- et Endocarditis*).

Organische Herzfehler (*Vitia cordis organica*). — Sind näher zu bezeichnen.

Entartungen des Herzfleisches (*Degenerationes cordis*).

Aortenverengung (*Stricture Aortae*).

Arterien-, Venen- u. Lymphgefässentzündung (*Arteriitis, Phlebitis, Lymphangitis*).

Schlagadernerweiterung (*Aneurysma*).

Blutgefässberstungen (*Rupt. art. et. venarum*).

Blutgefässverstopfungen (*Thrombosis art. et venarum*). In allen letzterwähnten Fällen sind die erkrankten Gefässe näher zu bezeichnen.

c) Krankheiten der Verdauungsorgane und ihrer Adnexa.

Mundschwämmchen (*Aphthae, Soor*).

Wasserkrebs (*Noma*).

Zungenentzündung (*Glossitis*).

Rachenentzündung (*Pharyngitis — Angina tonsillaris*).

\*Retropharyngealabscess (*Abscessus retropharyng.*).

Ohrspeicheldrüsenentzündung (*Parotitis*).

Brandige Halszelligewebsentzündung (*Cynanche sublingualis*).

Speiseröhrenverengung (*Stricturea oesophagi*). — Natur derselben.

\*Magenentzündung (*Gastritis*). — Ursache genau anzugeben.

Durchbohrendes Magengeschwür (*Ulcus ventr. perforans*).

Darmkatarrh, Darmentzündung (*Cat. intestinalis, Enteritis*).

Magen-Darmkatarrh der Kinder (*Cat. gastrointest. infant.*).

Cholérine (*Cholera infantum* — *Cholera nostras*).

Folikularkatarrh (*Cat. follicularis intest.*).

Blinddarmentzündung (*Typhlitis et Perityphlitis*).

Eingeklemmter Bruch (*Hernia incarcerata*). — Sitz desselben und die angewandte Therapie näher zu bezeichnen.

Innere Darmeinklemmung und Verengung (*Ileus* — *Volculus, Intussusceptio, Stricturea intestin.*).

\*Blutflüsse aus dem Magen und Darmkanale (*Haemorrhagia ventriculi et intestin.* — *Melaena neonatorum*).

Magen- und Darmfisteln (*Fistula ventriculi, F. stercoralis, F. ani*).

Allgemeine und umschriebene Bauchfellentzündung (*Peritonitis, Perimetritis etc. Exsudatum, Abscessus retro periton.*).

Milzentzündung (*Splenitis*).

Leberentzündung (*Hepatitis, Abscessus hepat.*) und Hyperämie (*Hyperaemia hep.*).

Acuter Leberschwund (*Atrophia hepat. acuta*).

Lebercirrhose (*Cirrhos. hepat., Atrophia hep. chron.*).

\*Andere Leberentartungen (*Degen. hepat. adiposa etc.*).

Gallensteinbildung (*Cholelithiasis*).

Leber- und Gallenblasenfisteln (*Fist. hepatica*).

Wurmkrankheiten (*Helminthiasis*). — Species und Sitz zu bezeichnen.

Broncekrankheit (*Degenerationes gl. suprarenalium* — *Morbus Addisonii*).

d) Krankheiten des Harn- und Geschlechtsapparates mit Einschluss der Krankheiten der Schwangeren, Gebärenden und des Wochenbettes.

Nierenentzündung (*Nephritis, Morb. Brightii acuta*).

Brightische Krankheit (*M. Brightii chron.*).

Nierenbeckenentzündung (*Pyelitis*).

Harnsteinbildung (*Urolithiasis*).

Harnblasenentzündung (*Urocystitis*).

Harnröhrenstrictur (*Stric. urethrae*).

Harnfisteln (*Fistulae urinariae*). — Näher zu bezeichnen.

Entzündung der Vorsteherdrüse (*Prostatitis, Abscessus prostatae*).

Hypertrophie d. Vorsteherdrüse (*Hypertrophia prostatae*).  
 Hodengeschwülste, gutartige (*Tumores testicul. benigni*).  
 Eierstockentzündung (*Oophoritis*) — ob puerperal?  
 Eierstockwassersucht (*Cystovarium*) und andere gutartige  
 Eierstockgeschwülste (*Tumores ovariorum benigni*).  
 Gebärmutterentzündung (*Metritis*) — ob puerperal?  
 Gutartige Gebärmutterneubildungen (*Fibroidum — Polypus uteri*).

\*Gebärmutterblutflüsse (*Metrorrhagiae*) — ob puerperal,  
 und wenn dies der Fall ist, in welchem Stadium der  
 Entbindung.

Vorlagerung des Mutterkuchens (*Placenta praevia*).

\*Gebärmutterlähmung (*Paralysis uteri gravidi*).

Gebärmuttervorfall (*Prolapsus uteri grav.*).

Gebärmutterumstülpung (*Inversio uteri grav.*).

Retroversion der Gebärmutter (*Retroversio uteri grav.*).

Gebärmutterberstung (*Ruptura uteri grav.*).

Extrauterinschwangerschaft (*Graviditas extrauterina*).

Schwere Geburtshindernisse (*Dystociae*) — näher zu  
 bezeichnen.

Kindbettfraisen (*Eclampsia parturientium*). In welchem  
 Geburtsstadium?

Fieberhafte Wochenbettkrankheiten (*Processus puerperales febriles*) — näher zu bezeichnen.

Brustdrüsenentzündung (*Mastitis*).

Unstillbares Erbrechen der Schwangeren (*Hyperemesis gravidarum*).

e) Krankheiten des Bewegungsapparates  
 der Haut und des Zellgewebes.

Knochen- und Knochenhautentzündung (*Osteitis, Periostitis, Osteomyelitis*).

Beinfrass und Knochenbrand (*Caries et Necrosis ossium*).

Gelenkentzündung und Vereiterung (*Inflammatio — Caries articulationum*).

Haut- und Zellgewebsentzündung und Vereiterung  
 (*Inflamm. text. cellulosi, Pseudoerysipelas, Ulcera*).

\*Brand der Weichtheile (*Gangraena*) — Natur derselben.  
 Altersbrand (*Gangraena sen.*).

Brandbeule (*Anthrax*).

Neugebilde des Zellgewebes, der Haut, Knochen und  
 Muskeln (*Tumores t. cell. etc.*).

In allen diesen Fällen möge der Sitz des Uebels be-  
 zeichnet werden.

Zellgewebsverhärtung der Neugeborenen (*Induratio cutis neonat.*).

Nabelentzündung und Brand (*Inflammatio, Exulceratio, Gangraena umbilici*).

Nabelblutung (*Haemorrhagia umbil.*).

Kopfgeschwulst der Neugeborenen (*Cephaloematoma neonat.*).

Psoasabscess (*Psoitis, Abscess. musc. psoad.*).  
 Fortschreitende Muskelatrophie (*Atrophia musc. progressiva*).

Furunkulose der Kinder (*Furunculosis infant.*).

Blasenausschlag (*Pemphigus*) — der nicht syphilitisch  
 Knolliger Aussatz (*Lepra tuberosa*).

Pachydermie (*Elephantiasis*) } Sitz derselben.  
 Lupus (*Lupus*) }

Fischschuppenausschlag (*Ichthyosis*).

Schuppenflechte (*Psoriasis*).

f) Krankheiten der Gesamtoönstitution  
 und des Blutes.

\*Blutarmuth (*Anaemia*).

Bleichsucht (*Chlorosis*).

Vermehrung der weissen Blutkörper (*Leukaemia*).

\*Gelbsucht (*Icterus, Cholaemia*).

\*Harnvergiftung des Blutes (*Uraemia*).

Eitervergiftung des Blutes (*Pyæmia*) — Ursache genau  
 anzugeben.

\*Wassersucht (*Hydrops*). Ausbreitung derselben.

Harnruhr (*Diabetes mellitus*).

Scorbut und Blutfleckenkrankheit (*Scorbutus, M. maculosus*).

Bluterkrankheit (*Haemophilia*).

Gicht (*Gutta, Arthritis podagrica*).

Acuter Gelenksrheumatismus (*Rheumatismus artic. acut*

\*Andere rheumatische Affectionen (*Rheumatismus musc.*  
*etc.*).

\*Acute fieberhafte Krankheit ohne bestimmte Localisation  
 (*Febris sine localisatione*).

Englische Krankheit (*Rhachitis*).

Knochenerweichung (*Osteomalacia*).

Wechselfieber (*Febris intermittens, Cachexia ex febre*  
*intermitt.*).

Leichenvergiftung (*Intoxicatio cadaverica*).

Kriebelkrankheit (*Ergotismus*).

Säuferkrankheit (*Alcoholismus, Delirium potatorum*).

Chronische Metallvergiftungen (*Intoxicatio chron. mercurialis, saturnina, arsenicalis etc. etc.*).

g) Tuberculöse u. scrophulöse Krankheiten.

Tuberculose des Hirns und seiner Häute (*Tuberc. cerebri et meningum*).

Tuberculose des Kehlkopfes (*Tub. laryngis*).

Tuberculose der Lunge (*Tub. pulmon.*).

Tuberculose der Gedärme und des Bauchfelles (*Tub. intestin. et peritonei*).

Tuberculose der Gekrösdrüsen und anderer Lymphdrüsen (*Tub. gland. lymph., Tabes mesenterica*).

Tuberculose der Gelenke (*Arthritaceae*).



Tuberculose der Knochen (*Caries tuberc. ossium*),

Pott'sches Uebel (*Malum Pottii* u. s. w.).

Acute Tuberculose (*Tub. acuta — miliaris*),

Serophulose (*Scrofulosis*). Näher zu bezeichnen.

h) Krebse. Sitz und womöglich auch Form zu bezeichnen.

Epithelialer Gesichtskrebs (*Carc. epithel. faciei*).

Alveolarer Krebs des r. Oberarmknochens (*Carc. alveol. oss. brachii dextri*).

Magenkrebs (*Carc. ventriculi*).

Uteruskrebs (*Carc. uteri*).

Leberkrebs (*Carc. hepat.*) u. s. w.

i) Contagiöse Krankheiten.

Blattern (*Variola*) — ob vaccinirt und revaccinirt, wann und mit welchem Erfolge?

Scharlach (*Scarlatina*).

Masern (*Morbilli*).

Rothlauf (*Erysipelas*).

Bauchtyphus (*Typhus abdom., Ileotyphus*).

Flecktyphus (*Typhus exanthematicus*).

Recurrirendes Fieber (*Febris recurrens*).

Gelbes Fieber (*Febris flava*).

Asiatische Brechruhr (*Cholera asiatica*).

Ruhr (*Dysenteria*).

\*Grippe (*Influenza*).

Rotz (*Malleus*).

Milzbrandkarbunkel (*Pustula maligna*).

Hundswuth (*Rabies canina*).

Syphilis (*Syphilis*), ob angeboren oder erworben?

Hospitalbrand (*Gangraena nosocomialis*)

Brandige Bräune (*Diphtheritis*).

Keuchhusten (*Tussis convulsiva*).

} Sitz derselben.

VI. Classe. Tod aus unbekannter Ursache. (*Mors ex causa ignota*.) Erfordert die behördliche Obduction.



300 PASTEUR  
Urban & Schwarzenberg in Wien und  
PALO ALTO, CALIFORNIA

# Real-Encyclopädie

der  
gesamten Pharmacie.

Handwörterbuch

für

Apotheker, Aerzte und Medicinalbeamte.

Unter Mitwirkung der Herren:

Prof. Ascherson, Berlin — Prof. v. Basch, Wien —  
Dr. Becker, Leipzig-Gohlis — Prof. Dr. Beckurts,  
Braunschweig — Apoth. Dr. Bedall, München —  
Docent R. Benedikt, Wien — Apoth. Dr. Biechele,  
Eichstätt — Red. Dr. Böttger, Berlin — Prof.  
Csokor, Wien — Prof. v. Dalla Torre, Innsbruck —  
Apoth. E. Dieterich, Helfenberg — Prof. Dippel,  
Darmstadt — Dr. Ehrenberg, Tübingen — Apoth.  
Dr. Elsner, Schönefeld — Prof. Eulenburg,  
Berlin — Dr. B. Fischer, Berlin — Docent Gänge,  
Jena — Docent Dr. Gaertner, Wien — Dr. Gans-  
windt, Dresden — Doc. Goldschmiedt, Wien —  
Apoth. Graf, Prag — Apoth. Dr. Grote, Braun-  
schweig — Prof. Th. Hanausek, Wien — Med.-  
Ass. Dr. Hartmann, Magdeburg — Apoth. Hart-  
wich, Tangermünde — Red. Dr. Heger, Wien —  
Doc. Heitler, Wien — Apoth. Hell, Troppau —  
Prof. Hilger, Erlangen — Apoth. Dr. B. Hirsch,  
Frankfurt — Prof. Hirzel, Leipzig — Prof. Hof-  
mann, Leipzig — Apoth. G. Hofmann, Dresden —  
Apoth. Dr. Holdermann, Seelbach — Apoth.  
Huber, Basel — Prof. Husemann, Göttingen —  
Apoth. Dr. Jehn, Geseke — Prof. Johné, Dres-  
den — Prof. v. Kerner, Wien — Docent Klein,

## Urban & Schwarzenberg in Wien und Leipzig.

Darmstadt — Prof. Kobert, Dorpat — Red. Dr. Krause, Cöthen — Ob.-Stabs-Apoth. Dr. Lenz, Berlin — Docent Lewin, Berlin — Prof. Loebisch, Innsbruck — Prof. Ludwig, Wien — Prof. J. Mauthner, Wien — Dr. Max Möller, Wien — C. Mylius, Baruth — Apoth. Dr. E. Mylius, Leipzig — Docent Paschkis, Wien — Apoth. Dr. Pauly, Harzburg — Prof. Pinner, Berlin — Assist. Pitsch, Wien — Apoth. Dr. Prollius, Parchim — Dr. Proskauer, Berlin — Med.-Ass. Pusch, Dessau — Prof. Reichardt, Jena — Apoth. Schlickum, Winnigen — Corps-Stabsapoth. A. Schneider, Dresden — Apoth. Schorer, Lübeck — Doc. v. Schroeder, Strassburg — Dr. Schweissinger, Dresden — Prof. Skraup, Graz — Prof. Soxhlet, München — Prof. Soyka, Prag — Prof. Stricker, Wien — Prof. Sussdorf, Dresden — P. Sydow, Wilmersdorf — Apoth. Thümmel, Breslau — Doc. Tschirch, Berlin — Prof. Ulbricht, Dresden — Red. Vomáčka, Prag — Apoth. Dr. Vulpius, Heidelberg — Apoth. v. Waldheim, Wien — Prof. Weichselbaum, Wien — Reg.- und Med.-Rath Wernich, Cöslin — Prof. Wölfler, Graz — Med.-Ass. Ziegler, Karlsruhe

herausgegeben von

**Dr. EWALD GEISSLER,**

*Prof. der Chemie und Redacteur der „Pharm. Centralhalle“ in Dresden*

und

**Dr. JOSEF MOELLER,**

*Professor der Pharmakologie und Pharmakognosie an der Universität Innsbruck.*

Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt.

Erscheint in ca. 8 Bänden von je 45 Druckbogen. Die Ausgabe findet in Heften à 3 Druckbogen statt.

Preis pro Heft 60 kr. ö. W. = 1 Mark.

Preis pro Band (15 Hefte): 9 fl. ö. W. = 15 Mark broch.; 10 fl. 50 kr. ö. W. = 17 M. 50 Pf. eleg. geb.

Allmonatlich dürften 2–3 Hefte erscheinen.

*Erschienen sind bis Ende Juli 1887: Heft 1–45  
(Band I–III).*

LANE MEDICAL LIBRARY

300 PASTEUR DRIVE

PALO ALTO, CALIFORNIA 94304

Ignorance of Library's rules does not exempt  
violators from penalties.

... beträgt im Inlande 4 fl., im Auslande 8 Mark  
→ Man abonnirt im Auslande bei allen Postämtern u  
+ Buchhändlern, im Inlande durch Einsendung d  
e Betrages per Postanweisung an die Administrati  
der „Wiener Medizinischen Presse“ in Wie  
I., Maximilianstrasse 4.

25 Klinisches Recept-Taschen-  
5 buch für Praktische Ärzte.  
88

[illegible]

V125  
K65  
1888



